



02 69-5-21



J. G. Kneller del.

W. J. Kneller sc.

PRAEPOS MEDICAE VNIVERSAE PRAECEPTA

AVCTORE

IOSEPHO FRANK

IOANNIS PETRI FILIO, AVGVSTISSIMO IMPERATORI ET TOTIVS
ROSSIAE AVTOCRATORI A CONSILIIIS STATVS, EQVITE ORD. ST.
ANNAE II. CLASSIS, ST. WLODIMIR IV. CLASSIS, THERAPIAE
SPECIALIS ET CLINICES IN CAESAREA VNIVERSITATE VILNENSI
PROFESSORE EMERITO, FACVLTATIS MEDICAE VINDOBONENSIS,
SOCIETATIS MEDICAE BEROLINENSIS, CONSILII MEDICI PETRO-
POLITANI ET CAESAREAE ACADEMIAE MEDICO-CHIRVURGICAE,
SOCIETATVM PHILANTHROPICAE ET PHARMACEVTICAE PETROPO-
LITANAE, NATVRAE SCRVTATORVM MOSQVENSIS, CAESAREAE
MEDICORVM ET BENEFICORVM VILNENSIS, ACADEMIAE MEDI-
CORVM VENETAE, SOCIETATIS AGRICVLTVRAE STVDIOSORVM
FLORENTINAE, SCIENTIARVM ET ARTIVM ARGENTORATENSIS,
ACADEMIAE MEDICAE, SOCIETATVM GALVANICAE ET MEDICAE
PARISIN. R. JENNERIANAE, MEDICORVM ET NOSOCOMII A GVYO
LONDINI DENOMINATAE, ORDINIS MEDICO-CHIRVRGORVM
LVCCENSIS, SOCIETATIS PHYSICO-MEDICAE ERLANGENSIS, ME-
DICAE MARSILIANAE, MEDICO-PRACTICAE MONTISPESSVLANAE,
LITERARIAE CVM VNIVERSITATE STVDIORVM CRACOVIEWSI
CONIVNCTAE, R. VARSOVIENSIS ETC. ETC. SODALI.

PARTIS SECVNDAE VOLV MEN SECVNDVM,
SECTIO SECVNDA,

CONTINENS

DOCTRINAM DE MORBIS DIAPHRAGMATIS, PERI-
CARDII, CORDIS, ARTERIARVM, VENARVM ET ANIMI
DELIQVIORVM.

L I P S I A E

SVMP TIBVS BIBLIOPOLII KUEHNIANI
CICIDCCCXXIV.

ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS LIBRARY	
CLASS	61
ACCN.	14097
SOURCE	
DATE	

ROYAL COLLEGE
OF
PHYSICIANS
LONDON

CONSPECTUS

RERUM PARTIS II. VOLUM. II. SECTION. 1.
ET 2. PERTRACTATARUM.

VOL. II. SECT. 1.

DE MORBIS LARYNGIS, TRACHEAE ET
CORPORIS THYREOIDEI.

CAP. I.

De morbis laryngis, tracheae et corporis thyreoidae generatim. p. 3—8.

O rdor rerum. <i>Literatura.</i>	<i>De paraphonia.</i> §. IV. p. 13.
§. I. p. 3.	Notio. 1.
Ordo rerum. 1.	Caussae generales. 2.
Literatura. 2.	Specierum enumeratio.
<i>Consideratio laryngis, tracheae, corporis thyreoidae, et vitiorum formae.</i> §. II. p. 4.	3.
Consideratio laryngis, tracheae, corporisque thyreoidae. 1.	Paraphonia puberum. 4.
Vitia formae. 2.	nasalis. 5.

CAP. II.

De vitiis vocis et loquela. p. 8—71.

<i>De argumento generatim.</i>	<i>De aphonia.</i> §. V. p. 32.
§. III. p. 8.	Literatura. 1.
Vagitus recens natorum. 1.	Distinctio aphoniae a mussitatione. 2.
Loquela initia. 2.	Divisio. 3.
Vocis et loquela consideratio. 3.	Aphonia symptomata. 4.
Vitia vocis ab illis loquelae distinguuntur. 4.	primaria. 5.
Doctrinae momentum. 5.	traumatica. 6.
Literatura. 6.	inflammatoria. 7.
Ordo rerum. 7.	rheumatica, catarrhalis et arthritica. 8.
Frank Prax. II. 2. 2.	a Aphonia

- Aphonia gastrica. 9.
 spasmodica. 10.
 metastatica. 11.
 consensualis. 12.
 Observatio. 13.
De Alalia. §. VI. p. 44.
 De loquela. 1.
 Alaliae species. 2.
 Alalia a vitiis instrumen-
 torum vocis. 3.
 a hebetatione. 4.
 a cophosi. 5.
 Loquelae benefica. 6.
De Mogilalia. §. VII. p. 60.
 Definitio. 1.
 Literatura. 2.
 Divisio. 3.
 Mogilalia ischnophonia.
 4.
 traulismus. 5.
 psellismus. 6.
 Monitum. 7.

CAP. III.

De Croup. p. 72 — 194.

Definitio. Nominis ratio. Historia et literatura. §. VIII. p. 72.

- Definitio. 1.
 Nominis ratio. 2.
 Historia et literatura. 3.
Symptomata. §. IX. p. 87.
 Generatim. 1.
 Initium. 2.
 Augmentum. 3.
 Acme. 4.
Autopsia cadaverum. Analysis chemica. §. X. p. 103.
 Autopsia cadaverum. 1.
 Analysis chemica. 2.
Caussae. §. XI. p. 113.
 Caussae praedisponentes.
 1.
 excitantes. 2.
Diagnosis. §. XII. p. 127.
 Symptomata catarrhalia.
 1.

- Dyspnoea, vox et tus-
 sis. 2.
 Libera intervalla. 3.
 Status inflammatorius. 4.
 Varia sedes. 5.
 Facilis error. 6.
 Indoles inflammationis.
 7.
 Concretiones membrana-
 ceae. 8.
 Complicationes. 9.
Prognosis. §. XIII. p. 147.
 Periculum. 1.
 Resolutio perfecta. 2.
 imperfecta. 3.
 Suppuratio. 4.
 Suffocatio. 5.
 Virium extinctio. 6.
 Accessus aliorum mor-
 borum. 7.
 Convalescentia. 8.
 Recidiva. 9.
Cura. §. XIV. p. 158.

- Prophylaxis. 1.
 Cura morbi in genere. 2.
 Indicationes. 3.
 Prima indicatio. 4.
 Secunda indicatio. 5.
 Tertia indicatio. 6.
 Tracheotomia. 7.

CAP. IV.

De phthisi laryngea et tracheali.
p. 195 — 221.

- Definitio. Literatura.* §. XV. p. 195.
 Definitio. 1.
 Literatura. 2.
Symptomata. Cadaverum autopsia. §. XVI. p. 198.
 Symptomata. 1.
 Autopsia cadaverum. 2.
Caussae. §. XVII. p. 206.
 Caussae praedisponentes.
 1.
 Caussae excitantes. 2.

Diagno-

- Diagnosis. Prognosis.* §. XVIII. p. 208. *Caussae.* §. XXIV. p. 234.
Generatim. 1. *Caussae praedisponentes*
Distinctio a croup chro- et excitantes. 1.
nico. 2. *Causa proxima.* 2.
Polypi tracheae. 3. *Diagnosis. Prognosis.* §.
Tumores tracheam com- XXV. p. 240.
primentes. 4. *Diagnosis.* 1.
Distinctio inter phthisin *Prognosis.* 2.
laryngeam et trachea- *Cura.* §. XXVI. p. 248.
lem. 5. *Prophylaxis.* 1.
Varia indoles. 6. *Cura.* 2.
Prognosis. 7.
Cura. §. XIX. p. 217.
Cura morbi nec dum
conclamati. 1.
morbi concla-
mati. 2.

CAP. V.

De thyreoitide. p. 222 — 225.

Definitio. Notio morbi. Sym-
ptomata. Caussae. §. XX. p. 222.

Definitio. 1.
Notio morbi. 2.
Symptomata. 3.
Caussae. 4.

Diagnosis. Prognosis. Cura.
 §. XXI. p. 224.

Diagnosis. 1.
Prognosis. 2.
Cura. 3.

CAP. VI.

De struma. p. 226 — 264.

Definitio. Nominis notio. Li-
teratura. §. XXII. p. 226.

Definitio. 1.
Nominis notio et syno-
nyma. 2.
Literatura. 3.

Symptomata. Autopsia ca-
daverum. §. XXIII. p. 231.

Symptomata. 1.
Autopsia cadaverum. 2.

DE MORBIS THECAE
 THORACICAE, PLEURAE,
 MEDIASTINI, THYMI ET
 PULMONUM. p. 265.

CAP. VII.

De vitiis thecae
thoracicae, pleu-
rae, mediastini,
thymi et pulmonum
generatim. p. 267 — 287.

Ordo rerum. De vitiis the-
cae thoracicae. §. XXVII. p. 267.

Ordo rerum. 1.
De vitiis thecae thora-
cicae. 2.

Vitia costarum, sterni, sca-
pularum et claviculae.
 §. XXVIII. p. 270.

Vitia costarum. 1.
sterni. 2.
claviculae. 3.
scapulae. 4.

Vitia pleurae, mediastini et
thymi. §. XXIX. p. 278.

Vitia pleurae. 1.
mediastini. 2.
thymi. 3.

Vitia pulmonum. §. XXX. p. 283.

Literatura. 1.
Consideratio pulmonum.
 2.

Vitia formae. 3.

CAP. VIII.

De peripneumoniis.

p. 288 — 408.

Notio. Literatura. §. XXXI. p. 288.

Notio. 1.

Literatura. 2.

Symptomata. Autopsia cadaverum. §. XXXII. p. 298.

Symptomata. 1.

Autopsia cadaverum. 2.

Caussae. §. XXXIII. p. 311.

Praedisponentes. 1.

Excitantes. 2.

C. Proxima. 3.

Diagnosis. §. XXXIV. p. 322.

Examen aegri. 1.

Per occulta. 2.

Facilis confusio. 3.

Sedes varia. 4.

Pleuritis. 5.

Distinctio pleuritidis a
rheumatismo
acuto musculorum inter-
costalium. 6.pleuritidis a neu-
ralgia thoraci-
ca et pleural-
gia. 7.pleuritidis a peri-
carditide, sple-
nitide et hepa-
titude. 8.pleuritidis a rha-
chialgitide. 9.

Pleuropneumonia. 10.

Pneumonia. 11.

Distinctio a pericarditi-
de, carditide et pneu-
monorrhagia. 12.

Bronchitis. 13.

Distinctio a febre catar-
rhalī et morbillis. 14.Bronchiopneumonia et
bronchiopleuritis. 15.Indoles peripneumonia-
rum. 16.Peripneumoniae trauma-
ticae. 17.inflammatoriae.
18.rheumaticae et
metastaticae.
19.gastricae, bilio-
sae et vermi-
nosae. 20.intermittentes.
21.

arthriticae. 22.

Peripneumonia typhoi-
dea. 23.

Complicationes. 24.

Prognosis. §. XXXV. p. 361.

Generatim. 1.

Prognosis ex aegri con-
ditione. 2.

ex sede morbi. 3.

ex indole morbi.
4.

Exitus. 5.

Resolutio perfecta. 6.
imperfecta. 7.Hydrops acutus cavita-
tum pleurae et oedema
pulmonis. 8.Induratio et ecchymoma
pulmonis. 9.

Suppuratio. 10.

Gangraena. 11.

Bronchiorum oblitteratio.
12.

Conclusio. 13.

Cura. §. XXXVI. p. 376.

De cura generatim. 1.

Cura peripneumoniae in-
flammatoriae.
2.peripneumoniae
traumaticae. 3.peripn. rheuma-
ticae. 4.peripneumoniarum
gastricarum. 5.peripneumoniae in-
termittentis.
6.

Cura

Cura peripneumoniae
arthriticae. 7.
peripn. typhodis. 8.
peripneumoniarum
complicatarum.
9.

De cura reliquiarum. 10.
Cura hydropis cavitatum
pleurae, mediastini et
oedematis pulmonis.
11.

Cura indurationis. 12.
Digitalis purpurea. 13.
Mercurius. 14.
Antimonium. 15.
Polygala senega. 16.
Connubium plurimorum
pharmacorum. 17.
Cura suppurationis. 18.
sensibilitatis mor-
bosae et debi-
lilitatis. 19.
convalescentiae. 20.

C A P. IX.

De pneumonorrhagia. p. 409—477.

Definitio. Literatura. §.
XXXVII. p. 409.

Definitio. 1.
Literatura. 2.

Symptomata. Autopsia cada-
verum. §. XXXVIII. p. 415.

Symptomata. 1.
Autopsia cadaverum. 2.

Caussae. §. XXXIX. p. 423.
Caussae praedisponentes.
1.

excitantes. 2.

Caussa proxima. 3.

Diagnosis. §. XL. p. 435.

Facilis confusio. 1.

Pneumonorrhagia simu-
lata et dissi-
mulata. 2.
occulta seu inter-
na. 3.

Distinctio ab epistaxi. 4.
a pneumonia. 5.

Distinctio a laryngorrha-
gia et tracheor-
rhagia. 6.

pneumonorrhagia ex vasis
bronchiorum
et ex illis pul-
monum. 7.

Num pneumonorrhagia
a haemoptoe distin-
guenda sit. 8.

Divisio pneumonorrhagiae. 9.

Pneumonorrhagia sym-
ptoma morbo-
rum acuto-
rum. 10.

symptoma mor-
borum chro-
nicorum. 11.

Pneumonorrhagia pri-
mariae. 12.

traumaticae. 13.
inflammatoriae.

14.

Pneumonorrhagia rheu-
matica. 15.

gastrica. 16.

spasmodica. 17.

arthritica. 18.

scorbutica. 19.

atonica. 20.

Prognosis. §. XLI. p. 451.

Generatim. 1.

Prognosis pneumonor-
rhagiae trau-
maticae. 2.

pneum. inflam-
matoriae et
rheumaticae. 3.

pneum. gastricae,
spasmodicae,
arthriticae,
scorbuticae,
atonicae. 4.

Prognosis pneumonorrhagiae symptomaticae. 5.

Observationes. 6.

Cura. §. XLII.

Generatim. 1.

p. 456.

Cura

Cura pneumonorrhagiae,
 traumaticae,
 inflammato-
 riae et rheu-
 maticae. 2.
 pneumon. gastri-
 cae. 3.
 pneumon. spas-
 modicae. 4.
 pneumon. arthri-
 ticae. 5.
 pneumon. scor-
 buticae. 6.
 pneumon. atoni-
 cae. 7.

Acida et opium. 8.
 Cinchona et ratanhia. 9.
 Aqua frigida et glacies.
 10.
 Alcohol et murias so-
 dae. 11.
 Ligatio membrorum ali-
 aque. 12.
 Profluvio absoluto. 13.

CAP. X.

*De phthisi pulmo-
nali.* p. 477 — 674.

*Notio. Literatura. Doctri-
 nae momentum. Ordo re-
 rum.* §. XLIII. p. 477.

Notio. 1.
Literatura. 2.
Doctrinae momentum. 3.
Ordo rerum. 4.

*De phthisi pulmonali scrophu-
losa.* §. XLIV. p. 492.

Definitio. 1.
Literatura. 2.
Stadium latens. 3.
evolutionis. 4.
confirmatum. 5.

Autopsia cadaverum. 6.
Causae praedisponentes.

7.
excitantes. 8.

Causa proxima. 9.
Diagnosis. 10.
Prognosis. 11.

Cura in genere. 12.
*stadii phthisis la-
 tentis.* 13.
*stadii evolutio-
 nis acutae.* 14.
*stadii evolutio-
 nis lentae.* 15.
*phthiiseos confir-
 matae.* 16.

*De phthisi pulmonali arthri-
tica.* §. XLV. p. 554.

Definitio. 1.
Literatura. 2.
Stadium latens. 3.
evolutionis. 4.
confirmatum. 5.

Autopsiae cadaverum. 6.
Causae. 7.
Diagnosis. 8.
Prognosis. 9.
Cura. 10.

*De phthisi pulmonali carcino-
matica.* §. XLVI. p. 565.

Definitio. 1.
Literatura. 2.
Stadium latens. 3.
evolutionis. 4.
confirmatum. 5.

Autopsia cadaverum. 6.
Causae. 7.
Diagnosis. 8.
Prognosis. 9.
Cura. 10.

*De phthisi pulmonali haemor-
rroidali.* §. XLVII. p. 571.

Definitio. 1.
Literatura. 2.
Stadium latens. 3.
evolutionis. 4.
confirmatum. 5.

Autopsiae cadaverum. 6.
Causae. 7.
Diagnosis. 8.
Prognosis. 9.
Cura. 10.

*De phthisi pulmonali scorbu-
tica.* §. XLVIII. p. 583.

Definitio. 1.
Literatura. 2.
Stadium latens. 3.

Sta-

- Stadium evolutionis. 4.
confirmatum. 5.
Causae. 6.
Diagnosis. 7.
Prognosis. 8.
Cura. 9.
- De phthisi pulmonali syphilitica.* §. XLIX. p. 588.
Definitio. 1.
Literatura. 2.
Stadium latens. 3.
evolutionis. 4.
confirmatum. 5.
Autopsiae cadaverum. 6.
Causae. 7.
Diagnosis. 8.
Prognosis. 9.
Cura. 10.
- De phthisi pulmonali metastatica.* §. L. p. 594.
Definitio. 1.
Exempla. 2.
Curriculum morbi. 3.
Autopsiae cadaverum. 4.
Diagnosis. 5.
Prognosis. 6.
Cura. 7.
- De phthisi pulmonali ex vomica.* §. LI. p. 598.
Definitio. 1.
Literatura. 2.
Origo. 3.
Signa vomicae. 4.
Terminus vomicae. 5.
Vomica non rupta. 6.
Ruptura in bronchia. 7.
in parenchyma. 8.
in partes cum pulmonibus concretas. 9.
Empyema. 10.
Absorptio puris. 11.
Diagnosis. 12.
Distinctio vomicae a bronchitide chronica. 13.
vomicae a pleuritide chronica. 14.
- Monitum. 15.
Distinctio vomicae a vitiiis cordis et aortae. 16.
Prognosis. 17.
Cura. 18.
- De phthisi pulmonali conclamata.* §. LII. p. 645.
Definitio. 1.
Literatura. 2.
Symptomata. 3.
Autopsiae cadaverum. 4.
Causae. 5.
Diagnosis. 6.
Prognosis. 7.
Cura in genere. 8.
Contra tussim. 9.
sitim. 10.
febrem. 11.
sudores. 12.
diarrhoeas. 13.
vomitus. 14.
vigilias. 15.
pectoris dolorem et dyspnoeam. 16.
debilitatem. 17.

C A P. XI.

De hydrothorace in genere, de hydrope saccorum pleurae, mediastini, et oedemate pulmonum in specie. p. 675 — 720.

- De hydrothorace in genere.* §. LIII. p. 675.
Definitio. 1.
Literatura. 2.
Divisio. 3.
Ordo noster. 4.
- De hydrope cavitatum pleurae.* §. LIV. p. 678.
Definitio. 1.
Literatura. 2.
Divisio. 3.

Sympto-

- Symptomata hydropis
saccorum pleurae chronici. 4.
Autopsia cadaverum. 5.
Causae. 6.
Diagnosis. 7.
Prognosis. 8.
De hydropse mediastini. §. LV.
p. 699.
Definitio. 1.
Literatura. 2.
Symptomata. 3.
Causae. 4.
Diagnosis. 5.
Prognosis. 6.
De hydropse pulmonum. §.
LVI. p. 702.
Definitio. 1.
Literatura. 2.
Symptomata. 3.
Autopsiae cadaverum. 4.
Causae. 5.
Diagnosis et Prognosis. 6.
De cura hydrothoracis. §.
LVII. p. 712.
Generatim. 1.
Causae hydrothoracis
acuti. 2.
hydrothoracis
phthiseos pulmonalis socii.
3.
hydrothoracis
vitiiorum cordis et aortae
socii. 4.
hydrothoracis
ex morbo hepatis. 5.
Paracentesis thoracis. 6.
Terebratio sterni. 7.

CAP. XII.

De laesa respiratione generatim et de dyspnoeis. p. 721
— 755.

De laesa respiratione generatim. §. LVIII. p. 721.

- Doctrinae momentum. 1.
Literatura. 2.
Vocabula technica. 3.
Ordo noster. 4.
De respiratione ut signo.
5.
De dyspnoea. §. LIX. p. 733.
Generatim. 1.
Dyspnoea ex encephalo.
2.
ex vitiis columnae vertebralis. 3.
a vitiis nervorum. 4.
ex vitio cavitationum nasalium et faucium. 5.
ex thorace. 6.
ex musculis. 7.
ex vitiis cavitationum pleurae, mediastini et oesophagi. 8.
ex vitiis laryngis, tracheae et bronchiorum, speciatim de dyspnoea mucosa. 9.
ex vitiis parenchymatis pulmonum. 10.
ex vitiis cordis vasorumque majorum. 11.
ex vitiis viscerum abdominalium. 12.
ex vitiis renum, uteri. 13.

CAP. XIII.

De asthmate. p. 756
— 794.

Definitio. Symptomata. Autopsia cadaverum. §. LX.
p. 756.
Definitio.

Definitio. 1.

Symptomata prodroma.

2.

Autopsia cadaverum. 3.

Causae. §. LXI. p. 760.

Causae praedisponentes.

1.

morbum exci-
tantes. 2.

paroxysmum ex-
citantes. 3.

Causa proxima. 4.

Diagnosis. Prognosis. §. LXII.
p. 767.

Generatim de diagnosi. 1.

Distinctio incubi ab asth-
mate. 2.

suffocationis
spasmodicae
ab asthmate. 3.

croup ab asth-
mate. 4.

phthiseos laryn-
geae et trache-
alis ab asth-
mate. 5.

phthiseos pulmo-
nalis ab asth-
mate. 6.

hydrothoracis ab
asthmate. 7.

vitiorum cordis
et vasorum
majorum ab
asthmate. 8.

De varia asthmatis ori-
gine et indole. 9.

Prognosis. 10.

Cura. §. LXIII. p. 779.

Generatim. 1.

Cura asthmatis inflam-
matorii, prae-
cipue haemor-
rhoidalis. 2.

asthmatis catar-
rhalis. 3.

asthm. arthriti-
ci. 4.

Cura asthmatis gastrici.

5.

asthm. nervei. 6.

Alia auxilia et adversus
dyspnoeam commenda-
ta. 7.

C A P. XIV.

*De tussi generatim
et de catarrho pul-
monum.* p. 795 —
822.

De tussi generatim. §. LXIV.
p. 795.

Definitio. 1.

Literatura. 2.

Divisio. 3.

De tussi aliorum morbo-
rum symptomate. 4.

De tussi morbum per
se constituyente. 5.

De tussi consensuali. 6.

Tussis ex encephalo. 7.

ex dentitione. 8.

ex tonsillis. 9.

ex stomacho. 10.

ex intestinis. 11.

ex hepate. 12.

ex utero. 13.

ex testibus. 14.

ab extremitati-
bus inferiori-
bus. 15.

ex corde et vasis

majoribus. 16.

ex pulmone. 17.

De catarrho pulmonum. §.
LXV. p. 807.

Definitio. 1.

Literatura. 2.

Symptomata. 3.

Causae. 4.

Diagnosis. 5.

Prognosis. 6.

Cura. 7.

C A P.

CAP. XV.

De coqueluche. p.
823—860.

Definitio. Nominis notio. Li-
teratura. §. LXVI. p. 823.

Definitio. 1.

Nominis ratio. 2.

Literatura. 3.

Symptomata. Autopsia cada-
verum. §. LXVII. p. 829.

Symptomata. 1.

Autopsia cadaverum. 2.

Causae. Diagnos. Prognosis. §. LXVIII. p. 834.

Causae. 1.

Diagnos. 2.

Prognosis. 3.

Cura. §. LXIX. p. 844

Prophylaxis. 1.

Cura coqueluche simpli-
cis. 2.

coqueluche inflam-
matorii. 3.

coqueluche gastri-
ci. 4.

coqueluche spas-
modici. 5.

Alia pharmaca. 6.

VOL. II. SECT. 2.

DE MORBIS DIAPHRAGMATIS.

CAP. I.

De vitiis diaphragmatis. p. 3—11.

Diaphragmatis dignitas. Li-
teratura. §. I. p. 3.

Diaphragmatis dignitas.
1.

Literatura. 2.

De vitiis formae, herniis, ru-
ptura, vulneribus et tumori-
bus diaphragmatis. §. II.
p. 5.

Vitia formae, herniae. 1.

Herniae a vulneribus. 2.

Ruptura et vulnera. 3.

Tumores. 4.

Literatura. 2.

Symptomata. Autopsiae ca-
daverum. Causae. §. IV.
p. 14.

Symptomata. 1.

Autopsiae cadaverum. 2.

Causae. 3.

Diagnos. Prognosis. Cura.
§. V. p. 17.

Diagnoseos difficultas. 1.

Distinctio diaphragmiti-
dis ab encephalitide. 2.

diaphragmit. a
pleuritide. 3.

relate ad sedem.
4.

relate ad indo-
lem. 5.

Prognosis. 6.

Cura. 7.

CAP. II.

De diaphragmiti-
de. p. 12—22.

Definitio. Literatura. §. III.
p. 12.

Definitio. 1.

CAP.

CAP. III.

De singultu. p. 22
— 48.

Definitio. Literatura. §. VI.
p. 22.

Definitio. 1.
Literatura 2

Symptomata. Autopsia cada-
verum. §. VII. p. 24.

Symptomata. 1.
Autopsiae cadaverum. 2.

Causae. §. VIII. p. 28.

Causae praedisponentes.
1.
excitantes. 2.

Causa proxima. 3.

Diagnosis. §. IX. p. 34.

Generatim. 1.
Distinctio singultus ab
aliis affectibus. 2.

Singultus symptomati-
cus. 3.
primarius. 4.
traumaticus. 5.
inflammatorius.
6.
rheumaticus. 7.
gastricus. 8.
arthriticus. 9.
atonicus et ner-
veus. 10.

Prognosis. §. X. p. 38.

Prognosis singultus sym-
ptomati. 1.
primarii. 2.

Cura. §. XI. p. 40.

Cura singultus sympto-
matici. 1.
traumatici. 2.
inflammato-
rii. 3.
rheumatici. 4.
gastrici. 5.
arthritici. 6.
atonici et ner-
vei. 7.

DE MORBIS PERICARDII,
CORDIS, ARTERIARUM
ET VENARUM. p. 49.

CAP. IV.

De morbis pericar-
dii, cordis, arte-
riarum et venarum
in genere. p. 51—65.

Doctrinae momentum et hi-
storia. §. XII. p. 51.

Doctrinae momentum. 1.
historia. 2.

Doctrinae difficultas, ordo et
utilitas. §. XIII. p. 62.

Doctrinae difficultas. 1.
ordo. 2.
utilitas. 3.

CAP. V.

De vitiis et ano-
maliis congenitis
pericardii, cordis,
arteriarum et ve-
narum. p. 65—82.

De argumento generatim. §.
XIV. p. 65.

Frequentia. 1.
Literatura. 2.

De vitiis congenitis pericar-
dii et cordis. §. XV. p. 66.

De vitiis congenitis peri-
cardii. 1.
cordis 2.

De vitiis congenitis et anoma-
liis arteriarum et venarum.
§. XVI. p. 73.

De vitiis arteriarum, 1.
venarum. 2.

CAP. VI.

De morbo coeruleo.
p. 83—111.

Definitio. Literaturu. §. XVII.
p. 83.
Defini-

- Definitio. 1.
 Literatura. 2.
Symptomata. Autopsia cada-
verum. §. XVIII. p. 86.
 Symptomata. 1.
 Autopsia cadaverum. 2.
Caussae. §. XIX. p. 99.
 Causae praedisponentes.
 1.
 excitantes. 2.
 Causa proxima. 3.
Diagnosis. §. XX. p. 103.
 Divisio. 1.
 Morbus coeruleus car-
 diacus. 2.
 pulmonalis. 3.
 encephalicus.
 4.
 Monitum. 5.
Prognosis. Cura. §. XXI. p. 107.
 Prognosis. 1.
 Cura. 2.

CAP. VII.

De pericarditide.
p. 112 — 155.

- Definitio. Literatura.* §. XXII. p. 112.
 Definitio. 1.
 Literatura. 2.
Symptomata. Autopsia cada-
verum. §. XXIII. p. 114.
 Symptomata. 1.
 Autopsia cadaverum. 2.
Caussae. §. XXIV. p. 129.
 Praedisponentes. 1.
 Excitantes. 2.
Diagnosis. §. XXV. p. 140.
 Facilis confusio. 1.
 Distinctio a peripneumo-
 nia. 2.
 Illorum morborum com-
 plicatio. 3.
 Distinctio a cynanche
 faucium. 4.
 Sedes pericarditidis. 5.

- Inflammatiō pericardii.
 6.
 substantiae mus-
 cularis. 7.
 cavitatum. 8.

- Monitum. 9.
 De pericarditidis indole.
 10.
 Distinctio necessaria. 11.

- Prognosis.* §. XXVI. p. 150.
 Generatio. 1.
 Varii exitus. 2.
 Resolutio. 3.
 Mors praeceps. 4.
 Hydrops acutus purulen-
 tus. 5.
 Pseudomembranae. 6.
 Gangraena. 7.

- Cura.* §. XXVII. p. 153.
 Prophylaxis. 1.
 Cura morbi. 2.

CAP. VIII.

De symphysi car-
diaca. p. 156 — 168.

- Definitio. Literatura.* §. XXVIII. p. 156.
 Definitio. 1.
 Literatura. 2.

- Autopsia cadaverum. Sym-*
tomata. §. XXIX. p. 158.
 Autopsia cadaverum. 1.
 Symptomata. 2.

- Diagnosis.* §. XXX. p. 163.
 Illius fontes. 1.
 Facilis confusio. 2.
 Distinctio a pericarditide
 chronica. 3.
 ab aliis vitiis pe-
 ricardii et tu-
 moribus ex-
 ternis. 4.

- Prognosis. Cura.* §. XXXI. p. 166.
 Prognosis. 1.
 Cura. 2.

CAP.

CAP. IX.

De hydropericardia. p. 168 — 189.

Definitio. Literatura. Divisio. §. XXXII. p. 168.

Definitio. 1.

Literatura. 2.

Divisio. 3.

Symptomata. Autopsia cadaverum. Causae. §. XXXIII. p. 172.

Symptomata. 1.

Autopsia cadaverum. 2.

Causae. 3.

Diagnosis. §. XXXIV. p. 182.

Monitum. 1.

Varietas symptomatum. 2.

Complicatio cum aliis vitiis cordis. 3.

Hydropericardia solitaria et complicata. 4.

Distinctio a symphysi cardiaca. 5.

a morbis ductus thoracici. 6.

Hydatides cordis. 7.

Prognosis. Cura. §. XXXV. p. 188.

Prognosis. 1.

Cura. 2.

CAP. X.

De polypo cordis. p. 190 — 211.

Definitio. Literatura. §. XXXVI. p. 190.

Definitio. 1.

Literatura. 2.

Symptomata. Autopsia cadaverum. §. XXXVII. p. 196.

Symptomata. 1.

Autopsiae cadaverum. 2.

Causae. §. XXXVIII. p. 201.

Praedisponentes. 1.

Excitantes. 2.

Proxima. 3.

Diagnosis. §. XXXIX. p. 205.

Distinctio. 1.

Symptomatum incertitudo. 2.

De sede polypi. 3.

Vermes cordis. 4.

Prognosis. Cura. §. XL. p. 210.

Prognosis. 1.

Cura. 2.

CAP. XI.

De lithiasi pericardiaca atque de angore pectoris. p. 212 — 252.

De sede speciali lithiasis pericardiaca. §. XLI. p. 212.

Lithiasis pericardii. 1.

universae substantiae cordis. 2.

septi ventriculorum. 3.

ventriculorum et auricularum.

4.

valvularum. 5.
arteriarum coronariarum. 6.

Observatio. 7.

Symptomata. §. XLII. p. 218.

Generatim. 1.

Symptomata lithiaseos valvularum.

2.

lith. arteriarum coronariarum.

3.

Causae. §. XLIII. p. 227.

Lithiaseos pericardiaca generalis. 1.

arteriarum coronariarum. 2.

Diagnosis. Prognosis. §. XLIV. p. 230.

Diagnosis generatim. 1.

Diagno-

- Diagnosis angoris pectoris. 2.
 Facilis confusio. 3.
 Distinctio ab incubo. 4.
 ab asthmate. 5.
 a polypo cordis. 6.
 Frequentes complicationes. 7.
 Origo angoris pectoris. 8.
 Prognosis. 9.
 Cura. §. XLV. p. 242.
 Generatim. 1.
 Regimen diaeteticum. 2.
 Evacuationes sanguinis. 3.
 Eccoprotica et carminativa. 4.
 Derivantia. 5.
 Cardiaca et nervina. 6.
 Stomachica. 7.
 Diuretica. 8.
 Acidum phosphoricum, aqua calcis, gaz oxygenium? 9.
 Monitum. 10.

CAP. XII.

De cordis volumine et capacitate auctis et imminutis.
 p. 252 — 282.

- De volumine cordis aucto, speciatim per incrassationem substantiae muscularis.* §. XLVI. p. 252.
 Exempla. 1.
 Distinctio. 2.
 Symptomata incrassationis substantiae cordis. 3.
 Caussae incrassationis substantiae cordis. 4.
 Diagnosis incrassationis substantiae cordis. 5.
 Cura incrassationis substantiae cordis. 6.

De volumine cordis imminuto speciatim ab extenuatione substantiae muscularis. §. XLVII. p. 257.

- Exempla. 1.
 Distinctio. 2.
 Symptomata extenuationis substantiae cordis. 3.
 Autopsiae cadaverum. 4.
 Caussae. 5.
 Diagnosis. 6.
 Prognosis. 7.
 Cura. 8.

De capacitate cavitatum cordis aucta cum incrassatione substantiae. §. XLVIII. p. 263.

- Visceris universi. 1.
 Ventriculi sinistri. 2.
 dextri. 3.
 Auricularum. 4.

De capacitate cavitatum cordis aucta cum extenuatione substantiae. §. XLIX. p. 268.

- Visceris universi. 1.
 Ventriculi sinistri. 2.
 Ventriculus dexter. 3.
 Auricula dextra. 4.
 sinistra. 5.

Monita circa diagnosin dilatationis cordis. §. L. p. 272.

- Generatim. 1.
 Signa generalia dilatationis cordis. 2.
 Facilis error. 3.

Monita circa prognosin et curam dilatationis cordis. §. LI. p. 277.

- Prognosis. 1.
 Cura. 2.

De capacitate cavitatum cordis imminuta, speciatim de angustatione ostiorum. §. LII. p. 279.

- Generatim. 1.
 Angustatio ex vitio membranae internae cordis. 2.
 Angu-

Angustatio ex vitio lim-
borum. 3.
ex vitiis valvu-
larum. 4.
Symptomata generalia. 5.
Diagnosis. 6.
Prognosis. 7.
Cura. 8.

CAP. XIII.

*De dislocatione,
prolapsu et ruptu-
ra cordis.* p. 283 —
295.

*De dislocatione et prolapsu
cordis.* §. LIII. p. 283.
Distinctio. 1.
Exempla. 2.
Symptomata. 3.
Diagnosis. 4.
Prognosis. 5.

De ruptura cordis. §. LIV.
p. 288.
Exempla. 1.
Caussae. 2.
Diagnosis. 3.
Animadversiones. 4.

CAP. XIV.

*De inflammatione
arteriarum, praeci-
pue aortae.* p. 295 —
308.

*Historia doctrinae. Sympto-
mata.* §. LV. p. 295.
Historia doctrinae. 1.
Symptomata. 2.
*Autopsiae cadaverum. Caus-
sae.* §. LVI. p. 299.
Autopsia cadaverum. 1.
Caussae. 2.
Diagnosis. Prognosis. Cura.
§. LVII. p. 305.
Diagnosis. 1.

Prognosis. 2.
Cura. 3.

CAP. XV.

*De lithiasi arte-
riarum.* p. 308—317.

Sedes. Symptomata. §. LVIII.
p. 308.

Sedes. 1.
Symptomata. 2.
Caussae. Diagnosis. §. LIX.
p. 314.

Caussae. 1.
Diagnosis. 2.
Prognosis. Cura. §. LX.
p. 316.

Prognosis. 1.
Cura. 2.

CAP. XVI.

*De aneurysmate,
praecipue aortae.*
p. 318—366.

Definitio. Literatura. §. LXI.
p. 318.

Definitio. 1.
Literatura. 2.

Symptomata. §. LXII. p. 323.
Generatim. 1.

Symptomata aneurysma-
tum externo-
rum. 2.
aneurysmatis in-
terni. 3.

Autopsiae cadaverum. §.
LXIII. p. 328.

Aneurysma ipsum. 1.
Partes contiguae. 2.

Caussae. §. LXIV. p. 340.
Praedisponentes. 1.

Excitantes. 2.
Proxima. 3.

Diagnosis. §. LXV. p. 345.
Divisio. 1.

Indicia

Indicia aneurysmatis aor-
tae. 2.

Facilis confusio. 3.

Distinctio ab aneurys-
mate caroti-
dis et arteriae
subclaviae. 4.

ab angore pecto-
ris. 5.

a dilatatione cor-
dis. 6.

a varice venae ju-
gularis. 7.

ab aliis colli tu-
moribus. 8.

a phthisi trache-
ali. 9.

a phthisi pulmo-
nali. 10.

a vitiis venae
azygae. 11.

a morbis colu-
mnae verte-
bralis et re-
nalem. 12.

Monitum. 13.

Prognosis. §. LXVI. p. 359.

Sanatio spontanea. 1.
artificialis. 2.

Ruptura. 3.

Alii interitus modi. 4.

Monitum. 5.

Cura. §. LXVII. p. 364.

Aneurysmatis externi. 1.
interni. 2.

CAP. XVII.

*De motibus cordis
et arteriarum, vi-
tia illarum partium
organica simulan-
tibus.* p. 367—388.

*Introductio. Definitiones. Li-
teratura.* §. LXVIII. p. 367.

Introductio. 1.

Definitiones. 2.

Literatura. 3.

*Symptomata. Autopsiae cada-
verum.* §. LXIX. p. 371.

Symptomata. 1.

Autopsiae cadaverum. 2.

Caussae. §. LXX. p. 371.

Caussae praedisponentes.
1.

excitantes. 2.

Diagnosis. Prognosis.

LXXI.

p. 377.

Diagnosis. 1.

Plethora. 2.

Sensibilitas morbose, de-
bilitas et cachexia. 3.

Affectio viscerum dissi-
torum. 4.

Cerebrum et medulla spi-
nalis. 5.

Trachea et pulmones. 6.

Viscera abdominalia. 7.

Complicatio. 8.

Prognosis. 9.

Cura. §. LXXII. p. 383.

Cura morbi ex plethora.
1.

ex sensibilitate
nimia. 2.

ex debilitate. 3.

ex cachexia. 4.

ex affectione
viscerum ab-
dominalium.

5.

CAP. XVIII.

De phlebitide. p. 389.

— 407.

Definitio. Literatura. §.
LXXIII. p. 389.

Definitio. 1.

Literatura. 2.

*Symptomata. Autopsiae ca-
daverum.* §. LXXIV. p. 391.

Symptomata generatim.
1.

localia. 2.

universalia. 3.

Autopsiae cadaverum. 4.

Caussae

Caussae. §. LXXV. p. 394.
 Phlebotomia. 1.
 Amputatio. 2.
 Excisio varicum et applicatio hirudinum. 3.
 Ligaturae venarum et funiculi umbilicalis. 4.
 Partus. 5.
 Inflammatio partium contiguarum. 6.
 Irritamenta mechanica et chemica. 7.
Diagnosis. §. LXXVI. p. 399.
 Monitum. 1.
 Facilis confusio. 2.
 Distinctio ab arteritide. 3.
 ab inflammatione vasorum lymphaticorum. 4.
 ab inflammatione nervi. 5.
 a typho. 6.
 ab aliis morbis cum pure in venis. 7.
Prognosis. §. LXXVII. p. 401.
 Periculum. 1.
 Exitus. 2.
 Resolutio. 3.
 Exulceratio. 4.
 Occlusio. 5.
Cura. §. LXXVIII. p. 405.
 Morbi localis. 1.
 universalis. 2.

CAP. XIX.

De varicibus. p. 408
 — 421.

Definitio. Literatura. §. LXXIX. p. 408.
 Definitio. 1.
 Literatura. 2.
Symptomata. Autopsiae cadaverum. §. LXXX. p. 410.
 Symptomata varicum externarum. 1.
 Frank Prax. II. 2. 2.

Symptomata varicum internarum. 2.
 Autopsiae cadaverum. 3.
Caussae. §. LXXXI. p. 411.
 Praedisponentes. 1.
 Excitantes. 2.
 Proxima. 3.
Diagnosis. Prognosis. §. LXXXII. p. 415.
 Diagnosis. 1.
 Prognosis. 2.
Cura. §. LXXXIII. p. 419.
 Varicis externae. 1.
 internae. 2.

CAP. XX.

De haemorrhagiis.
 p. 421 — 448.

Definitio. Literatura. §. LXXXIV. p. 421.
 Definitio. 1.
 Literatura. 2.
Symptomata. Autopsiae cadaverum. §. LXXXV. p. 428.
 Symptomata prodroma. 1.
 constituentia. 2.
 Autopsiae cadaverum. 3.
Caussae. §. LXXXVI. p. 430.
 Praedisponentes. 1.
 Excitantes. 2.
 Proxima. 3.
Diagnosis. §. LXXXVII. p. 431.

Diagnosis sanguinis. 1.
 haemorrhagiarum internarum. 2.

Divisio haemorrhagiarum in primarias et symptomáticas. 3.

Haemorrhagiae traumaticae. 4.
 ex obstaculis mechanicis. 5.
 inflammato-
 riae. 6.
 rheumaticae. 7.

b

Ilac-

Haemorrhagiae gastricae. 8.
arthriticae. 9.
scorbuticae. 10.
atonicae. 11.
nervaeae. 12.

Monitum. 13.

Prognosis. §. LXXXVIII. p. 439.

Boni effectus. 1.

Obstacula. 2.

Mali effectus. 3.

Succurrens natura. 4.

Cura. §. LXXXIX. p. 442.

Quando haemorrhagiae sistendae sint nec ne. 1.

Cura haemorrhagiarum traumaticarum. 2.

ex obstaculis mechanicis et ex consensu. 3.

haemorrhagiae inflammatoriae. 4.

haemorrhagiarum rheumaticarum et arthriticarum. 5.

haemorrhagiae scorbuticae. 6.

atonicae. 7.

nervosae. 8.

Fasciae. 9.

Transfusio sanguinis. 10.

DE ANIMI DELIQUIIS.

p. 449.

CAP. XXI.

De animi deliquiis in genere. p. 451 — 465.

Definitio. Varii morbi gradus. §. XC. p. 451.

Definitio. 1.

Varii morbi gradus. 2.

Literatura. Rerum ordo. §. XCI. p. 452.

Literatura de lipothymia et syncope. 1.
de morte putativa. 2.

Ordo rerum. 3.

Diagnosis. §. XCII. p. 459.

Mors simulata. 1.

Distinctio a morte. 2.
animi deliquii ab apoplexia. 3.

Prognosis. Cura. §. XCIII. p. 462.

Prognosis. 1.

Cura. 2.

CAP. XXII.

De animi deliquiis nerveis. p. 466—491.

Ex violentiis mechanicis systemati nervoso illatis. §. XCIV.

p. 466.

Violentiae externae. 1.
internae. 2.

Cura. 3.

Ex idiosyncrasia, imaginatione, animi pathematibus doloribus, voluptate et inanitione. §. XCV. p. 470.

Idiosyncrasia. 1.

Inaginatio, animi pathematata, dolor et voluptas. 2.

Inanitio. 3.

Cura. 4.

Ex gelu. §. XCVI. p. 473.

Notio. 1.

Symptomata. 2.

Cura. 3.

Ex calore et electricitate. §. XCVII.

p. 475.

Calor. 1.

Electricitas. 2.

Liter

Literatura. 3.
Symptomata. 4.
Autopsiae cadaverum. 5.
Causae. (6) 7.
Diagnosis. 8.
Prognosis. 9.
Cura. 10.

A miasmate, contagio et narcoticis. §. XCVIII. p. 483.

Miasma. 1.
Contagium. 2.
Narcotica. 3.

A vaporibus carbonum. §. XCIX. p. 485.

Notio. 1.
Symptomata. 2.
Autopsiae cadaverum. 3.
Causae occasionales. 4.
Diagnosis. 5.
Prognosis. 6.
Cura. 7.
Alii vapores. 8.

C A P. XXIII.

*De animi deliquiis
pneumaticis.* p. 491
— 518.

*Ex impedito ad pulmones re-
cens natorum aeris accessu.*
§. C. p. 491.

Notio. 1.
Causae. 2.
Cura. 3.

Ex submersione in aquis. §. CI. p. 493.

Notio. 1.
Literatura. 2.
Symptomata. 3.
Autopsiae cadaverum. 4.
Causa proxima. 5.
Diagnosis. 6.
Prognosis. 7.
Cura. 8.

Ex suspensione. §. CII. p. 511.

Literatura. 1.
Symptomata. 2.
Autopsiae cadaverum. 3.

Causa proxima. 4.
Prognosis. 5.
Cura. 6.

*Ex corporibus extraneis in
trachea et oesophago.* §. CIII.
p. 513.

Notio. 1.
Symptomata. 2.
Causae. 3.
Prognosis. 4.
Cura. 5.

Ex variis gaz. §. CIV. p. 515.

Notio. 1.
Gaz acidum carbonicum.
2.
hydrogenium. 3.
carboni, sul-
phuri, phospho-
ro, ammoniae,
nuptum. 4.

C A P. XXIV.

*De animi deliquiis
cardiacis.* p. 518 —
522.

*Ex impedito in recens natis
sanguinis circuitu.* §. CV.
p. 518.

Notio. 1.
Vitia conformationis. 2.
Inertia cordis. 3.
Impedimenta circuitus
sanguinis. 4.

*Ex morbis cordis, vasorum
et haemorrhagiis.* §. CVI.
p. 521.

Morbi cordis. 1.
Vasa. 2.
Haemorrhagiae. 3.

ADDENDA. p. 523.

*Ad partis secundae,
Vol. II. Sect. I.* p. 523
— 533.

ad Cap. I. de morbis la-
ryngis etc. (p. 3 — 8).
p. 523.
ad

- ad Cap. II. de vitiis ve-
cis et loquelae (p. 8
— 71). p. 523.
- ad Cap. III. de croup
(p. 72—194). p. 523—25.
- ad Cap. IV. de phthisi
laryngea et tracheali
(p. 195—221). p. 525
— 27.
- ad Cap. V. de thyreoiti-
de (p. 222—225). p. 528.
- ad Cap. VI. de struma
(p. 226—264). p. 528
— 30.
- ad Cap. VII. de vitiis
thecae thoracicae etc.
(p. 267—287). p. 530.
- ad Cap. VIII. de peri-
pneumoniis (p. 288—
408). p. 530.
- ad Cap. X. de phthisi
pulmonali (p. 477—
674). p. 531. 32.
- ad Cap. XI. de hydro-
thorace (p. 675—720).
p. 532.
- ad Cap. XII. de laesa re-
spiratione etc. (p. 721
— 755). p. 532.
- ad Cap. XIII. de asthi-
mate (p. 756—794). p.
532. 33.
- ad Cap. XIV. de tussi
generatim (p. 795—
822). p. 533.
- ad Cap. XV. de coque-
luche (p. 823—860).
p. 533.
- Ad partis secundae,
Vol. II. Sect. II.* p. 533
— 542.
- ad Cap. I. de vitiis dia-
phragmatis (p. 3—11).
p. 533.
- ad Cap. II. de diaphragmi-
tide (p. 12—22). p. 533
34.
- ad Cap. V. de vitiis et
anomaliis congenitis pe-
ricardii etc. (p. 65—82).
p. 534—36.
- ad Cap. VI. de morbo coe-
ruleo (p. 83—111). p. 536.
- ad Cap. VII. de pericarditi-
de (p. 112—153). p. 536
— 39.
- ad Cap. XII. de cordis vo-
lumine et capacitae auct.
et immin. (p. 252—282).
p. 539.
- ad Cap. XIII. de disloca-
tione, prolapsu et ru-
ptura cordis (p. 283—
295). p. 539.
- ad Cap. XIV. de inflamma-
tione arteriarum etc. (p.
295—308). p. 539. 40.
- ad Cap. XVI. de aneurys-
mate etc. (p. 308—366).
p. 540.
- ad Cap. XVII. de motibus
arteriarum etc. (p. 367
— 388). p. 540. 41.
- ad Cap. XVIII. de phlebi-
tide (p. 389—407). p. 541.
- ad Cap. XX. de haemor-
rhagiis (p. 421—448).
p. 541.
- ad Cap. XXI. de animi
deliquiis (p. 451—465).
p. 541.
- ad Cap. XXII. de animi
deliquiis nerveis (p. 466
— 491). p. 541. 42.
- ad Cap. XXIII. de animi
deliquiis pneumaticis (p.
491—518). p. 542.

DE MORBIS
DIAPHRAGMATIS.

CAPUT I.

De vitiis diaphragmatis.

§. 1.

Diaphragmatis dignitas. Literatura.

1. **Q**uamvis cum pristinis physiologis diaphragma non amplius pro centro animi pathematis dignitas habere possimus, atque plurima phaenomena, quae illi hoc sub respectu tribuebantur, cordi potius et plexui nervorum epigastrico adscribenda sint; attamen tantum est imperium cepti transversi in opus inspirandi, expirandi, respirandi, oscitandi, tussiendo, sternutandi, ridendi, flendi, vagitandi, singultandi, odorandi, loquendi, cantandi, ejulandi, sugiendi, digerendi, vomendi, alvum et urinam evacuandi, partum excludendi, variosque nisus perficiendi, et illud omni medicorum practicoꝝ attentione dignum sit.

2. De diaphragmate, inprimis morboſo, prae-Literatura scriptores infra citandos ¹⁾ egerunt: PARISARA.
A 2 NI ²⁾,

1) Cap. II et III.

oesophagi ²⁷⁾ et venae cavae ²⁸⁾ dicatorum, aut cum illorum foraminum defectu ²⁹⁾; cum foraminibus plurimis ³⁰⁾, quorum unum alterumque venis abnormiter decurrentibus ³¹⁾ inserviebat aut alienum locum occupabat ³²⁾. Foramina haec interdum *herniis diaphragmatis* locum concedunt. Visa enim sunt per foramina haec diaphragmatis in cavum pectoris transivisse, in embryone — ventriculum, lienem, duodenum cum parte hepatis et omenti ³³⁾; in viro diuturna alvi obstructione et vehemente vomitu laborante — omentum, portionem pancreatis, ventriculum duodenum et magnam coli partem ³⁴⁾; in aliis null

27) MORGAGNI Epist. XXXVII. N. 10.

28) Idem Epist. LIV. N. 37.

29) BÜTTNER et ISENFLAMM l. c.

30) MORGAGNI Epist. LXIV, N. 2. — Epist. LXX. N. 10. Epist. LXXVII. N. 14.

31) Idem Epist. V. N. 6. 9 (Vena hepatis quae jam sub diaphragmate sese in cavam deplere debuisset, in supra efficit). Epist. LX. N. 6. (Duae venae abnormes per duo foramina contra naturam assurgebant).

32) MORGAGNI v. HALLER de corp. humani fabrica T. VI. p. 136. (Foramen pro Aorta in parte tendinosa)

33) STEHELIN Tentamen med. Thes. 3. — MORGAGNI Epist. LIV. N. 11. Cfr. OTTO *Handb. d. pathol. Anat. tomie* p. 215. et ejusdem *Monstr. sex anat. et phys.* disqu. p. 15.

34) BARTHOLINUS hist. Anat. rar. Cent. VI. hist. LV. T. III. p. 288. Cfr. CLAUDER in BONETI *Sepulch. Anat.* Lib. III. Sect. 8. Obs. 27. — Ejusd. *epistol.*

nullo respirationis vitio affecto — ventriculū situm pulmonis dextri (qui desiderabatur) occupantem³⁵); in tertio — intestinum colon, redux per alterum foramen ad abdominis cavum³⁶); in infante bienni a nativitate aegrotante — omnia viscera abdominalia cum mesenterio³⁷); in sene vulnere capitis defuncto — intestinum colon³⁸); — in alio etiam prius sano — intestinum tenue³⁹).

2. Communissimae autem sunt *herniae diaphragmatis a vulneribus excitatae*. Harum culpa ^{Herniae a vulneribus.} penetrarunt ad cavum pectoris: *ventriculus*⁴⁰);
pars

MARCUM RUYSCH de obs. practico anatomico mirabili. Pat. 1661.

35) RIVERII Observ. medic. Cent. IV. Obs. 67. — BONETI Sepulchr. Anat. l. c. Obs. 27. §. 2.

36) CHAUVET in *mémoires de l'acad. R. des sciences de Paris*. 1729. Obs. Anat. 2.

37) CAROL HUIJT in *Philosoph. Transact.* N. 277. — Acta Eruditor Lipsiens. 1762. Mens. Decembr. — LESKE's *Muserles. Abh. aus d. philos. Trans.* I. B. p. 133. Casus similes in monstris narrantur a LEMERY in *mém. de l'acad. R. des sc.* 1729. et a DUVERNOY in Comment. Acad. Scient. Imp. Petropol. T. III.

38) LEPROTTE in MORGAGNI op. c. Epist. LIV. N. 2.

39) VETTER l. c.

40) FANTONI Obs. Anat. med. select. XXIII. DERRE-CAGOIX *Journ. de chir. p. DESAULT.* T. 3. — RICHTER's *chirurg. Biblioth.* 13. B. p. 430. SENNERTUS *Prax. Lib. II. P. 2. C. 15. L. V. P. 4. C. 3.* SCHENK Obs. med. Lib. II. Obs. 258, p. 509. MOEBII fundam.

pars illius sinistra simul cum *duodeno* et *colon* ⁴¹⁾; ille totus cum *omento* et *pancreate* ⁴²⁾;
inte-

med. physiol. Cap. X. — FABRICII HILDANI Diss. Chir. Cent. II. Obs. 33. — BONETI Sepulchr. Anat. Lib. II. Sect. I. Obs. 144. Lib. IV. Sect. XII. Obs. 23. — BLANCARD Anat. pract. ration. Cent. I. Obs. 2. p. 3. Obs. 70. p. 152. Cent. II. Obs. 9. p. 206. — VALENTINI chir. med. Francof. 1715. Sect. 2. C. 5. — Bresl. Samml. 1723. p. 562. KIRSCHBAUM de hernia ventriculi. Argent. 1749. in HALLERI Coll. disp. chir. T. III. N. 69. — HALLERI elem. physiol. T. VI. p. 118. — KLINKOSCH diss. de herniarum divisione novaeque herniae ventralis speciei. Prag. 1764. In diss. med. select. Pragens. quas collegit et edidit Jos. THAD. KLINKOSCH. Prag. 1775. T. I. N. 11. — MORGAGNI Epist. LIV. N. 12. — LIEUTAUD hist. anat. med. Lib. I. Sect. 2. Obs. 219. T. I. p. 73. — VAN GEUNS *Verhandeling. van de Holl. Maatsch. Deel VIII. St. I.* p. 169. THURNEISEN Diss. de hernia ventriculi. Basil. 1777. — SANDIFORT Obs. anat. pathol. Lib. IV. C. 5. p. 48. — PLOUQUET enumeratio herniarum tam genuinarum quam spuriarum. Tubing. 1789. — DESAULT *Auserles. chirurg. Wahrnehm.* 5. B. p. 9. J. CLARKE in *transact. of a Soc. for the improvement of med. and chir. Knowledge.* Lond. 1802. Vol. 2. N. 8.

- 41) GLANDROP in BONETI Sepulchr. Anat. Lib. III. Sect. 3. Obs. 21. N. 9. Similes observationes obveniunt apud PARAEUM Opp. Lib. IX. C. 30. — MURS Prax. med. chir. Lond. 1682. Dec. V. Obs. 2. — FOTHERGILL in *Philos. Transact.* N. 478. — KNOBLOCH diss. de externa merocele incarcerata. Lugd. Bat. 1794.
- 42) BAUSCH de lapide haematide. Lips. 1665. LIEU-

*intestina tenuia*⁴³⁾; *jejunum, ileum, et colon*⁴⁴⁾; *colon cum portione omenti et lobo sinistro hepatis*⁴⁵⁾; *solum colon*⁴⁶⁾; *hepar*⁴⁷⁾, et *vesicula fellea* hydatidibus referta⁴⁸⁾.

3. Nec desunt exempla *rupti diaphragmatis*⁴⁹⁾ sub nisu vehemente corporis, imprimis sub<sup>Ruptura et vuln-
ra.</sup> partu⁵⁰⁾, vomitu⁵¹⁾, lapsu⁵²⁾, saltu⁵³⁾, resistentia

TAUD l. c. L. I. Sect. 2. Obs. 208. T. I. p. 70. MACAULAY in *med. obs. and inquiries. Vol. I. Obs. 4 et 5.* p. 25.

43) HENR. AB HEER v. BONETI Sepulchr. Anat. l. c. §. 3.

44) PREISS in *Salzb. med. chir. Zeitung.* 1798. 4. B. p. 265. (In viro 77. annor. a nonnullis annis vertigine, ructibus, crampo ventriculi et vomitu laborante. Intestina, ubi per fissuram diaphragmatis transiebant, angustata erant. Causa verisimilis herniae lapsus ante viginti annos peressus).

45) CLARKE in *med. and chirurg. Transact.* 1800. Vol. 2. p. 118. — FRIESE's *Annalen d. Brittischen Arzneykunde.* 1. B. 2. St. p. 219. Tab. I et II.

46) PAREUS l. c. LIEUTAUD l. c. Lib. I. Sect. 4. Obs. 510. 511. T. I. p. 154. PLENK *Samml. v. Beobacht. über Gegenstände d. Wundarzneykunde.* Wien 1769. I. Th. N. 5.

47) BLEGNY Zodiac. Gallic. 1682. p. 38.

48) SIMMONS *med. Communications.* Vol. I. N. 5.

49) *Mém. de l'ac. R. des sc. de Paris* 1733. p. 513.

50) PERCY l. c. p. 217. (Facies cadaveris omnino mutata).

51) ST. ANDRÉ v. PERCY l. c. p. 218.

52) PERCY l. c. (Facies cadaveris veluti videns, viscera

stentia adversus grave onus obviam ruens ⁵⁴), — ab ictu ⁵⁵), praesertim dorso inflicto ⁵⁶). Symptomata rupti sic diaphragmatis sunt; facies ad risum composita et abdomen complanatum. Nisi ruptura diaphragmatis illico necet, quod licet rarissime contingere potest ⁵⁷); aegri alvi perti-
naci obstructione, angustiis continuis, lipothy-
miis crebris, vomitu quotidiano, doloribus con-
stantibus pectoris et abdominis excruciantur ⁵⁸).
Vulnera alia diaphragmatis omnino chirurgiae
sistunt objectum; sufficiat hinc meminisse quod
ut plurimum, at non semper ⁵⁹), symptomatibus
diaphragmitidis stipantur.

4. Po-

abdominis in cavum thoracis irruerunt, et abdo-
men complanatum erat.)

53) PERCY l. c. p. 219. Cfr. GODEFROY in *Journal de
méd. de M. M. CORVISART, LEROUX et BOYER. An
IX. Mois de Nivose.*

54) PERCY l. c. (Ventriculus, fere omnia intestina,
lien, mesenterium, omentum in cavum thoracis ir-
ruerant, quo aperto ventriculus prosiluit. Volumen
thoracis auctum erat, ac abdomen depressum, com-
planatum ita ut columna vertebralis facile tactu per-
ciperetur).

55) PERCY l. c. p. 222. (Commissurae labiorum versus
aures retractae erant, dentibus in propatulo).

56) BOHN v. PERCY l. c.

57) PERCY l. c. p. 223.

58) Idem l. c.

59) PLENK *Samml. von Beobachtungen.*

4. Postremo non ignorandum, diaphragma Tumores, (praeter reliquias inflammationis, alibi describendas ⁶⁰)) aliquando duritiem cartilagineam ⁶¹), indolem osseam ⁶²), concretiones terreas ⁶³), tubercula et tumores ⁶⁴), imprimis sarcomatosos ⁶⁵) et exanthemata ⁶⁶) exhibuisse.

CAPUT

60) Cap. II.

61) SCHREIBER Comment. Soc. Petropol. Vol. VII. p. 228. STOLL *Heilungsmethode*. 3. B. 2. St. p. 155.

62) BARTHOLINUS hist. anat. rar. Cent. II. hist. 85. T. I. p. 323. — BLANCARDI anat. pract. rar. Cent. II. Obs. 62. p. 277. MORCAGNI Epist. LXX. N. 5. GUI-
NOT in *Recueil périod. de la Soc. de méd. à Paris*. T. III. N. 16. LEVEILLÉ ib. p. 298.

63) WALTHER Observ. Anat. p. 42. WINSLOW v. TO-
DE *med. Biblioth.* 3. B. 2. St. p. 180.

64) BONET Sepulcr. Anat. Lib. II. Sect. 7. Obs. 92.
GERNER v. LIEUTAUD l. c. Obs. 786. p. 250. COU-
ZIER v. LIEUTAUD l. c. Obs. 783. p. 250.

65) VASLING v. LIEUTAUD l. c. Obs. 784.

66) e. c. peticulas (STOLL l. c.) exanthema indeterminatum (OTTO l. c. p. 217).

CAPUT II.

De diaphragmitide.

§. III.

Definitio. Literatura.

Definitio.

1. **D**olor constrictivus, transversim per abdomen a regione epigastrica secundum longitudinem costarum spuriarum ad columnam vertebralem (modo alterutro in latere, modo utrinque) decurrens, sub inspiratione, alvi et urinae depositione, auctus, cum febre et singultu, de inflammatione diaphragmatis seu *diaphragmitide* ¹⁾ testatur.

2. De

1) *Synon. Paraphrenitis*, quae vox veteribus pro levi delirio indicando inserviebat. *Phrenitis* enim vocabatur in universum omne delirium (Celsus de med. L. III. C. 18.). Recentiores demum aliam phrenitin vocarunt *idiopathicam*, quae ex cerebro ipsiusque membranis oriatur; aliam *sympathicam*, quae ex diaphragmate aliisque partibus originem habeat. Veterum loquendi modus, hypothesei superstruebatur, quod diaphragma in mentis mutationem influat, quam hypothesein jam HIPPOCRATES refutasse censetur, ubi ait: „ego quidem nescio, quam potestatem habet diaphragma ad sentiendum et intelligendum.“ Nec vox

2. De hoc morbo scripsere: PETRUS SA-Literatu-
LIUS DIVERSUS ²⁾, ROTH ³⁾, WOLFF ⁴⁾, SCHNEI-^{ra.}
DER ⁵⁾, BRÜNDEL ⁶⁾, EYSELIIUS ⁷⁾, STÜVEN ⁸⁾,
ZWINGER ⁹⁾, SCHULZE ¹⁰⁾, SEGNER ¹¹⁾, GATTEN-
HOF ¹²⁾, BOXBELT ¹³⁾, BEELDSNYDER ¹⁴⁾, FEIN ¹⁶⁾,
SCHROEDER ¹⁷⁾, SAALMAN ¹⁸⁾, RENAULDIN ¹⁹⁾, SA-
WICZ ²⁰⁾.

§. IV.

paraphrenitidis unquam a HIPPOCRATE ad diaphragma-
tis inflammationem designandam usurpata est. Jure
monuit SELLE (Rudimenta pyretologiae method. p.
132.), nomini paraphrenitidis illud diaphragmatidis
substituendum esse.

- 2) De affect. particular. Cap. 8. opusc. p. 262.
- 3) Diss. de inflammatione septi transversi, symptomatis
et curandi ratione. Lips. 1548.
- 4) Diss. de septi transversi inflammatione. Argent. 1661.
- 5) Diss. de inflammatione diaphragmatis seu paraphreni-
tide. Witteb. 1665.
- 6) Diss. de cognatione paraphrenitidis cum febre ma-
ligna. v. Opp. III. p. 62.
- 7) Diss. de paraphrenitide. Erf. 1710.
- 8) Diss. de phrenitide et paraphrenitide. Jen. 1724.
- 9) Diss. de paraphrenitide. Basil. 1731.
- 10) Diss. de paraphrenitide. Hal. 1742.
- 11) Diss. de paraphrenitide. Jen. 1747.
- 12) Diss. de paraphrenitidis ratione et curatione. Hei-
delb. 1758.
- 13) Diss. de paraphrenitide. Lugd. Bat. 1758.
- 14) Diss. de inflammatione diaphragmatis seu paraphre-
nitide. Ultr. 1762.
- 16) Diss. de indole ac sede phrenitidis ac paraphreniti-
dis. Goett. 1765.
- 17) Diss. de inflammatione diaphragmatis. Goett. 1772.

§. IV.

Symptomata. Autopsiae cadaverum. Caussae.

Symptomata. 1. Febris cum aestu magno, pulsu saepe frequente et contracto, interdum pleno et lento ²¹⁾, scenam aperit. Accedit dolor constrictivus, transversim per abdomen, cinguli instar saeviens, in cujus sede describenda, aegrotus propriis manibus decursum diaphragmatis evidenter designat. Designat nimirum epigastrium, ex quo dolor secundum longitudinem costarum usque ad columnam vertebralem decurrit, idque modo in alterutro tantum latere, modo utrinque. Primo in casu, decubitus in latere affecto molestus est, atque hypochondrium ibi compressionem, imprimis superiora versus, respuit. Eo prope examinato, intus et sursum revulsum detegitur ²²⁾. Si diaphragma utrinque laboret, decubitus in dorsum eligitur, ac ambo tunc hypochondria, explorationem recusantia, sursum retracta inveniuntur. Regio epigastrica haud raro excavationem et pulsationem exhibet. Sunt qui de

18) Descriptio phrenitidis ac paraphrenitidis Monasterii in Westphalia. Monast. 1788.

19) *Diction. des sciences médicales*. T. 9. p. 225.

20) Diss. de diaphragmitide. Vilnae 1819.

21) Sic in aegro a. 1819. in Clinico Vilnensi decumbente observavi. v. SAWICZ l. c. Obs. I.

22) „Si septum transversum percutsum est, praecordia sursum contrahuntur.“ CELSUS Lib. V. C. 26. ;

de dolore ad latera colli conquerantur ²³⁾). Respiratio, solo thorace peracta, sublimis, parva, anhelosa, interrupta, suspiriosa est. Praeterea quivis inspirandi; loquendi, tussendi, alvum vel urinam deponendi conatus, dolores adauget. Deglutationem impeditam esse non vidimus, illam vero strepitu quodam circa ventriculum comitatam fuisse, percepimus ²⁴⁾). Malis enumeratis singultus, interdum et vomitus, accedunt. Ingravescente indies morbo, delirium et risus sardonicus superveniunt. Brevi ante mortem symptomatum remissio observari solet ²⁵⁾). Felici in casu diaphragmitis veluti pleuritis desinit.

2. Visum est diaphragma tam vehementer ^{Autopsiae} inflammatum, ut injectoria arte reddi non posset ^{cadave-} rubicundius, idque tum in musculosa sua parte ^{rum.} multa, tum in tendinea universa ²⁶⁾). Praeterea reperiebatur septum transversum obductum pseudomembranis ²⁷⁾; concretum cum basi pulmonum ²⁸⁾),

23) Aeger Clinici Vihensis A. 1819. v. SAWICZ l. c. Obs. 2. (Ex origine et decursu nervorum phrenicorum explicatur iste dolor).

24) SAWICZ Obs. I.

25) HUXHAM Opp. De aëre et morbis epidemicis. A. 1744.

26) HAEN Rat. med. P. IX. C. I. §. 5. C. II. §. 7.

27) Lego in schedis Patris mei: „Die 25. Jun. 1798. cum cadaver Archiducis Austriae MARIAE CHRISTINAE,

num ²⁸⁾, hepate ²⁹⁾, liene ³⁰⁾, aorta aneurysmatica ³¹⁾; obsessum ab ulceribus ³²⁾, a maculis gangraenosis ³³⁾, a concrementis terreis ³⁴⁾, a variis tumoribus ³⁵⁾, ut ab hydatidibus ³⁶⁾. Erat dia-

me praesente aperiretur, vidi diaphragma in ea parte, quae hepatis obversa est, colore quasi tendineo utroque ex latere instructum, tamque crassum ut tres partes pollicis unius aequaret. Filbrae musculares (dissecto illinc diaphragmate) manifeste in medio jacebant, utrinque a *pseudomembrana* lardacea quasi, ac densissima, contactae.“ Similes observationes narrantur a SANDIFORT (Exercit. Acad. L. II. p. 88.) et a JESSEN (in SCHENK obs. med. Lib. II. Obs. 206).

28) FR. HOFFMANN Med. Rat. Syst. T. IV. Sect. 2. C. 6.
STOLL Rat. med. T. II.

29) BARTHOLINI hist. anat. rara. Cent. IV. hist. 20. T. II. p. 265. Cent. VI. Obs. 55. T. III. p. 291. Miscell. Nat. Cur. Dec. II. A. 7. Obs. 252. MORGAGNI Epist. XXXVIII. Art. 34.

30) WINSLOW *traité du bas ventre*. §. 333.

31) MORGAGNI Epist. XL. Art. 29.

32) ANATUS LUSITANUS Curat. med. Cent. VI. Cur. 8.
HAUTESIERK *Recueil d'obs. méd.* T. 2. p. 503. LIEUTAUD hist. anat. med. Lib. II. Sect. 6. Obs. 775. T. II. p. 247. MECKEL *Mém. de l'ac. R. des sc. de Berlin* 1764. p. 87.

33) MORGAGNI op. c. Epist. XXXV. Art. 2.

34) WALTER Obs. anat. p. 42. WINSLOW in TODE *medic. Biblioth.* 3. B. 2. St. p. 180.

35) LIEUTAUD l. c. Obs. 783. 784.

36) Miscell. Nat. Cur. Dec. III. A. I. Obs. 22.

diaphragma quoque hydropicum ³⁷⁾, cartilagineum ³⁸⁾, osseum ³⁹⁾ et peticulis notatum ⁴⁰⁾.

3. Diaphragmitis, interdum epidemica ⁴¹⁾, Caussae. excitari solet, a frigore aestuanti corporis admotum ⁴²⁾, a potu frigido eoque fermentato ingesto, ab evacuationibus sanguinis habitualibus neglectis, a cursu, ab exanthematibus ⁴³⁾, et impetiginibus retropulsis, ne iterum de ruptura et vulneribus dicamus.

§. V.

Diagnosis. Prognosis. Cura.

1. Quid? De vulneribus immo dicendum est, nam nisi ex pathologia vulnerum lux hic ^{D. difficultas.} afful-

37) POHL de hydropo saccato et hydatidibus. Lips. 1747.
in HALLERI Coll. disp. pract. Vol. IV. p. 269.

38) SCHREIBER Comment. Soc. Petropol. Vol. VIII.
p. 228.

39) MORGAGNI Epist. LXX. Art. 5.

40) STOLL l. c.

41) SAGAR A. 1770. diaphragmitidem epidemicam inter rusticos observavit (G. VOGEL Handb. d. prakt. Arzneywissenschaft. 4. Th. K. 10.). Epidemicam quidem non vidi diaphragmitidem, sed annuam constitutionem peculiarem, et hujus morbi evolutioni favere posse, ex eo concludo, quod a. 1819. tria illius exempla in clinico Vilmensi habuerim, cum alias plures anni praeterire soleant, antequam vel unicum invenire liceat.

42) SCHULZE l. c. §. 39.

43) AASKOW Act. R. Soc. Havn. Vol. I. p. 205.

Frank Prax. II. 2. 2

B

affulgeret, de diagnosi diaphragmitidis desperandum foret. Docet autem ea, veteres non errasse, ubi *risum sardonicum* ⁴⁵⁾ inter symptomata diaphragmitidis recenserunt, cum ille risus revera ab affectionibus gravioribus septi transversi non sit alienus, quod aut ex nexu intercostalis cum tertio ramo paris quinti ⁴⁷⁾, aut a connubio nervi phrenici cum pari vago et nervo faciali ⁴⁸⁾, explicatur. Explicatur inde etiam cur risus sardon-

45) Est *risus sardonius* spastica musculorum faciei contractura risum simulans. *Sardonius* dicitur risus, a *herba Sardonis*, quam qui gustarunt, labiis dolore in rictum contractis, veluti ridentes emortui esse *narrantur*.

47) „Quodsi itaque causam simulati hujus risus, qui aegrotis funestum praenuntiari solet exitum, sciscitemur, nullo fere negotio eam a connubio, quod pari est intercostali cum quinta conjugatione, petere possumus.“ SCHULZE l. c. §. 33.

48) „Il n'est pas étonnant que les affections du diaphragme puissent occasionner des convulsions dans les muscles des lèvres, et qu'elles soient en effet souvent la suite des maladies de ce grand muscle. En effet, les nerfs diaphragmatiques communiquent par des filets avec le nerf vague, et celui avec le facial, qui repand ses rameaux dans les muscles des lèvres: leur convulsion peut être un effet de l'affection du nerf diaphragmatique, qui communique aussi avec le facial, au moyen du plexus formé principalement par les quatrième et cinquième paires cervicales, par lesquels la majeure partie des nerfs diaphragmatiques est formée.“ PORTAL *Anat. méd.* T. 4. p. 233.

donicus a vermibus intestinorum oriri possit ⁴⁹⁾. Nec arduum est de *mentis alienatione*, diaphragmitidis interdum comite, per consensum plexus coeliaci (ope nervorum vagorum et intercostalium ⁵⁰⁾ cum cerebro), rationem reddere. Interea dari haud raro diaphragmitides sine risu, sine delirio ⁵¹⁾, quin immo sine solitis hujus

B 2

morbi

49) A. 1786. Obiit in Nosocomio Ticinensi „aeger cum febre petechiali, delirio, risu sardonico, et singultu, stipata: nihilominus diaphragma nullum vestigium inflammationis obtulit, sed copiosi ascarides lumbricoides multaeque saburrae in intestinis tum tenuibus tum crassis inveniebantur.“ (Ex Schedis Patris mei). Cfr. Epitome de cur. hom. morb. T. II. p. 180. (Doleo encephalum hujus viri non fuisse adaptum).

50) „Rationem proinde exquisituris, cur nerveo diaphragmatis centro incenso, continuum delirium, quod infuriosum multoties observatur abire, semper praesto sit, haud obscure videbitur, causam hujus phaenomeni, maxime conferendam esse in mutuum illud commercium, quod diaphragmati per nervos est cum cerebro.“ SCHULZE l. c.

51) BONET (Sepulchr. Anat. Lib. I. Sect. I. Obs. I.) proferit exemplum ubi puellae cujusdam lipothymia subito interemptae cadaveri dissecuit, in cujus carnosae diaphragmatis parte abscessum magnum deprehendit, quae tamen viva nunquam delirio fuit tentata. MORGAGNI (de sed. et caus. morb. Epist. VII. Art. 14.) inquit: „ego tendineam quoque diaphragmatis partem (quam unam maxime attendunt, qui delirium a diaphragmatis inflammatione repetunt) inflammatam, cum vix confusa et subdelira, morbi extremo tempore,

morbi symptomatibus ⁵²⁾ fasti medici abunde docent.

Dist. Dia-
phragmi-
tidis ab
Enceph-
alide.

2. *Diaphragmitis*, quae risu et delirio stipatur, sane confundi posset cum *encephalide*, a qua quondam vix differre credebatur ⁵³⁾; qui tamen error jam diu correctus fuit ⁵⁴⁾. Cacte-

rum

mens fuisset. “ Et HAEN (l. c.) casum refert, ubi septum transversum in musculosa parte multa quidem, sed in tendinea universa, adeo vehementer inflammatum fuit repertum, ut ipsa per artem injectione rubicundior reddi non potuerit; et tamen aeger in morbo non deliraverat, sed ipsam tantummodo sub mortem; pariterque risu sardonico, convulsionibus, furoribusque plane liber fuerat. Idem docuit WENDT (Obs. de pleuritide et peripneum. Sect. Cadav. l. 2. 5.), ubi diaphragma in tribus cadaveribus inflammatum describit, sine delirii, vel risus sardonici mentione. Plures observationes quoque collegit SELLE (l. c.), ex quibus patet, non quidem semper deesse deliria, sed certe non semper et necessario in diaphragmatis inflammatione occurrere.

52) HAEN (l. c. p. 68.) postquam aegri sui historiam enarravit, — ubi nulla nausea, nullus vomitus, observabatur, ac ventriculus omnia pharmaca etsi irritantia perferebat, tandem exclamat! „Quis demum mortalium in hac pleuritide fuisset unquam universi penie diaphragmatis inflammationem suspicatus?“

53) Primus GALENUS inflammato diaphragmate, deliria, non multum a phrenitide diversa produci, dixit (De loc. affect. Lib. V. C. 4). In eadem opinione versabantur BONET (l. c.) et THEOD. ZWINGER (Theatr. prax. med. p. 338.).

54) A LANGIO (Prax. med. C. XIII.) a LAURENT. BEL-

rum non sola diaphragmatis, sed et aliae inflammationes viscerum abdominalium, cerebri affectione simulare solent⁵⁵).

3. Quo pacto *diaphragmitis* a *pleuritide* differt, sequens docet tabula:

Dist. Diaphragm. a Pleuritide.

Diaphragmitis.

Pleuritis.

- | | |
|---|---|
| 1. Dolor sub sterno ad finem costarum.
2. Dolor cinguli instar pectus constringit.
3. Respiratio maxime per musculos pectoris absolvitur. | 1. Dolor ad thoracis latus.
2. Dolor punctorius est.
3. Respiratio maxime per musculos abdominis peragitur. |
|---|---|

4. Sunt qui diaphragmitidem in *tendineam* et *musculosam* dividunt ac, ibi risum, delirium et singultum, hinc vero symptomata mitissima obvenire contendunt, num jure nec ne? ignoramus.

5. Quas observavimus diaphragmitides, indolis erant aut rheumaticae aut metastaticae. Cavendum, ne symptomata nervosa ex solo septi transversi cum cerebro consensu orta, ab indole morbi typhoidea repetamus.

6. Vulnere diaphragmatis difficilis esse, sa- nationis diu constat⁵⁷); atque lethalia habentur

prae-

LINO (opusc. pathol. de pectoris et capitis morbis p. 419.) a BOERHAAVIO (Aphor. §. 900.) alisque.

55) P. III. Vol. I. Sect. II. Cap. de hepatitide.

57) HIPPOCRATES Lib. VI. Aph. 18.

praeprimis quae partem illius tendineam occupant⁵⁸⁾. Quacunque in diaphragmitide singultus, perennes extremorum perfrigerationes, ardores interni, sudores algidi, mali ominis ac factae gangraenae⁵⁹⁾ indicia sunt. Resolutio ut in pleuritide obtinetur.

Cura. 7. Cura morbi indoli adaptanda ab illa pleuritidis haud differt. *Venae sectiones* largae, uno ore, atque jure commendantur⁶⁰⁾.

CAPUT III.

D e s i n g u l t u.

§. VI.

Definitio. Literatura.

Definitio. 1. **I**nspiratio, sub qua concussus thorax celeri impetu una cum abdomine attollitur, aer cum sono acuto per os exploditur, loquentibusque sermo intercipitur, *singultum*¹⁾ constituit.

2. Sin-

58) GALEN in Comment. FORESTUS Lib. VI, Obs. 3.

59) ISENFELAMM *Prakt. Anmerk. über d. Muskeln.* §. 162.

60) CLIFTON WINTRINGHAM de morbis quibusdam Commentarii. T. II. Lond. 1791.

1) GR. *Αγγμός*, seu *Δύγξ* (Gen. *Αγγγός*). Vox LAT. *sin-*

2. Singultus semiotica ab HIPPOCRATE et ^{Literatu-}GALENO perbelle tradita est. Ad therapiam vero quod spectat, fundamentum ALEXANDER TRALLIANUS ²⁾ posuit. Accessere observatores, quorum sedulitati, facta, ad doctrinam universam condendam necessaria, debemus ³⁾. Inserviere illa ad conscribendas dissertationes auctoribus ALBERTI ⁴⁾, KEGLER ⁵⁾, STIMMELIUS ⁶⁾, SENERTUS ⁷⁾, MICHAELIS ⁸⁾, KIESLING ⁹⁾, SEBIZ ¹⁰⁾, HOFMANN ¹¹⁾, SCHENCK ¹²⁾, CROCIUS ¹³⁾, STEINFELS ¹⁴⁾, KINNER ¹⁵⁾, VESTI ¹⁶⁾, VAN REVERHOST ¹⁷⁾,

gultus derivatur a nonnullis ab imitatione soni ipsius singultus, ab aliis ab adverbio *singulatim*, id est unum post alterum. GERM. *Schluchzen*. DIALECTO AUSTRIACA *Der Schnakerl*. GALL. *Hoquet*. ANGL. *Hickup*, *hiccough*. ITAL. *Il singhiozzo*. POL. *Czkawka*. ROSS. *Икота*.

2) Lib. VII.

3) Mentio illorum passim fiet.

4) Diss. de morbis mesenterii et de singultu. Vit. 1578.

Diss. de singultu praecipue puerperarum. Hal. 1738.

5) Diss. de singultu. Basil. 1591.

6) Theses de singultu. Francof. 1606.

7) Diss. de singultu. Viteb. 1624.

8) Diss. de singultu. Lips. 1655.

9) Diss. de singultu. Argent. 1655.

10) Diss. de singultu. Argent. 1659.

11) Diss. de singultu. Jenae 1667.

12) Diss. de singultu. Jenae 1667.

13) Diss. de singultu. Marb. 1669.

14) Diss. de singultu. Marb. 1669.

15) Diss. de singultu. Lugd. Bat. 1686.

HOST ¹⁷⁾, BACHMAYER ¹⁸⁾, BOHN ¹⁹⁾, BOREL-
LUS ²⁰⁾, HOLZ ²¹⁾, ROBEL ²²⁾, STOLTZ ²³⁾,
SCHAEFFELIUS ²⁴⁾, CARTHEUSER ²⁵⁾, BRUNING ²⁶⁾,
THIEL ²⁷⁾, TSCHUTI ²⁸⁾, VAN ROSSUM ²⁹⁾,
SCHEIDT ³⁰⁾. Optimus vero de singultu tracta-
tus, FRIEDERICO HOFFMANNO ³¹⁾ debetur.

§. VII.

*Symptomata. Autopsiae cadaverum.*Sympto-
mata.

1. Hypochondriorum variationem et ventris
tumorem singultum imminentem indicare; HIP-
POCRATES monuerat ³²⁾. Spectat haec observatio
magis ad morbos acutos, quorum symptoma sin-
gultus est, quam ad chronicos. In his enim sin-
gultus

16) Diss. de singultu. Erf. 1691.

17) Diss. de singultu. Lugd. Bat. 1692.

18) Diss. de singultu. Altd. 1695.

19) Diss. de singultu. Lips. 1697.

20) Diss. de singultu. Marb. 1707.

21) Diss. de singultu. Regiom. 1707.

22) Diss. de singultu. Marb. 1707.

23) Diss. de singultu. Regiom. 1707.

24) Diss. de singultu. Gryphisw. 1730.

25) Diss. de singultu. Francf. 1754.

26) Diss. sistens singultum morbum, symptoma, signum.

Ultraj. 1758.

27) Diss. de singultu. Goett. 1761.

28) Diss. de singultu. Basil. 1767.

29) Diss. de singultu. Lovan. 1781.

30) Diss. de singultu. Duisb. 1782.

31) Medicinæ rationalis systema. T. IV. C. 4.

32) Prorrhet. L. I. C. 12.

gultus ut plurimum extemplo ingruit, quod accidit homini, nunc sese moventi et vigilant³³⁾, nunc quiescenti et dormienti³⁴⁾, nunc omni tempore³⁵⁾. Saepe singultus est accidental^{is} et transitorius, alias vero tam immanis, ut totum corpus, ac si costae frangi vellent³⁶⁾, concutiat ac spatium pro libera respiratione et verbis proferendis deneget³⁷⁾, ut impediatur quominus aeger prandere aut dormire possit, utque latratum canis aemuletur³⁸⁾ et ex longinquo audiatur³⁹⁾.

Socia

33) Aegra de qua NELSON SCOTT narrat (DUNCANS *annals of medicine*. Vol. 2. Lustr. II. p. 351. v. *auserles*. *Abhandl. f. pr. Aerzte*. 22. B. 2. St. p. 280.) singultum nunquam sub somno experiebatur.

34) Aegra FR. HOFFMANNI (l. c. Obs. I.) solum noctu, quousque dormiebat, singultui obnoxia erat, quo primum vero excitabatur et corpus ipsius in lecto loco movebatur, ab illo immunis erat.

35) Memorabilis singultus, quem descripsi (Ratio Instituti Clinici Ticinensis. Vienn. 1795. Cap. X.) aegram diu noctuque excruciat.

36) DOLAEUS *Encycloped. med.* Lib. III. C. 2. p. 174.

37) SCHENK diss. cit. p. 6. ex POTERIO. In Judaeo tredecim annorum, qui a nonnullis hebdomadibus singultu latrante laborabat, *quadraginta quinque* singultus spatio sexagesimae horae partis numeravi, Vilnae die 21. Jan. 1819.

38) BARTHOLINUS Cent. II. hist. 4.

39) LAZAR. RIVERIUS Obs. I. p. 302. RIEDLINUS Obs. 31. p. 67: In aegra mea in Clinico Ticinensi singultus ad centum passus usque audiebatur, quod sub fenestris immensum numerum curiosorum attraxit.

Socia tunc singultus agnoscit varia symptomata, quae, aut ex eadem causa quae illum excitat, aut ex mechanica vi, corpori sub actu singultuendi illata, pullulant. Communissima sunt, inter illa — borborygmi, suspiria, oscitatio ⁴⁰⁾, ructus ⁴¹⁾, nausea et vomitus; inter haec — dolor capitis, pectoris, cum sensu plagae ibi haerentis, pulsus frequens, parvus, rubor faciei. Singultus durasse visus est dies quatuor ⁴²⁾, quinque ⁴³⁾, octo ⁴⁴⁾, duodecim ⁴⁵⁾, viginti ⁴⁶⁾, quadraginta ⁴⁷⁾,

40) Aegra SCOTT (l. c.) ore semper hiantē relinquebatur.

41) An. 1817 — 1820. vetulam judaeam (*Moyzeszowa*) cum Dr. LIBOSCHITZ Vilnae curavi, quae singultum socio ructu patiebatur. Explosio tanta erat, ut illa non solum in vestibulo audiretur, sed etiam ut infans in eadem domo degens, inde terrefactus in convulsiones inciderit. Ipse prope ructatricem meditabundus sedens, ab explosione inopinate contingente, plus vice simplici concutiebatur. Malum hoc dumtaxat interdum saeviebat. Cum plurima signa vitii cordis aut vasorum majorum adfuerint, illud inde derivavi. Obiit interea aegra cum malis suis. Ad sectionem cadaveris inter judaeos Polon. nequidem cogitare licet.

42) HENNING in HUFELAND's *Journal d. pr. Heilkunde*. 25. B. 4. St. p. 75.

43) WEBER *Obs. med.* Fasc. II. p. 35.

44) BENEDICT. SYLVATICUS *Lib. II. Consil.* 81. p. 287. ROLFINKIUS *Epit. part. corp. affect.* L. III. C. 4. p. 208. RIEDLIN *Cent. Obs.* 15.

45) MARCUS GATTINARIA in praxi sua, de jurisconsulto narrat. TULPIUS *Lib. IV. C.* 25.

46) EPIPHANEUS FERDINANDUS *hist.* 43.

ta ⁴⁷⁾, menses tres ⁴⁸⁾, septem ⁴⁹⁾, octodecim ⁵⁰⁾, quid quod annos duos ⁵¹⁾, quatuor ⁵²⁾, viginti quatuor ⁵³⁾. Interdum ille periodice redit ⁵⁴⁾.

2. Cadavera hominum cum singultu demor- Autopsiac
tuorum exhibuerunt: tumores, nervos, qui sto- cadave-
machum adeunt, comprimentes ⁵⁵⁾; tumorem
cysticum inter pleuram et vertebrae ⁵⁶⁾; serum
acre in cavitatibus pleurae ⁵⁷⁾; ventriculum no-
tis

47) ALEXANDER MASSARIUS Lib. III. C. 4.

48) SCHENK Lib. III. Obs. 49. ELLER *méd. chirurg.*
Bemerk. p. 167.

49) Ratio mea instituti Ticinensis l. c.

50) TARANGET in *Journ. de med.* T. 86. p. 363.

51) BARTHOLINUS Cent. III. Epist. 61 (a daemone ob-
sessa credebatur aegra). MARCELLUS DONATUS. Lib.
IV. hist. med. Cap. 5.

52) BARTHOLINUS Cent. II. hist. 4.

53) ALBERTI Diss. casus singultus chronici viginti qua-
tuor annorum. Hal. 1743.

54) Singultus periodicus OL. BORRICHII. D. HAZON
in diario medico. Jul. 1766. Quolibet anno revert-
batur et singulis vicibus quatuordecim dies perseve-
rabat, phlebotomiis cessit, aeger pacate noctes somno
transigebat, primo mane adusque vesperam singul-
tiebat. (MANGET *Bibl. med.* T. 4. p. 558.).

55) BARTHOLIN. secunda appendix. v. MORGAGNI de
sed. et caus. morborum Epist. XXIX. Art. 3. et RHO-
DIUS Obs. med. Cent. II. Obs. 61.

56) ELLER l. c.

57) FR. HOFFMANNUS l. c. §. 14.

tis nigris sparsim compunctum ⁵⁸⁾, tumorem ad cardiam ⁵⁹⁾; vermes in stomacho ⁶⁰⁾, illius ex omento crasso et scirrroso dislocationem ⁶¹⁾; hepares cum quadam septi transversae parte nigro colore tinctum, corruptum, sphacelatum; in venis et arteriis parum cruoris; lienem sanguine crasso turgidum, et cor penitus corruptum ⁶²⁾, atque calculos in renibus ⁶³⁾.

§. VIII.

C a u s s a e.

C. prae-
disponen-
tes. 1. Praedisponunt ad singultum aetas infan-
tilis et senium, hinc genus nervosum imbe-
cille ⁶⁴⁾.

C. excitan-
tes. 2. Excitatur singultus: a vulneribus cere-
bri ⁶⁵⁾, a laesionibus musculi temporalis ⁶⁶⁾, a
luxa-

58) RAMAZZINI constitut. A. 1692. et duorum seqq. N.

22. Cfr. HALLER opusc. patholog. Obs. 14.

59) ELLER l. c. p. 170.

60) FRANK epit. de cur. hom. morb. L. V. 2. p. 526.

61) LIEUTAUD hist. anat. med. Lib. I. Obs. 208.

62) FR. HOFFMANN l. c. Obs. 3.

63) Dr. MATUSEWICZ, quondam professor artis obstetriciae in C. Universitate Vilnensi, praevio pertinaci singultu, in atrio domus perceptibili, ex suppressione urinae mortuus est; secto cadavere calculos renales, quorum praesentiam praedixi, exhibuit.

64) FR. HOFFMANNUS l. c. §. 10.

65) HIPPOCRATES Sect. VII. Aph. §. 3. et HERNIUS comment. in hunc aphorismum p. 469. FR. HOFFMANN §. 15.

luxatione vertebrarum ⁶⁷⁾ et costarum ⁶⁸⁾, ab illarum versus ventriculum curvatura ⁶⁹⁾, a cartilaginis ensiformis depressione ⁷⁰⁾ et prolapsu ⁷¹⁾, a menstruatione ⁷²⁾ illiusque defectu ⁷³⁾, a graviditate ⁷⁴⁾, a frigore ⁷⁵⁾, vertici admoto ⁷⁶⁾, et prae-

66) KLEIN *chir. Bemerkungen* p. 150.

67) ALEXANDER MASSARIUS l. c. (quidam cum cecidisset in dorsum, vertebri luxatis, incidit in singultum, a quo liberari non potuit, nisi in locum suum vertebri restitutis). Cfr. RHODIUS Cent. II. Obs. 61. (singultus ex compressâ thoracis vertebra undecima superiori orificio ventriculi objecta).

68) FERNELIUS Lib. VI. de part. morb. et sympt. C. 3. p. 568 (costâ repositâ quievit singultus). Observavi ex hac caussa singultum in femina nobili Vilmensi. Aegra morbum ex repetita contusione thoracis, in curru incommodo vehendo, contraxerat.

69) HIPPOCRATES de fractur. C. 47. articulorum. Docte hunc locum commentatur MICHAELIS Diss. cit. §. 51. 52.

70) FERNELIUS l. c. (Tres menses continuo durabat singultus).

71) BONET Sepulchr. Lib. III. Sect. 5. Obs. 8. App.

72) SCHURIGIUS (Parthenol. p. 213.) refert, singultum feminam quandam, ante mensium eruptionem, semper occupasse, hac vero facta protinus cessasse.

73) FR. HOFFMANNUS l. c. Obs. I. JAURION in *Recueil périod. de la Soc. de med. à Paris. T. III. N. 17.*

74) FR. HOFFMANN l. c. §. 18 (ultimis gestationis mensibus).

75) RIVERIUS (Cent. III. Obs. 42.) meminit, quod quaedam puella per totam hyemem singultu graviter vexata, omni vero aestate ab eo libera fuit. Interea

praesertim humido ⁷⁷⁾; a haustu gelido ⁷⁸⁾, acicularum ⁷⁹⁾; a veloci deglutione ⁸⁰⁾; a cibo in oeso-

singultum non invenio frequentiore in regionibus septentrionalibus, quam alibi.

76) Recens nati, nisi verticem habeant bene tectum, statim incurrunt singultum.

77) RAYGERUS (Miscell. nat. cur. Dec. II. A. 6. Obs. 211.) de triduo singultu ex diuturniore in aquis morâ, casum refert memorabilem. A. 1816. judaeum cum saevo singultu observavi. Juvenis iste per plures horas prope sponsam sedens atque lasciviâ exarsus, dolorem vehementem testiculorum persentire coeperat; contra quem, chirurgi cujusdam consilio, *fotum frigidum* admovebat. Extemplo comparuit singultus, per quinque dies protractus.

78) Eph. N. Cur. Dec. III. An. I. Obs. 48. SMETIUS Misc. p. 523. RIVIERUS (De morib. infrequent. Obs. I.) singultum semestrem a frigido haustu adnotat, et TIMAEUS A GULDENKLEE (L. III. C. 5. p. 115.) exemplum singultus allegat in viro, qui valde calefactus nimium aquae frigidae cum nitro hauserat. Et in febribus singultus observatus est, a nimio usu juleporum acidorum et emulsionum refrigerantium (SCHENK Lib. III.).

79) Eph. N. Cur. Cent. V. Obs. 46.

80) Si velociter aliquid devoratur fieri singultum observavit RHASES 5. Contin. et ALEXANDER 7. Problem. 45. Qui tubercinantur, ait SAUVAGES (Nosol. method. morb. Class. V. Gen. IV.), illi saepe singultiunt, unde prophylaxis est diu cibos masticare antequam degluttantur, sufficiente potu cibos diluere, et non satiari cibis, sed edere ad sobrietatem.

oesophago haerente ⁸¹), a pane calido magna quantitate devorato ⁸²); ab avida ingestione lactis ⁸³), fructuum horaeorum ⁸⁴), superbibendo aquam frigidam; ab esu tum ceparum, alliï, et zingiberis ⁸⁵), tum piperis cum melle, superbibendo vinum calidum ⁸⁶); a potu cremati ⁸⁷), alioque calido ⁸⁸); a venenis e. c. conio maculato ⁸⁹), euphorbio ⁹⁰), acido sulphurico ⁹¹), antimonio ⁹²); a vomitoriis et drasticis ⁹³), a bile ⁹⁴),

81) Sic apud HOLLERIUM (De morb. intern. Lib. I. C. 33. in Schol. p. 349.) puella assidue singultiebat, pulmonis bubuli frustulo in oesophago restitante, donec illud excussum fuit, affectus cessavit.

82) EPIPH. FERDINANDUS hist. med. 43.

83) Communissimus ex hac causa singultus inter pulsiones.

84) Vidi pluries in hominibus, qui ex septentrione fructuum egeno in regiones meridionales, illis abundantibus, iter instituebant.

85) GATINARIUS de cognit. et curat. aegrit. p. 81.

86) GALENUS de compos. med. L. V. (De se ipso narrat).

87) Quotiescunque Pater meus vel guttam cujusdam liquoris sumebat, illico singultus praesto erat.

88) ZACUTUS LUSITANUS Med. Prax. hist. XIII. N. 75.

89) GULDENKLEE Lib. VII. Cas. 4.

90) Idem l. c. Cas. 7.

91) BARBETTE Prax. med. Lib. IV. Cap. 2. p. 136. (loco balsami cujusdam sumpto).

92) BAGLIVI specimen de fibra motrice et morbosa. Romae 1702.

93) Hyperemesin et hypercatharsin singultus stipari testantur HIPPOCRATES (Sect. VII. Aph. 3 et 4. ac Sect.

le ⁹⁴), ab acidis primarum viarum ⁹⁵), a flatibus ⁹⁶), faecibus ⁹⁷), a herniis incarceratis ⁹⁸), a venere ⁹⁹), a febribus intermittentibus praepostere cinchona sanatis ¹⁰⁰), a diarrhoea aut dysenteria mature nimis per narcotica cohibita ¹), ab impedita erysipelatis evolutione ²), ab aphthis ³), ab antipathia ⁴), a haemorrhagiis ⁵), a
nisu

V. Aph. 41.), SYDENHAM (method. cur. febr. p. 61.)
et FR. HOFFMANNUS (l. c. §. 13.).

94) HANSA in HUFELAND'S *Journ.* 6. B. 4. St. HENNING
ib. l. c. FINK *Gallenkrankh.* p. 238.

95) In infantibus quotidie observatur.

96) FR. HOFFMANN l. c. Obs. 4.

97) *Commerc. Liter.* Norimb. 1732. p. 288. PELARGUS
med. Jahrgänge III. p. 154.

98) Plus vice simplici vidi.

99) *Eph. N. Cur.* Dec. II. An. 10. Obs. 88. Cent. V.
Obs. 31.

100) FR. HOFFMANN l. c. §. 14. et Obs. 2.

1) FR. HOFFMANN l. c. §. 14. et Obs. 2.

2) Observationem hanc in sene Missionario Vilmensi,
POHL, institui. Aeger vehementi singultu laborabat,
eadem ratione, qua erysipelas ad crura evolvebatur, de-
crescente, ac, facta eruptione, evanescente.

3) „Omnium frequentissimus et molestissimus singultus
oritur, dum aphthis obsidetur oesophagus, et saepe
antequam in faucibus appareant vel oris internis parti-
bus, ex singultu nato illas jam adesse noverunt me-
dici.“ SWIETEN *Comment.* §. 629.

4) *Eph. nat. Cur.* Cent. I et II. App. p. 191.

5) SAUVAGES l. c.

nisu imitationis ⁶⁾, a magnetismo animali ⁷⁾, a fletu suppresso ⁸⁾.

3. Sedes singultus prius in pulmonibus ⁹⁾, C. proxima^{ma} ventriculo ¹⁰⁾ incassum quaesita, nunc in diaphragmate ¹¹⁾ locata est. Ac re quidem vera „concusso velocissime septo, concutitur quoque gula et stomachus citissime; hinc aëris continuo a nobis deglutiti portio, intra gulam comprehensa, magno

6) SMETIUS (Miscell. p. 543 — 563.) plures simul in orphanotrophio singultu affectos fuisse narrat. „Puella 23. ann. nata, ait SAUVAGES (l. c.), affligebatur violento et continuo singultu canis latratum referente; vix ob diaphragmatis et intestinorum convulsiones poterat jusculum haurire; haec in nosocomio degebat vicina aliis quatuor puellis, quae tertio die *omnes singultire coeperunt*, altera cessante, per semihoram tres singultiebant etc.“

7) Vidi in epileptica manipulationes magneticas primum oscitationem, dein singultum excitasse.

8) SCHROEDER in SIEBOLD *Samml. chirurg. Wahrnehm.* 3. B. p. 224.

9) ARISTOTELES. S. 30. problem. Quaest. I. et 17.

10) HIPPOCRATES L. VI. Aph. 39. GALENUS L. V. de loc. affectis. C. 6. Aph. 6. Comm. SENNERTUS med. Pract. L. III. P. I. Sect. 2. C. 10. NICOL. PISO (De cogn. et curand. morb. Lips. 1766. C. 7. p. 53.), MORAGANI l. c. Definiebatur fere ab omnibus singultus „pro motu convulsivo ventriculi, vitium, quod tunicis suis inest, expellere tentantis.“

11) FELIX PLATER. Prax. Tract. I. FORESTUS. Lib. XVIII. Obs. 12. FR. HOFFMANNUS l. c. §. 9. affirmans: „*ad inspirationis laesionem pertinet singultus.*“

Frauk Prax. II. 2. 2.

C

magno impetu sursum per integrum pellitur oesophagum, et tandem in fornicato palato singultuosum illum efformat clangorem¹²⁾. In indole singultus eruenda quaevis schola suas fovebat hypotheses¹³⁾.

§. IX.

D i a g n o s i s.

Generatim. 1. Singultum, a nonnullis affectibus, qui cum illo similitudinem habent, distinguere, dein in *symptomaticum* et *primarium* dividere, juvabit.

Dist. singultus ab aliis affectibus. 2. Distinguendus est singultus 1° a *motu concussorio et sonoro thoracis*, qui plorantibus, pueris maxime et mulieribus, ab animi pathematibus, ira, gaudio, dolore, contingere solet¹⁴⁾; et 2° a *detentione spastica*, quae diutius tenet diaphragma rigidum et perpetuam producit respirandi difficultatem, uti videre est in colicis et hysteria. Desideratur hoc in casu sonitus singultientibus proprius, et character peculiaris singultus,

12) FR. HOFFMANNUS l. c. §. 5. Cfr. LANGII pathol. animat. Cap. 36.

13) Sic repetebatur singultus a GALENO (L. II. de caus. sympt. C. 6. et 8. de compos. med.), a vaporibus irritantibus; — a RODERICO A CASTRO (Comp. morb. C. 33. p. 154.), ab intemperie frigida, — a PARACELSO (Lib. de tartaro), a tartaro etc. etc.

14) LAT. Singultire, ululare. GERM. Schluchzen. GALL. Sangloter.

gultus, quod scilicet remittit et per intervalla recurrit.

3. Singultus *symptoma* esse solet pestis ¹⁵⁾, Sing sym-
februm ¹⁶⁾ (inprimis dum illarum decursus ano-^{ptomati-}
dynis praematuris perturbatur ¹⁷⁾, sudores et ef-
florescentiae cutaneae ¹⁸⁾, potissimum miliaria ¹⁹⁾,
supprimuntur), pemphigi ²⁰⁾, encephalitidis ²¹⁾,
hydrocephali ²²⁾, epilepsiae ²³⁾, diaphragmitidis ²⁴⁾,
hepatitidis ²⁵⁾ aliorumque inflammationum visce-

C 2

rum

- 15) THUCYDIDES et LUCRETIVS mirae illius Athenien-
sium pestis mentionem facientes, inter alia pessima
symptomata et singultum referunt. De singultu ut
pestis symptomate loquitur quoque DIEMERBROECK
C. 13. §. 5. C. 15. Annot. 5. (Oritur saepe a carbun-
culo diaphragma aut stomachum occupante).
- 16) Febres cum permanente singultu obvenientes, *sin-*
gultuosae dicebantur. Casus leguntur apud WEDEL
Diss. aeger singultu ex febre maligna laborans 1676.
et in Miscell. nat. cur. A. IV. Obs. 48. p. 43.
- 17) RIVIERUS Cent. III. Obs. 17.
- 18) FORESTUS Lib. V. Obs. 15.
- 19) SAUVAGES l. c.
- 20) ROBERT in *Journal général de médecine par Mr.*
CORVISART etc. 1812. *Mars.* p. 232.
- 21) MERCURIALIS Lib. I. Prax. Cap. 15. p. 61.
- 22) P. II. Vol. I. Sect. I. Cap. IV. §. XXII. 4. (72). *Acta*
mea Clinica. Vol. III. p. 46.
- 23) WEISS de singultu epileptico in *Act. Acad. nat. cur.*
Vol. III. p. 225. HORN *Archiv f. med. Erfahr.* 1710.
May. p. 154.
- 24) Cap. II. §. IV. N. 1.
- 25) HIPPOCRAT. L. V. Aph. 58. CELSUS L. II. C. 8.

rum abdominalium et viarum urinalium, ac morborum plurimorum puerperii ²⁶⁾, nec non aphtharum.

S. primarius.

4. *Singultus morbum per se constituens*, aut rectius, singultus morborum reconditorum effectus, variae est indolis, videlicet *traumaticae, inflammatoriae, rheumaticae, gastricae, arthriticae, atonicae et nerveae*.

S. traumaticus.

5. *Origo singultus traumatici*, a violentiis ventriculo et diaphragmati illatis ³⁸⁾, per se patet. Quo pacto vero vulnera cerebri et luxationes vertebrarum singultum excitare queant, intelligunt, qui originis encephalicae, nervi intercostalis ³⁹⁾ et vagi ⁴⁰⁾ et originis cervicalis nervorum phrenicorum ⁴¹⁾ memores sunt.

S. inflammatorius.

6. *Posse statum inflammatorium, potissimum plethoram, singultum gignere*, haud mirum

TULPIUS Obs. med. L. IV. C. 4. et quotidiana experientia.

26) ALBERTI de singultu praecipue puerperarum. Hal. 1738.

38) *Singultus a pressione* SAUVAGESII.

39) Quatenus nervus intercostalis ex gangliis suis thoracis nervos splanchnicos largitur, qui nervi per hiatus diaphragmatis transeunt et in plexum coeliacum terminantur, ex quo plexus phrenici pullulant.

40) Quatenus ille nervus per foramen oesophageum diaphragmatis transit et in plexum coeliacum desinit.

41) Quatenus nervi phrenici directe diaphragmati pro- vident.

rum videbitur si perpendamus, radices nervi intercostalis per foramen caroticum prope carotidem descendere ⁴²⁾, unumque illorum ⁴³⁾ per sinum cavernosum transire, nervos phrenicos cum pericardio cohaerere, — atque aortam, venam cavam et azygos per diaphragmatis hiatus et foramina migrare.

7. Nec mirum *rheuma*, utpote generatim *S. rheumaticus*. musculis et tendinibus infensum, septo transverso haud parcere. *Singultus rheumaticus* etiam per consensum ex affectione rheumatica cerebri, medullae cervicalis et nervorum diaphragma ad-euntium, ortum trahere potest.

8. Nullibi vero, quid nervorum consensus *S. gastricus*. in singultu producendo valeat, evidentius apparet, quam in *singultu gastrico* ⁴⁴⁾, cui scilicet alimenta, qualitate, quantitate peccantia alique stimuli plexibus nervorum abdominalium infensi (plethora non excepta) ortum praebent.

9. Magna caussarum complicatio in *singultu S. arthriticus*. *arthritico* occurrit, de plethora abdominali, de bile inspissata, de calculo renali *), et de dene-gata

42) Nervi vidiani ramus profundus, et ramus a sexto pari nervorum.

43) Ramus pari sexti.

44) *Singultus a gula SAUVAGISII*.

*) Explicatur origo singultus ex calculo renali, per plexum renalem, ejus ex mesenterico et coeliaco ortum ducit, atque plexum phrenicum largitur.

gata evolutione podagrae (uti ex WELSCHII ⁴⁵⁾ et RUMPELII ⁴⁶⁾ observationibus palam fit) loquimur.

S atonicus
et ner-
veus.

10. *Singultus atonicus* ⁴⁷⁾ diarrhoeam, vomitum, haemorrhagias, verbo inanitionem, sequitur, apparet quoque in convalescentia inprimis post febres miliares ⁴⁸⁾, nec non in mortis articulo ⁴⁹⁾. *Singultus nerveus* ⁵⁰⁾, dum nulla caussa materialis inveniri potest, admittitur.

§. X.

P r o g n o s i s.

Fr. Sing.
sympto-
matici.

1. Singultum in febribus interitum praesagire, adeo firme credebatur ⁵²⁾; ut exempla contrarii

45) Hecatost. II. Obs. 54.

46) Diss. de frigoris damno. Lips. 1696.

47) *Singultus ab inanitione* SAUVAGESII.

48) „Qui miliari eruptioni deficienti jungitur (singultus), eaque etiam sanata per dies aliquot perseverat et pro ratione redintegratarum aegri virium sponte tandem evanescit.“ SAUVAGES l. c.

49) „Sunt ultima naturae quô se vertat nesciae conamina.“ SAUVAGES l. c.

50) *Singultus spasmodicus* LUD. MERCATI. T. III. Lib. 3. Cap. 5.

52) FRANC. VALESII Comment. in HIPPOCRAT. epid. L. III. S. 2. Aeger. 12. II. MERCURIALIS Praelect. Pisan. (sibi unquam in ejusmodi casu aliter contigisse observavit, quam HIPPOCRATI), RAMAZZINI Constit. A. 1692. et duorum sqq. N. 22. (quotquot fuerunt singultuosi perierunt).

trarii pro monstruosis ⁵³⁾ haberentur. Mali praesertim omnis singultus est in febribus non solum, sed et in inflammationibus ⁵⁴⁾, haemorrhagiis ⁵⁵⁾ aliisque morbis acutis, dum socia habet vocis interceptionem ⁵⁶⁾, delirium ⁵⁷⁾, vomitum, et oculorum ruborem ⁵⁸⁾ aliaque signa magnam corporis labefactionem indicantia ⁵⁹⁾.

2. Sin-

53) LEDELIUS (Eph. N. C. Dec. III. A. 7. Obs. 127.) postquam EPIPHANIUM FERDINANDUM produxit: „Deum testantem, singultum in febribus malignis et ardentibus ad mortem praedicendam se unquam decepisse“ monet: „aegrotum non esse derelinquendum quousque anima adest, quia multoties *monstra fiunt* in curationibus morborum. Talia monstra epidemia typhi in Hibernia a. 1817 — 1819. regnans exhibuit; enim vero singultus sub curriculo morbi obveniens inter *bona* memorabatur *signa*. (*Transact. of the assoc. of Fellows and Licentiates of the King's and Queen's College of Physicians in Ireland. 3. Vol.*).

54) Excipi meretur hepatitis, quamvis et in illa singultus pro lethali habitus fuerit a HIPPOCRATE (L. VII. Aph. 3.) et a FORESTO (Lib. XIX. Obs. 18. Schol.).

55) HIPPOCRATES Lib. V. Aph. 3. Salutare tamen habetur singultus exemplum in haemorrhagiis apud HOLLERIUM l. c. Lib. I. C. 33. in Schol.

56) HIPPOCR. Prorrhet. Lib. I. C. 3. t. 8.

57) HIPPOCR. Coac. praedict. C. I. T. 131.

58) HIPPOCR. Lib. VII. Aphor. Aph. 3.

59) Hujusmodi sunt: „sitis magna, debilitas insignis, vigiliae, impudentia, ardor inextinguibilis, motus maxillae inferioris tremulus, nervorum distentio, vo-

P. Sing.
primarii.

2. *Singultus morbum per se constituens*, nonnunquam per annos multos sine omni discrimine excruciat ⁶⁰⁾. In genere „qui ab inanitione fit pejor est altero, qui fit ex repletione“ ⁶¹⁾. Singultus nerveus epilepsiam interdum praesagire est visus ⁶²⁾. Singultus accidentalis vix pro morbo habendus.

§. XI.

C u r a.

C. Sing.
symptomatici.

1. In *cura singultus symptomatici*, ex auxiliis mox commendandis illud quod morbo primario accommodatum est, ast non tumultuarie ⁶³⁾, eligendum.

C. S. traumatici.

2. Si vertebrae aut costae fractae, luxatae singultum produxerint, fracturae consolidatio, luxationis repositio ex chirurgico petenda foro, unicum spondet auxilium. Cartilagini ensiformi luxatae, ac intus flexae optime medebuntur *cucurbi-*

cis interruptio, urina diluta etc.“ FR. HOFFMANN
l. c. §. 16.

60) „Novi feminam generosam quadraginta annorum, quae viginti annos quotidie adhuc singultu vexatur, sine sanitatis incommodo.“ FR. HOFFMANN. l. c.
§. 20.

61) GALENUS Lib. V. Aph. 3 et 4.

62) SCHROEER in HUFELAND's Journ. d. pr. Heilk.

63) Quod si fiat, mors pro medico est, SYUENHAM de
nov. febr. p. 515.

curbitalae coecae, scrobiculo cordis applicitae⁶⁴); item *emplastra* quae attrahunt et firmant.

3. *Cucurbitulae scarificantes* instar mira-^{C. S. in-}culi et incantamenti *singultum inflammatorium*^{flammato-}^{rii.} tollunt. Applicantur ad loca ubi incendium maxime saevit, hinc pro re nata ad spinam⁶⁵), ventriculum⁶⁶), ventrem⁶⁷). Alias *venae sectio*⁶⁸) aut ex brachio⁶⁹) aut ex pede⁷⁰) indicatur.

Locum

64) VITUS RIEDLINUS lin. med. A. 1695. Mens. Aug. Obs. 4. HUFELAND'S Journ. 23. B. 3. St. p. 212.

65) AETIUS (L. V. C. 137.) „si continuus fuerit singultus, ait, cucurbitulis quoque per totam spinam utimur, et maxime circa majores vertebrae septi transversae, attrahentes ipsum ad spinam.“ Ego maxime ad vertebrae cervicales, ob notas rationes, suadeo.

66) FONSECA T. II. Consult. 27. p. 152. ZACUTUS LUSITANUS pr. admirab. Lib. III. Obs. 20. (cucurbitula maxima cum multa flamma et scarificatione).

67) LUDOV. MERCATUS. Lib. III. de intern. morb. curat. C. 5. p. 255. et auctores fere omnes qui de cura singultus scripserunt.

68) BONET Scpulchr. L. III. S. 5. Obs. 4. Eph. N. C. Dec. III. A. 7 et 8. App. p. 134. GIANNINI v. HARRLES u. RITTER Journ. 5. B. 2. St. p. 4.

69) BARTHOLINUS (app. tertia) quaesivit: cur sola brachii vena secta juvaret in quodam, quem describit, singultu? Respondet MORHAONI (op. c. Epist. XXIX. Art. 3.) „Quid? si phrenica superior vena, comes ut nosti, phrenici nervi, repente imminuta copia sanguinis, illuc, quo ea vena influit, redituri, et quod consequitur, ipsa quoque parte oneris sui levata,

Locum quoque obtinent extremitatum ligaturae ⁷²⁾ potio aquae frigidae et nivis ⁷³⁾, nitræ potassae ⁷⁴⁾.

C. S. rheumatici.

4. *Singultui rheumatico* recenti, methodus antiphlogistica, magis inveterato, *vesicatorium* ad locum rheumate contaminatum ⁷⁵⁾, nec non *balnea tepida* ⁷⁶⁾, *aromatica* ⁷⁷⁾, et *thermae* ⁷⁸⁾ opponuntur.

C. S. gastrici.

5. *Singultum gastricum*, nulla obstante gravi contra-indicatione, *emetico* ⁷⁹⁾ ex *radice scillae mar-*

aut socium nervum minus premat, aut aliquid, unde hic irritaretur, absorbeat? "

70) FR. HOFFMANN l. c. Obs. I.

72) RIVERIUS l. c.

73) ZACUTUS LUSITANUS l. c. L. II. Obs. 13.

74) Act. N. Cur. A. V. Obs. 118. (cum absorbentibus remediis).

75) Sic NELSON SCOTT (l. c.) in singultu vesicatorium ad nucliam, utpote loco, ex quo nervi phrenici originem ducunt, propinqui, cum successu apponit.

76) Divinae virtutis esse, in singultu a refrigerio orto, testatur FR. HOFFMANN l. c. meth. med. §. 4.

77) ALEXANDER MASSARIA sic singultum 40. dierum curavit. Cfr. BONETUS med. Sept. Lib. V. Sect. 5. Obs. 6.

78) RIVERIUS observ. communic. p. 658.

79) Suadetur vomitorium jam a GALENO (L. VII. Aph. Comm. 3.), FELIX PLATER (Obs. p. 203.) chirurgum singultientem continuatis vicibus dies noctesque, ut nec dormire nec loqui, aut cibum capere posset, cum ad extremum debilitato nil profuisset, atque hinc quasi in agone constitueretur, tandem vomitorio

marinae ⁸⁰⁾ aggredimur. Accedunt *purgantia* ⁸¹⁾ (*radix rhei* ⁸²⁾, *calomel* ⁸³⁾), et *clysteres* ⁸⁴⁾. Acida primarum viarum, *absorbentia*, flatus, *carminativa* (semina *anethi graveolentis* ⁸⁵⁾ et *pimpinellae anisi* ⁸⁶⁾), exposcunt.

6. Cura

felicissime curavit. Praeterea de emeticorum in singultu efficacia legitur apud HANSA et HENNING l. c. SOLBRING in HORN's *Neuen Archiv.* 2. B. p. 322. BANG in Act. Reg. Soc. med. Havn. Vol. II. p. 58. MANGAR ibid. Vol. IV. p. 427. Item in *Commerc. Liter.* Norimb. 1733. p. 351. Act. N. Cur. Vol. III. Obs. 24. RIGAUD Ergo solvunt singultum vomitus et sternutatio. Paris 1601.

80) FR. HOFFMANN l. c. method. medendi. §. 3. Dosis a granis quatuor ad sex, cum granis tribus nitri depurati.

81) HANSA l. c.

82) Judaeum, de quo supra (§. VII. N. 1. (37)), solâ *tinctura rhei aquosa et aqua* [†] menthae spatio unius hebdomadis sanavi.

83) LAZ. RIVERIUS (Cent. III. Obs. 42.) puellam triginta annorum, ab anno singultu, qui quater quinques de die infestabat, laborantem, ope *Calomel* ad grana duodecim porrecti sanavit. Sanavi per idem pharmacum judaeum de quo supra (§. VIII. 2. (77)). Laudatur quoque a WRIGHT in DUNCAN's *Annals of med. for* 1797. v. *Samml. auserl. Abh. f. pr. Aerzte.* 19. B. p. 45.

84) „In omni casu valent clysteres ad revulsionem.“ NICOL. PISO l. c. p. 61.

85) LAZ. RIVERIUS Prax. L. IX. C. 6. (semen anethi ad drachm. duas in unciis octo vini generosi leniter decoctum ut aeger mane et vespere unciam sumeret, exhibebat).

C. S. ar-
thritici.

6. Cura *singultus arthritici* ut plurimum complicata est. Morbo, antiphlogisticis et anti-gastricis auxiliis, ad simplicitatem reducto, methodus adversus singultum rheumaticum commendata valet. Commendantur quoque *acetum scillae marinae* ⁸⁷⁾, *tinctura colchici autumnalis* ⁸⁸⁾; et *aqua nucum viridium, cum raphano prius in aceto macerato, destillata* ⁸⁹⁾.

C. S. ato-
nici et ner-
vei.

7. Ad *singultum atonicum et nerveum* curandum, pro vario debilitatis et sensibilitatis gradu, varia ex sequentibus eligenda sunt phar-maca: *oleum amygdalarum dulcium* ⁸⁹⁾, *lac* ⁹⁰⁾, inprimis *muliebre* ⁹¹⁾, *aqua selterana* ⁹²⁾, *vinum* ⁹³⁾, *crematum* ⁹⁴⁾, *acetum* ⁹⁵⁾, *succus endiviae*

86) RIVERIUS l. c.

87) BENEDICTUS SYLVATICUS in Consiliis.

88) RAVERS in the Lond. medic. and phys. Journ. 1816. Vol. 36.

89) RIVERIUS ex PLATERO.

89) FORESTUS Obs. med. 12. Lib. XVIII. FR. HOFFMANNUS l. c. method. med. §. I. (cum aliquot guttis olei destillati anethi).

90) SCHENK l. c.

91) Act. N. Cur. Vol. IV. Obs. 33. Cent. V. Obs. 108. Commenc. Liter. Norimb. 1739. p. 19. 1741. p. 85.

92) Cum lacte asinino v. FR. HOFFMANN l. c. cautel. §. 6. et PAULINI onographia. cur. Sect. 4. C. 3.

93) HOLLERUS, ubi omnia incassum erant, solo vino singultum sistere potuit.

94) RODERICUS A FONSECA. T. II. Cons. 27.

95) ARISTOTELES. Lect. III. Problem. 5.

viae recenter expressus ⁹⁶⁾, *opium* ⁹⁷⁾, *castoreum* ⁹⁸⁾, *moschus* ⁹⁹⁾, *oleum cajeput* ¹⁰⁰⁾, *destillatum absinthii* ¹⁾, *cinchona* ²⁾, *strychnos nux vom-*

96) SCHENK Diss. p. 34.

97) CAPIVACCIUS (Pract. L. III. C. 10.) cum evacuanti-
bus ut videmus in celebri medicamento ASCLEPIADIS,
quod recensent GALENUS (L. VIII. de compos. med.
C. 3.) et AVICENNA (L. IV. Fen. 13. Fr. 5. C. 19.)
quodque constat ex costo, croco, spica, asaro, ma-
stiche, aloe et opio. Ad ejus imitationem confectae
sunt pilulae RONDELETHII, PLATERI, RIVERII, WIL-
DEGANSII etc. Celebris est mixtura opiata SIM.
SCHULZII (de singultus diuturni curatione in Miscell.
Curios. med. phys. A. 6 et 7. Obs. 149.). R. Vini
cydoniorum. Tincturae rosarum ââ unciam unam.
Syrupi cydoniorum unciam semis. Extracti Zedoar.
grana quindecim. Olei destillati corticum Aurantio-
rum grana quatuor. Laudani opiat grana duo. M.
D. S. Pro potiuncula cochleatim sumenda. Opium
quoque commendatur adversus singultum a TRALLES
(Usus opii Sect. III. p. 97.); a RIVERIO (Obs. Cent.
IV. N. 78. cum nitro) a GEBEL (HUFELAND's Journ.
17. B. 3. St. p. 88.) a SCHMIDT (HORN's Archiv f. pr.
Heilk. 3. B. I. H. p. 156.).

98) AVICENNA (l. c.) castoreum ad scrupulum unum
porrectum mirabile in singultu vocavit. Similia te-
stantur RIVERIUS in Praxi. MÜLLER in mysteriis
medicis p. 165. HERCULES SAXONIA L. II. C. 12.

99) QUARIN animadv. p. 232.

100) ZACH. VOGEL in medic. chirurg. Beobachtungen.
p. 214.

1) Idem, ibidem.

2) JAURION in Recueil périod. de la Soc. de méd. Paris.

vomica ³⁾, *aqua cinnamomi* ⁴⁾, *aether sulphuricus alcoholisatus* ⁵⁾; *oxydum zinci* ⁶⁾, *pulvis antispasmodicus ruber* ⁷⁾. Nec externis remediis parcendum, inter quae commendari solent: *lac* ⁸⁾, *acetum* ⁹⁾, *folia marrubii vulgaris* ¹⁰⁾, *aliaeque herbae aromaticae* ¹¹⁾, *opium*, *bal-*
sama

T. 3. N. 17. — *„rzneykundige Beobacht. eines Arztes in Amsterd. N. 14. (in singultu periodico).*

3) RANOË in Actis R. Soc. med. Havn. Vol. I. p. 460. (Tinctura).

4) LUD. MERCATUS Opp. T. III. C. 5. p. 254.

5) FR. HOFFMANN l. c. meth. med. §. 2. (vel solum cum tinctura castorei).

6) CRELL Diss. de Zinco medico. Helmst. 1780. Ratio mea Instituti Clin. Ticinensis l. c. (Singultus, opio, moscho, asae foetidae, castoreo, cinchonae, rebellis; veluti per incantamentum ope *florum Zinci* ad granum unum bis de die, debellatus fuit. Peculiarem hujus aegrae curam habuit auditor tunc meus, nunc celebris anatomicus, semper amicus, ALEXANDER MORESCHI.

7) Commerc. Liter. Norimb. 1739. p. 35.

8) Ait MORGAGNI (l. c.): „VALSALVAE memini facile, obviumque remedium in notabili Comite respondisse, *lac* videlicet, *quo fovebat abdomen*; quamdiu enim lintea lacte madebant, tamdiu singultum aegro molestissimum sistebant: in quo tamen nec inutilis fuerat theriaca imposita.“

9) Cum lateribus pulverisatis nuchae applicitum. SCHENK diss. cit. p. 30.

10) SCHENK l. c.

11) e. c. absinthium, rutha, salvia, ros marinum, vino

sama ac emplastra ¹³⁾, *animalia juniora* ¹⁴⁾ epigastricae regioni admota. Item *succinum* et *amuletum* ¹⁵⁾ *singultus levior* seu accidentalis tolli solet per sternutationem ¹⁷⁾, vaporem candelae extinctae ¹⁸⁾, fumum sulphuris ¹⁹⁾, spiritus cohibitionem ²⁰⁾, inspirationem magnam ²¹⁾, vociferationem ²²⁾, silentium ²³⁾, deglutitionem aquae uno anhelitu absolutam ²⁴⁾, terrorem ²⁵⁾, ima-

malvatico irrorata ac in sacculo suscepta ventriculo apposita. v. DIEMERBROECK. Obs. et Cur. 6. N. 53. GALENUS in singultu cataplasma super spinam dorsi applicabat.

13) Ex crustis panis, baccis lauri, et oleo essentiali menthae invicem malaxatis.

14) RIVERIUS l. c.

15) ALEXANDER TRALLIANUS l. c.

17) HIPPOCRATES L. VI. Aph. 13. (singultu fatigante, sternutatio liberat). AETIUS L. V. C. 37. RIVERIUS l. c. (Sic CHRYSIMACHUS medicus apud PLATONEM ARISTOPHANEM singultientem, qui spiritus cohibitione et aqua frigida gargaryzata, curari non potuerat, sternutamento excitato, curavit). PAULLINI Lanx Sat. Dec. I. Obs. 7. RIGAUD l. c.

18) Eph. N. C. Dec. III. A. V. et VI. Obs. 288.

19) Ibidem Dec. III. A. V et VI. Obs. 288.

20) ARISTOTELES Sect. II. Problem. GALENUS Lib. de med. fac. parab. Lib. II. de caus. sympt.

21) FR. HOFFMANN l. c. §. 9. GENEMA Decas Obs. med.

22) AETIUS Tetrab. III. Serm. I. C. 5.

23) PLUTARCHUS lib. de loquacitate in fine.

24) SAUVAGES l. c.

imaginationem affectam ²⁶⁾, alapam ²⁷⁾, compressionem digiti medii utrinque ad latera ²⁸⁾, ligationemque validam thoracis vel ventris ope fasciae ²⁹⁾.

DE

25) e. c. aquâ frigida in faciem inopinate inspersâ, rumore derepente facto, verecundia excitata.

26) Eph. N. C. Dec. III. A. V et VI. Obs. 165. — Dec. II. A. IX. Obs. 103. (Doni promissio).

27) Ibidem Dec. III. A. I. Obs. 44.

28) HOLLERIUS l. c. Facile explicatur hoc phaenomenon per ortum nervi phrenici ex medulla cervicali, ex qua et nervi brachiales (aliunde cum sympathico magno communicantes) profiscuntur.

29) HARTMANN prax. chim. L. II. C. 129. p. 169.

DE MORBIS
PERICARDII, CORDIS,
ARTERIARUM
ET
VENARUM.

CAPUT IV.

*De morbis pericardii, cordis, arteriarum
et venarum in genere.*

§. XII.

Doctrinae momentum et historia.

1. **M**usculorum potentissimus, primus in Doctr.
embryone se movens, ultimus in moriente quie-^{momen-}
scens, vitae totius curriculo sese vicibus innu-^{tum.}
merabilibus indefesse contrahens, et dilatans,
talique pacto liquorem vitalem, principium nem-
pe caloris, pabulum nutritionis et fontem secre-
tionum, per canales, sane non plane inertes,
modo propellens, modo recipiens, atque cum
cerebro, medulla spinali, gangliis nervorum et
pulmonibus arctissimum nexum alens, animique
affectibus plurimis adeo obtemperans, ut illo-
rum veluti centrum haberetur; — *cor*, inquam,
una cum *arteriis* et *venis*, non solum multarum
aegritudinum, praecipue febrilium particeps est,
sed proprios quoque agnoscit morbos. Hi morbi
quanti sint momenti intelligitur, perpendendo,
quod illis vigentibus — aliae corporis humani
partes cruore cbruuntur, inflammantur; aliae

siderantur, allescunt, — quod cruor ob receptaculorum, quibus coërcetur, impotentiam aut in cavitates contiguas, aut extrinsecas, saepe vita inopinate periclitante, ruit; — quod humores, alias eliminandi, retinentur lentumque praeparant interitum; quod facultates animi perturbantur; quodque aegri ob summas respirationis aerumnas, magis quam in omni alio morbo anguntur.

Doctr.
historia.

2. Veteres medici dignitatem morborum cordis, arteriarum et venarum minime intellexerunt. Loquitur quidem HIPPOCRATES de vulneribus cordis ¹⁾ et de illius ac vasorum majorum dilata-tione ²⁾; at vero, ubi de affectione cordis in febribus mentionem injicit ³⁾, num vocabulo καρδίη cor ipsum aut potius scrobiculum cordis intellexerit, dubitatur ⁴⁾. Quin, in libris Hippocraticis spuris ⁵⁾, cor aegrotare haud posse, contenditur. *Morbi cardiaci*, verisimiliter ex stomacho proficiscentis, meminit CELSUS ⁶⁾. PLINIUS contenderat cor vitiis non macerari ⁷⁾. Aliter jam sentiit GALENUS, ubi loquitur: 1^o de similitudine inter symptomata erysipelatis cordis et vul-
nerum

1) Aphorism. VI. 18.

2) De morbo Sacro p. 305. edit. FOESII.

3) Aphor. IV. 64.

4) De morbo. IV. 500.

5) Epidem. VII. 30.

6) Lib. II. C. 19.

7) L. XI. Sect. 69.

nerum in gladiatoribus quibus pectus pertunditur⁸⁾; 2° de morte aegrorum cum animi deliquio et palpitatione cordis⁹⁾, 3° de hydropo pericardii¹⁰⁾ et 4° de corde (consumpto a carie sterno et putrefacto pericardio) denudato¹¹⁾. ARETAEUS lipothymias¹²⁾ et dyspnoeas¹³⁾ ex corde repetiit. Ex vitiis primariis cordis mortem, ex consensualibus animi deliquium PAULUS AEGINETA derivavit¹⁴⁾. ARABES, exceptis AVICENNA¹⁵⁾ et AVENZOAR¹⁶⁾, doctrinam morborum cordis, a Graecis illustratam, haud locuple-
tarunt. De illa, modo aevo medio proprio, dis-
seruit FRANCISCUS DE PEDEMONTE¹⁷⁾. Quo ma-
gis dein saeculo XIV et XV. anatomia inclaruit,
eo

8) De locis affectis. edit. Basil. 1558.

9) l. c. IV. p. 295. Et Comment. in HIPPOCR. Aphor. L. II. 41. p. 248. 49.

10) De loc. affectis. Lib. V. p. 297.

11) De adm. anat. L. VII. p. 182.

12) De caus. morb. acut. Lib. III. 2. p. 15. edit. BOER-
HAAVII.

13) l. c. L. I. C. 11.

14) L. III. C. 34. p. 91. edit. Basil. 1558.

15) Canon. L. III. fen. 11. tract. II. Cap. 1. (Loquitur de inflammatione ab aliis partibus ad cor et pericardium propagata).

16) Theisir. L. I. Tract. XII. C. 7. fol. 19. 6. edit. Venet. 1496. (De hydropo pericardii et exulceratione cordis).

17) Comment. in MESUE. fol. 229 — 232. edit. Venet. 1562.

eo magis et morbi cordis innotuerunt, operâ MONDINI DE' LUZZI¹⁸), GENTILIS DE FULIGNO¹⁹), JOHANNIS ARCULANO²⁰), HUGONIS BONCIO²¹), ANTON. CERMISONE²²), BARTHOL. MONTAGNANA²³), ANTON. BENIVIENI²⁴) et ALEX. BENEDETTI²⁵). *Saeculo XVI.* ex eodem fonte locupletabatur doctrina morborum cordis a GUIDO GUI-

18) Anat. Cap. XX. (De defectu et excessu aquae in pericardio, a quo ultimo inquietudinem et cordis palpitationem derivat).

19) Cons. fol. 59. a. edit. Venet. 1518. (De decremento et defectu cordis ex frigore et debilitate cerebri).

20) Expos. in libr. nonum ALMANSORIS p. 500. Basil. 1540. (De vcnæ sectione periculum inflammationis et suppurationis cordis impediēte).

21) Consil. f. 27. d. 28. a. edit. Venet. 1518. (De conditione frigida et humida cordis, pulsus imperceptibilis et debilitatis causa).

22) Consil. f. 18. d. edit. Venet. 1518. (De palpitatione cordis a flatibus hystericarum) et f. 20. (De pulsatione arteriarum ventriculi).

23) Consil. N. 114. fol. 146 sqq. edit. Venet. 1564. (Mors improvisa ex vitiis cordis).

24) De abd. morb. caus. Obs. XXXV. (De polypo ventriculi cordis sinistri). Obs. LXXI. (item). Obs. LXI. (Sanguis ater in corde apud astmaticum). Obs. LXXXIX. (Abscessus in ventriculo cordis sinistro). Obs. LXXXIII. (De corde circum circa villosa in latrone bis laqueo incassum suspenso). Obs. LXV. (De corde denudato ut apud GALENUM).

25) Anat. L. III. C. 12. (De varia positione cordis).

GUIDI ²⁶⁾, NICOL. MASSA ²⁷⁾, VESALIO ²⁸⁾, RE-
ALDO COLUMBO ²⁹⁾, GENS. BERTINI ³⁰⁾, ANT. AB
ALTOMARE ³¹⁾, J. FR. ROTA ³²⁾, BRUNO ³³⁾, RYFF ³⁴⁾,
RUDIO ³⁵⁾, JOH. FERNELIO ³⁶⁾, CARL. STEPHA-
NO ³⁷⁾.

- 26) De curat. membr. Lib. VIII. Cap. 16. p. 300. edit.
Francf. 1626. (Vermes (?) in ventriculis cordis).
- 27) Anat. Lib. introd. C. XXII. edit. Venet. 1559. (De
ulcere cordis praevio vulnere capitis).
- 28) De corp. hum. fabrica. L. VI. C. 14. p. 515. edit.
ALBINI. (De polypo ponderis duarum librarum in
ventriculo sinistro cordis et corde magnitudinem uteri
gravidæ æmulante). Et Lib. I. C. 5. p. 17. (De gan-
graena extremitatum cum polypo cordis sinistri pulsu
irregulari reddito). Chirurg. magna. L. V. C. 1. p.
1040. (De aneurysmate aortae ab ictu).
- 29) De re anat. Lib. XV. p. 670. edit. Francf. 1593.
(De defectu pericardii).
- 30) Medicina. Lib. XII. Cap. 11. p. 322. edit. Basil.
1587. (De inflammatione cordis).
- 31) De med. hum. corp. mat. C. LIV. LV. p. 424 —
441. edit. Lugd. 1560. (De motibus convulsivis cor-
dis).
- 32) De tormentar. vulner. natura. C. XXIII. p. 116. 17.
edit. Bonon. 1555. (De vulneribus cordis non lethali-
bus).
- 33) De corde et ejus vitiis. Basil. 1580.
- 34) Diss. de affectibus cordis. Basil. 1584.
- 35) De naturali et morbosa cordis constitutione. Venet.
1606.
- 36) Pathol. L. V. C. 12. p. 122. edit. Traj. ad Rhen.
1656. (De ulcibus cordis et effectu contagiorum in
illud).

NO³⁷⁾, WILH. RONDELETO³⁸⁾, JACOB. HOULIERO³⁹⁾, CHRIST. A VEGA⁴⁰⁾, FEL. PLATER⁴¹⁾, VICT. TRINCAVELLA⁴²⁾, HIER. MERCURIALI⁴³⁾, HERCUL. SAXONIA⁴⁴⁾, PETR. SALIO DIVERSO⁴⁵⁾, ARCHIBALDO PICCOLHUOMINI⁴⁶⁾, ANDR. CESALPINI⁴⁷⁾, WILHELMO BAILLOU⁴⁸⁾, HIER. CARDANO⁴⁹⁾,

37) De dissect. part. corp. hum. L. II. C. 35. p. 250. edit. Paris. 1546. (De dilatatione auriculae cordis dextrae in phthisico).

38) Method. Curand. morb. C. 10. p. 185. edit. Lugd. 1575. (De pericarditide).

39) De morb. intern. L. I. C. 29. edit. Genev. 1655. (De calculis cordis sociis difficultatibus urinae, vesicâ sanâ).

40) De arte med. L. III. Sect. VI. C. 8. p. 576. edit. Lugd. 1564. (De palpitacione cordis cum strepitu).

41) Observ. L. III. p. 620. edit. Basil. 1614. (De hernia cordis).

42) Consil. med. L. II. Consil. 19. p. 86. edit. Basil. 1557. (De flatuum vi in cor).

43) Respons. et consult. med. T. III. p. 270. ed. Venet. 1620. (De calculis in corde Imp. MAXIMILIANI II.).

44) Prael. Pract. P. II. C. 1. p. 648. ed. Vicent. 1620. (De hydrocardia).

45) De curat. pract. morb. C. VI. p. 247. ed. Bonon. 1564. (De inflammatione et suppuratione pericardii).

46) Prael. Anat. Lib. IV. Sect. 6. p. 592. ed. Rom. 1586. (De paralyysi cordis).

47) Specul. art. med. Hippocrat. p. 571. edit. Argentin. 1630. (De aneurysmate cordis et arteriae pulmonalis cum carie costarum).

48) Cons. med. I. 109. Opera T. II. p. 391. edit. Ve-

DANO ⁴⁹), JOH. RIOLANO ⁵⁰), PET. FORESTO ⁵¹), MARCELLO DONATO ⁵²), AND. LAURENTI ⁵³), et SCHENKIO A GRAFFENBERG ⁵⁴). *Saeculo XVII.* inceptum opus continuarunt SENNERT ⁵⁵), SEBASTIANI PISSINI ⁵⁶), HANIBAL ALBERTINI ⁵⁷), FABRICIUS BARTOLETTI ⁵⁸), CAROL. PISO ⁵⁹),
FRIED.

net. 1755. (De concretione pericardii cum corde et
(aneurysmate arteriae lienalis).

49) Comment. in Hipp. Aphor. VI. 10. p. 471. Opp.
var. VIII. edit. Lugd. 1663. (De laesione pericardii
suspiriis stipata).

50) Method. med. f. 86. 8. 93. a. 95. a. ed. Paris. 1598.
(De hydrocardia sociis lipothymia et palpitazione
cordis).

51) Observ. L. XVIII. C. I. (De suppuratione cordis).

52) De medic. hist. mirabil. L. V. C. 4. f. 285. edit.
Venet. 1597. (Collectio observationum de cordis
morbis).

53) Hist. Anat. Lib. IX. Quaest. 18. p. 803. ed. Francof.
1602. (De corde praemagno).

54) Observ. med. p. 270. edit. Francof. 1665. (De cor-
dis hydatide cruenta, tabe, polypo, ruptura, calculis,
sarcomate).

55) Practica. L. II. p. 2. C. 15. p. 703. edit. Lugd. 1650.
(De corde in dextrum thoracis latus prolapso).

56) De cordis palpitazione. Lib. II. Francof. 1609. De
diabete et polypo cordis. Mediol. 1654.

57) De affectionibus cordis. Venet. 1618. (De affectione
cordis hysteriae causa).

58) Methodus in dyspnoeam. Bonon. 1630. (De con-
cretione pulmonum cum pericardio, de collectione ad-
ipis inter illud et cor, de suppuratione cordis, de
obliteratione arteriarum per polypos).

FRIED. RANCHIN ⁶⁰), JOH. RIOLANUS ⁶¹), LAZARUS RIVERIUS ⁶²), NICOLAUS TULPIUS ⁶³), ZACUTUS LUSITANUS ⁶⁴), HARVEUS ⁶⁵), THOMAS WIL-
LIS ⁶⁶), ISBRAND DIEMERBROECK ⁶⁷), FRIED.
RUYSCH ⁶⁸), HARTENFELS ⁶⁹), DOMINICUS DE

MAR-

59) De morbis a serosa colluvie ortis. p. 220. edit.

BOERHAAVII (de hydropo pericardii).

60) Opusc. med. p. 380. edit. Lugd. 1627. (De morte
senum ab exsiccatione cordis).

61) Enchirid. anat. Lib. V. C. 46. (De corde praec-
magno ope pericardii cartilaginei costis alligato, in
Regina MARIA DE MEDICIS).

62) Observ. Cent. I. Obs. 87. p. 490. ed. Lugd. 1679.
(De concretiono pleurae cum pericardio et diaphrag-
mate).

63) Obs. Med. L. I. C. 72. p. 52. ed. Amstel. 1685.
(De polypo cordis et aortae).

64) Praxis admiranda. L. I. Obs. 128. (De pericardii
suppuratione).

65) Exercit. de circul. sanguinis. ad RIOLAN. p. 149.
ed. Lugd. Bat. 1737. (De ruptura cordis, de corde
praemagno et aneurysmate aortae). Exercit. de generi
anim. N. LII. p. 208. 209. (De corde post fracturam
costarum obvio).

66) Pharmacia rationalis. Sect. VI. C. 3. p. 264. (De
aorta ossificata).

67) Opéra p. 615. ed. Ultraject. 1685. (De hydropo per-
icardii et vulneribus cordis).

68) Observ. anat. N. 37. 38. 69. edit. Amstel. 1691.
(De aneurysmate aortae cum ossificatione valvularum).
Respons. ad epist. probl. XVI. ed. Amstel. 1696. (De
emphysemate cordis).

69) Progr. de corde ejusque affectibus. Erf. 1697.

MARCHETTIS ⁷⁰⁾ et THEOPHILUS BONET ⁷¹⁾. *Saeculo XVIII.* antecessorum vestigia legere ALBERTINI ⁷²⁾, VIEUSSEUX ⁷³⁾, LANCISI ⁷⁴⁾, BARBEYRAC ⁷⁵⁾, HERM. BOERHAAVE ⁷⁶⁾, MORGAGNI ⁷⁷⁾, SENAC ⁷⁸⁾, MECKEL ⁷⁹⁾, JUNCKER ⁸⁰⁾, SPAVENTI ⁸¹⁾,

70) Obs. med. chir. N. 47. 49. cd. Pat. 1664. (De ulceribus pericardii et cordis deque illius cum diaphragmate concretionem).

71) Sepulchr. anat. Lib. II. Sect. 8. edit. Genev. 1700. (De vitiis omnis generis).

72) Acta Bononiensia. T. I. p. 382.

73) *Traité du coeur.* Toulouse 1715.

74) De subitaneis mortibus. Rom. 1707. Et de motu cordis et aneurysmatibus. ib. 1728.

75) *Diss. nouvelles sur les maladies de la poitrine — du coeur etc.* Amster. 1731.

76) *Pathologische Betrachtungen des Herzens* in: *Genees Natuur- en Huishoud-kundig Kabinet, uitgegeven door J. VOEGEN VAN EGELÉN.* Leid. 1779. Deel 1. p. 562. Versio habetur in *Abhandl. f. pr. Aerzte.* IX. B. p. 483—575. (BOERHAAVE hujusmodi tractatum a. 1736. coram discipulis suis legit. Dignus ille est magno viro, ac tributo grati animi nostri).

77) De sedibus et causis morborum. Epist. XVIII. XXIII. XXXVI. XXXVII. (Quantae divitiae!).

78) *Traité de la structure du coeur, de son action et de ses maladies.* Paris 1749. (Monographia classica).

79) *Sur les maladies du coeur.* In *Mémoires de l'académie des sciences à Berlin* 1755. p. 56. (Pretiosas continet observationes).

80) *Diss. cordis morbos proprios in tabula exhibens.* Hal. 1763.

TI⁸¹⁾, FR. DE PETRAGHA⁸²⁾, J. G. WALTHER⁸³⁾, J. BELL⁸⁴⁾, REIL⁸⁵⁾ et HOPFENGAERTNER⁸⁶⁾. *Initium saeculi XIX.* peculiare phaenomenon exhibuit, quod medici clarissimi quinque nationum doctrinam morborum cordis uno fere temporis puncto operibus conspicuis locupletaverint, scilicet: inter Gallos CORVISART⁸⁷⁾, LAENNEC⁸⁸⁾, — inter Britanos BAILLIE⁸⁹⁾, FARRE⁹⁰⁾, ALLAN BURNS⁹¹⁾,

81) Diss. de frequentioribus cordis vasorumque majorum morbis internis. Viennae 1772.

82) De cordis affectibus syntagma. Romae 1779.

83) *Nouveaux mémoires de l'acad. à Berlin* 1785. p. 57. (Aberrationes variae vasorum, tumores, icones).

84) *Anatomy of the human body. Vol. II.* p. 201. v. *Samml. auserl. Abhand. f. prakt. Aerzte. XVII. B.* p. 475.

85) Diss. analecta ad historiam cordis pathologicam. Hal. 1790.

86) *Von einigen organischen Veränderungen des Herzens u. Herzbeutels.* in HUFELAND'S *Journ.* 1816. p. 5.

87) *Essai sur les maladies et les lésions organiques du coeur et des gros vaisseaux.* Paris 1806. Ed. 2. emendata et aucta. Paris 1811. Extractum hujus operis habetur in *Abhandl. f. pr. Aerzte. XXIII. B.* p. 597.

88) *De l'auscultation médiate.* Paris 1819. T. II. Sect. 2.

89) *Series of engravings etc. Fasc. I. comprehending the chief morbid appearances of the Heart and of the Aorta near its origin.*

90) *Pathological Researches. Essay I. Malformations of the human heart illustrated by numerous cases and fine plates containing fourteen figures and preceded by some Observations on the method of improving the diagnostic*

BURNS⁹¹⁾, HOGDSON⁹²⁾, H. REEDER⁹³⁾; — inter Americanos J. WARREN⁹⁴⁾; — inter Italos TESTA⁹⁵⁾, et inter Germanos KREYSIG⁹⁶⁾ et PUCHELT⁹⁷⁾,

part of medecine. Lond. 1814. v. Neu. Samml. auserl. Abh. I. B. 3. St.

91) *Observ. on some of the most frequent and important diseases of the heart, on aneurism of the thoracic aorta, on preternatural pulsation in the epigastric region and on the unusual origin and distribution of some of the large arteries of the human body. Illustrated by cases. Edinb. 1809. Versio germanica, qua utor, edita est a. 1813. Lemgo a NASSE.*

92) *Engraving intended to illustrate some of the diseases of Arteries accompanied with explanations. Lond. 1815. Et — a Treatise on the Diseases of Arteries and Veins, containing the Pathology and Treatment of Aneurisms and wounded Arteries. Lond. 1815. Von d. Krankheiten d. Arterien u. Venen mit besonderer Rücksicht auf Entwicklung u. Behandl. d. Aneurysmen u. Arterien-Wunden. A. d. E. v. ROBERWEIN, mit eigenen Anmerk. übersetzt u. mit Vorrede v. Dr. KREYSIG. Hannover 1817. (utor hac versione).*

93) *A practical Treatise on the inflammatory organic and sympathetic diseases of the heart. Lond. 1821.*

94) *Cases of organic diseases of the heart. Boston 1809.*

95) *Delle malattie del cuore, loro cagioni, specie, segni e cura. Libri tre, volumi tre. Bologna 1810 — 1811. Versio germanica, qua utor: Ueber d. Krankheiten des Herzens. Ein Auszug aus d. Italienischen mit Anmerk. v. KURT SPRENGEL. Halle 1815.*

96) *Die Krankheiten d. Herzens, systematisch bearbeitet u. durch eigne Beobachtungen erläutert. Berlin 1814 — 1817. 3 Theile.*

CHELT⁹⁷⁾, ne dicamus jam de auctoribus monographiarum singulorum morborum cordis, dissertationum *) et observationum specialium **). Illorum auctorum verba eo majoris momenti facere solemus, quo magis a jactantia alieni, ingenuitatem antecessorum imitantur⁹⁸⁾.

§. XIII.

Doctrinae difficultas, ordo et utilitas.

Doctr. dif- 1. Cum observationum copia et doctrinae
ficultas. *difficultas* increvit. Haec porro ex ipsa cordis
et

97) *Das Venensystem in seinen krankhaften Verhältnissen dargestellt.* Leipzig 1818.

*) A. JOS. SCHOEN diss. de curandis cordis affectibus. Jen. 1817. — J. W. AD. LUECK diss. adumbratio morbor. cordis generalis. Berol. 1819. — J. A. WALTER de statu quodam cordis abnormi. Berol. 1818. c. tab. lithogr. — F. W. L. PETERS diss. observ. anat.-pathologicae (cordis morbi quidam organici). Rost. 1823.

**) Excellit cl. NASSE v. HORN's *Archiv f. medicinische Erfahr.* 1819. July. August. p. 77.

98) „Ingenue de me fateri debeo, inquit ALBERTINI (l. c.), licet multa assidue contentione in contemplantis aegris earumque cadaveribus perscrutandis longo annorum cursu versatus sim, me tamen eoque minime profecisse, ut quod semel, iterum, saepiusque consexi in mortuis, id agnoscere valeam in vitam agentibus, ut signa nempe diagnostica explorata habeam atque perspecta, quibus dijudicem structurae vitium, quando subest sive in caudice venae cavae, sive in auriculis aut ventriculis cordis, sive in arteria

et vasorum sanguiferorum structura, adspectu quidem simplici, re ipsa autem implicata, oritur. Praeterea cor et vasa sanguifera raro uno dumtaxat vitio laborant, ac quoties plurimis vitiis simul tentantur, toties non amplius symptomata, quae singulo vitio propria sunt, sed alia atque alia, saepe contradictionis plena, apparent ⁹⁹). Augetur tandem doctrinae difficultas a vinculis systematicis, quibus nonnulli inter scriptores recentes, observationes inter se connectere satagerunt ¹⁰⁰).

2. Ad nos quod spectat, doctrinam cordis D. Ordo. morborum, arteriarum et venarum sine omni fuco systematico sequenti exponemus ordine: de illarum partium *vitiis congenitis*, — de morbo *coeruleo*, — de *inflammatione pericardii et cordis*, — de *adhaesione pericardii cum corde*, — de *hydropse et haemorrhagiis pericardii*, — de
cordis

aut vena pulmonali, sive in aorta, sive in universo corde aut pericardio.“

99) Pulchre de hoc argumento disseruit SANDER in HUFELAND's *Journal* 1820. *Novembr.* p. 19.

100) CORVISART morbos cordis in *quatuor classes* dividit, in morbos nempe: 1° involuorum membranaeorum cordis; 2° substantiae muscularis; 3° textus fibrosi et tendinum ac 4° in mixtos (l. c. p. X.). KREYSIG morborum cordis *tres classes* stabilivit, nempe 1° *dynamicos*; 2° *organicos* et 3° *mechanicos*, atque quamvis classin in genera et species subdivisit (l. c. I. Th. p. 70).

cordis polypo aliisque excrescentiis, — de ossificationibus cordis et de angore pectoris, — de cordis volumine aucto, imminuto, deque illius dislocatione, prolapsu et ruptura, — de inflammatione et lithiosi arteriarum, — de aneurysmatibus praecipue aortae, — de morbis vitia organica cordis et arteriarum simulantibus, — de inflammatione venarum, — de varicibus deque haemorrhagiis. Libro finem imponet tractatus de animi deliquiis.

D. utilis.
185.

3. Cum inter allatos morbos plurimi existant, qui, etiamsi prope cognoscantur, sanari tamen nequeunt¹⁾; placuit contendere²⁾, non esse:

1) Ait SENAC (l. c. p. IX.): „après avoir approfondi de telles maladies, on n'a, ce semble, que l'inutile satisfaction de mieux connaître l'impossibilité de les guérir.“

2) BROUSSAIS declarat (*Examen des doctrines médicales* p. 754.): „mais j'ai soutenu, que dans les affections du coeur, par exemple, cette détermination précise est de pure curiosité; qu'elle ne fournit rien à la thérapeutique, et que s'opiniâtrer à la chercher, c'est s'exposer au hasardeux, à l'hypotétique et même à l'imaginaire, dans l'interprétation des phénomènes pathologiques qui peuvent frapper l'observateur. Ainsi vouloir absolument prédire avant la mort s'il y aura déchirure de quelques colonnes charnues, des ulcérations, ou des végétations dans les ventricules ou dans les orifices artériels, de l'endurcissement aux valvules; une hernie des parois du coeur, leur dégénération tuberculeuse, fibreuse, cartilagineuse; l'ossification des vaisseaux cardiaques; c'est avoir des prétentions exagérées.“

esse operis pretii in illos accuratissime inquirere. Qui ita cogitant, officio medici desunt, in obscuritate ultro titubant, aegros sanabiles turpiter negligunt, insanabiles artis conaminibus supervacaneis, ipso morbo molestioribus, excruciant, ac gloriae per cadaveris sectionem diagnosin aliquando confirmandi, valedicunt. Verum hinc quoque est modus in rebus, et profecto, in diagnosi penitiori morborum cordis et vasorum majorum instituenda aequo modo tum incuria et indifferentia, tum ostentatio et magniloquentia, evitari debent.

CAPUT V.

De vitiis et anomaliis congenitis pericardii, cordis, arteriarum et venarum.

§. XIV.

De argumento generatim.

1. Nullum corporis humani systema, tot ^{Frequen-} vitia congenita tantasque anomalias, medico et ^{tia.} chirurgus scitu necessarias, exhibet; quam illud partium circuitui sanguinis dicatarum.

Literatu-
ra.

2. Legi de hoc argumento merentur auctores de anatomia pathologica ³⁾, de morbis cordis et vasorum sanguiferorum aliique mox commemorandi.

§. XV.

De vitiis congenitis pericardii et cordis.

De vitiis
congenitis
pericardii.

1. *Defectus pericardii* quamvis saepe appa-
rens sit ⁴⁾, atvero interdum et realis censen-
dus ⁵⁾.

De vitiis
congenitis
cordis.

2. Et *cor* saltem in monstris deficere pot-
est ⁶⁾.

3) Auctoribus jam allatis (P. I. Vol. I. IX. 22.) adde:
CONRADI *Handbuch d. pathologischen Anatomie*. Han-
nov. 1796. VETTER *Aphorismen aus d. patholog. Ana-
tomie*. Wien 1803. J. FR. MECKEL *Handb. d. pathol.
Anatomie*. Leipzig. 1. Th. 1812. 2. Th. 1816. OTTO
Handb. d. pathol. Anatomie d. Menschen u. Thiere.
Breslau 1814. BIERMAYER *Museum anatomico patho-
logicum nosocomii Vindobonensis* 1816. CERUTTI
*Beschreibung d. krankh. Präparaten des anatom. Thea-
ters zu Leipzig*. 1819.

4) Cfr. Cap. VIII. §. XXIX. N. 1.

5) BÜTTNER *in vielen Jahren gesammelte anatom. Wahr-
nehmungen*. Königsb. 1763. p. 77. Tab. 5. Ejusdem
*Anatom. Bemerkung. bey einem mit auswärts hängenden
Herzen lebendig geborn. Kinde*. Königsb. 1745. WEBER
in BALDINGER's *Magazin f. Aerzte*. 6. Th. p. 510.
DINKLER in SANDIFORT *Natur- en geneeskundige Bi-
bliothek*. Vol. I. p. 661. BAILLIE *Abhandlungen einer
med. Gesellschaft v. Aerzten in London*, übersetzt v.
ROOSE. N. 6. p. 89. OTTO l. c. p. 83. in nota. KREY-
SIG op. c. 2. Th. p. 620.

est ⁶⁾. Repertum quoque est cor duplex ⁷⁾,
triplex ⁸⁾ (vel simplex in gemellis coalitis ⁹⁾)
extra thoracem ¹⁰⁾ in pectore dextro ¹¹⁾ inver-
E 2 sum ²⁾,

- 6) *Philosophical Transactions. Vol. LVII. 1.* — J. VAN MEECKREN *Observ. med. chir. Cap XXXV.* — *Misc. Nat. Cur. Dec. II. Ann. 2. Obs. 143.* — SCHENK *Observ. med. rar. Lib. II. N. 181.* — FABRICII HILDANI *Observat. Cent. IV. Obs. 51.* — MARRIGUES in *Mém. de Mathemat. présentées à l'acad. des sciences, T. IV. p. 123—29.* *Journal de méd. chir. et pharm. par CORVISART etc. 1800. Octobre.* — MALACARNE *Oggetti più interessanti di Ostetricia e di Storia naturale. Padova 1807.* ELBER de *Acephalis sive monstros corde carentibus. Berol. 1821.* HALLERI *opusc. p. 210.* CURTIUS *Spec. inaug. de monstro humano cum infante gemello. Lugd. Bat. 1762. p. 19.* C. F. DANIEL's *Samml. med. Gutachten u. Zeugnisse. Leipz. 1776. p. 273.* — STARK's *Archiv. 2. B. 2. St. p. 59.* — BRODIE in *Philosoph. Transact. 17. 1809. p. 161. (Account of a dissection of a human foetus in which the circulation of the blood was carried without a heart).*
- 7) E. DE WESTHOVEN — *Ephem. Nat. Cur. Cent. VII et VIII. p. 264.* — ESSEN *Svenska Vetensk. Acad. Nya Handl. A. 1791. p. 152.* — F. A. A. MEYER's *Magazin für die Thiergeschichte. 1. B. 2. St. p. 178.* — STARK's *Archiv. 4. B. p. 399.* — OSIANDER's *Denkwürdigkeiten. 1. B. 1. St. p. 191.* — HALLER de *corp. hum. fabrica. T. II. p. 328.* COLLOMB in REIL's *Archiv f. die Physiologie. 4. B. p. 213.*
- 8) KERKRING *Specil. Anat. Amst. 1671. Obs. 69.*
- 9) CRISTELL de *partu gemellorum coalit. p. 53.*
- 10) HEROLD in STARK's *Archiv. 1. B. 1. St. p. 46.* — HALLER *opusc. pathol. Obs. 29.* — PROCHASKA ad-

68 DE VIT. ET ANOMALIIS CONG. PERICARDII,
sum ¹²⁾, prolapsus ¹³⁾, horizontale ¹⁴⁾, perpen-
dicu-

notat. academ. Pragae 1784. Fasc. III. p. 172. Tab. 2.
3. — *Abhandlungen d. Schwedischen Akademie d. Wis-
sensschaften.* 24. B. p. 27. — VOIGTEL fragm. semio-
log. obstetr. p. 77. Tab. V. — BÜTTNER et WEBER
l. c. — LENHOSSEK *Nachricht von einem menschlichen
Foetus, der mit einem Bauchbruche, in welchem das
Herz, die Leber u. der größere Theil des Dünndarms
enthalten waren, geboren wurde.* v. *Medicinische Jahr-
bücher des K. K. Oesterr. Staates.* 4. B. 3. St. —
SCHULZ Act. Acad. R. Scient. Suecicae a. 1765. Vol.
24. p. 27. — MARTINEZ in HALLERI disput. Anat.
Vol. II. p. 510.

- 11) MOHRENHEIM in *Wiener Beyträge zur pr. Arzney.
Wundarzn. und der Geburtsh.* Dessau u. Leipz. 1783.
2. B. p. 305. — ELVERT Binae observationes de he-
patitide cum naturali vesiculae felleae defectu, nec
non de phthisi pulmonali in viro cui cor in dextro
pectore pulsabat. Tübing. 1780. Cfr. W. WEDEL in
Misc. Acad. N. Cur. D. I. A. 2. 1674. p. 296. — R.
LENTILIUS. ib. Dec. III. A. I. 1694. App. 130. —
DOEBELN Act. Acad. Nat. Cur. Vol. IV. p. 505. —
BUXTORF Acta Helvetica. Vol. VIII. p. 101—118. —
BARTHOLINI Act. Hafn. T. I. Obs. 44. p. 135. —
Miscell. Nat. Cur. Dec. I. Ann. 2. Obs. 194. — Mo-
RAND in *Mém. de l'académ. de scienc.* 1732. — WAL-
TER *Mém. de l'acad. de Berlin.* 1775. p. 139. *Anat.*
Mus. 1. B. p. 170. — TODE *Arzneykundige Annalen.*
8. Heft. p. 70. — *Abh. der Joseph. Akad. in Wien.*
1. Th. p. 273. — VERMALE in Nov. Act. Nat. Cur.
Vol. I. p. 313. — MECKEL diss. de cordis conditioni-
bus abnormibus p. 4. §. 4. Tab. I. — ROSTAN *Notes
sur une transposition générale des viscères.* v. *Nouv.*

diculare ¹⁵⁾ profundum ¹⁶⁾, complanatum ¹⁷⁾, rotundum ¹⁸⁾, ad apicem bipartitum ¹⁹⁾, magnum ²⁰⁾,

Journal de méd. chir. et pharm. 1818. *Mai.* p. 29. — OTTO l. c. p. 88. Not. 9. — OMER *Observateur des sciences médicales* 1822. *Mars.* — BARTON in the *American med. Repository.* Vol. 4. 1821. *Avril.*

12) A. MAELLENBROC in *Misc. Acad. Nat. Cur.* Dec. I. A. 2. 1671. p. 139. — J. TORRES *Mém. de mathém. et de physique.* T. I. p. 136. et *Philosoph. Transact.* F. 1741. — DESCHAMPS in SÉDILLOT *Recueil périod. de la Soc. de méd. de Paris.* T. XXVI. p. 275. — FR. HOFFMANN *Cardianastrophe seu cordis inversio in foemina.* Lips. 1671. HALLER *El. physiol.* T. f. p. 136. Ejusdem *Corp. hum. fabrica.* Lib. IV. Sect. 2. p. 89. — *Commentaria de rebus in scientia naturali et medicina gestis.* Vol. I. P. I. p. 11 — 13.

13) CHAUSSIER *Bulletin de la faculté.* N. 15. BOUDIN *Gazette de Santé* 1814. *Juil.* (ad regionem epigastricam tumor conspiciebatur, a corde ibi sito ortus. Translucabant per integumenta dilatatio et contractio cordis).

14) *Acta Nat. Cur.* Vol. X. p. 17. *Abhandl. der Soc. Med. Chir. Acad.* p. 265.

15) HALLER de *corp. hum. fabrica.* T. II. p. 89. — SANDIFORT *Obs. anat.* Lib. IV. C. 6. p. 55. — KLINZ in *Abh. der Josephs-Akad.* 1. B. p. 273.

16) WILSON in *Philosoph. Transact.* 1798. P. II. p. 346. RAMEL *Journ. de méd. par COLOMBIER.* 1778. p. 423.

17) C. STALPARTI VAN DER WIEL *Observat. raior. med. anat.* Lugd. Bat. 1687. Cent. I. Obs. 37. KULMUS in *Act. Lips. An.* 1727.

18) BLEGNY *Zodiac. Gallic.* An. 2. Jan. Obs. MOR-

gnum²⁰⁾, parvum²¹⁾, cavitatibus expers²²⁾, cum auricula dextra dilatata²³⁾, cum singulo ventriculo²⁴⁾, cum singulo atrio²⁵⁾, cum singulo ventriculo et atrio²⁶⁾, cum ventriculis tribus²⁷⁾,

GAGNI de sed. et caus. morb. Epist. XVII. §. 12. (apex rotundus).

19) HARVEY de generatione p. 235. (bicipiti cono, parvos nucleos gemellos referens). BARTHOLINUS l. c. Cent. I. hist. 67. T. I. p. 117.

20) KULMUS in Act. Lipsiens. a. 1727.

21) KERRING Specil. anatom. p. 43. — Cfr. J. BELL in *Samml. auserl. Abhandl. f. pr. Aerzte. XVII. B.* p. 503. — MORGAgni l. c. Epist. LXX. Art. 5. Cfr. Epist. XVII. 12. Epist. XXX. 10. Epist. L. 4. — STOERK Ann. med. II. p. 231. — VETTER *Aphor. der pathol. Anatomie.* p. 101. in nota. — KERRING v. MECKEL l. c. p. 47.

22) Miscell. nat. cur. Dec. II. An. 2. Obs. 143. Dec. II. An. 2. Obs. 9. — VESSLINGII Syntagm. Anat. p. 150. — ZAGORSKI in Nov. Act. Petrop. T. XV. A. 1806. p. 473.

23) CAILLIOT apud MECKEL l. c. p. 140.

24) LANZONI in Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. 9. Obs. 44. — COLUMBUS de re anat. Lib. XV. p. 489. — SCHENK Obs. med. Lib. II. Obs. 164. p. 354. ROEDERER foetus parasitici descriptio in Comment. Soc. Gotting. Vol. IV. p. 125. — FARRE l. c.

25) MERY in *Mémoires de l'acad. des sciences de Paris.* 1700. p. 54. FARRE l. c.

26) WILSON *Philos. Transact. Lond.* 1799. P. XI. — STARK's *Neues Archiv.* 1. B. 3. St. p. 355. — REIL's *Archiv f. Physiologie.* 4. B. 3. St. p. 450. FARRE l. c. p. 4.

bus²⁷⁾, cum ventriculis duobus aequalis magnitudinis et crassistiei²⁸⁾, cum valvulis arteriae pulmonalis duabus²⁹⁾, quatuor³⁰⁾, cum valvulis aortae³¹⁾ et tricuspidalibus³²⁾ modo maximis, modo minimis, modo nodulis Morgagnianis expertibus³³⁾, modo nodis abnormibus instructis³⁴⁾, cum foramine ovali aperto³⁵⁾, e loco consueto remo-

27) CHEMINEAU in *Mémoires de l'acad. des sciences.* 1699. p. 42.

28) SANDIFORT, CAILLIOT, ABERNETHY, MECKEL l. c. p. 439.

29) PETSCHKE Syll. anat. select. N. 48. p. 775. — J. TH. WALTHER Observ. Anat. Berol. 1775. p. 1775. p. 19. — SANDIFORT Obs. anat. pathol. L. I. Cap. I. p. 31. Tab. II. Lib. III. Cap. I. p. 19. Tab. VI. fig. 3. p. 40. — HUNTER on the blood. Lond. 1799. p. 150. MECKEL diss. cit. p. 31. Tab. II. fig. I. 2. 3.

30) MORGAGNI Epist. XXXIV. 15. PETSCHKE Sylloge Anat. Select. N. 47. in HALLERI Coll. disput. anat. Vol. VI. p. 774. PENADA Saggio terzo d'osservazioni e memorie medico-anatomiche. Padova 1804.

31) MORGAGNI Epist. XLIII. 17. — Epist. XVII. 12. Epist. XXIV. 18. SANDIFORT Obs. anat. patholog. Lib. I. Cap. I. p. 22.

32) MORGAGNI Epist. XVII. 12.

33) OTTO l. c. p. 93.

34) SOEMMERRING *Anmerkungen zu* BAILLIE p. 21.

35) ALBIN Annot. acad. Lib. I. Obs. 9. p. 34. — LITRE *mém. de Paris* 1700. *Hist.* p. 40. — AMYAND *Philosoph. Transact.* Y. 1735. p. 172. — LE CAT ib. Y. 1741. p. 681. — BRENDEL *Ephem. Nat. Cur.* Cent. III et IV. p. 376. — WIDEMANN ib. Cent. V. VI. p.

remoto ³⁶⁾, duplicato ³⁷⁾, cum defectu valvulae foraminis ovalis ³⁸⁾ et valvulae Thebesii ³⁹⁾, cum val-

385. LENTILIUS ib. Cent. VII. et VIII. p. 129. ACRELL *Svenska Vetensk. Acad. Nya Handl.* 1786. p. 49. — MORGAGNI l. c. Epist. XVII. 12. Epist. XLVIII. 62. — SANDIFORT Obs. Anat. pathol. Lib. I. Cap. I. p. 16. Tab. I. II. III. Ejusdem Museum Anat. Vol. I. Sect. V. N. 7. p. 234. — LEVELING Observ. Anat. rariores. Fasc. I. — ROEDERER de suffocatis, opusc. p. 288. — TABARRANI in *Atti dell' Acad. delle scienze di Siena. T. 3. Opp.* p. 41. — STOLTE de morte suspensorum p. 15. — HALLER Elem. physiol. T. III. p. 258. T. VIII. Part. II. p. 12. — HAGSTROEM über das eyrunde Loch der Scheidewand d. Herzhohren, wenn es bei einem Erwachsenen offen steht; in den *Abhandl. der Königl. Schwed. Acad. der Wissensch., übersetzt von KÄSTNER und BRANDIS.* 7. B. — HUNTER *Med. Observ. and inquiry.* Vol. 6. p. 291. — JURINE *Mém. de la Soc. de méd. T. X.* — MECKEL l. c. p. 448. SEILER in HORN's *neues Archiv f. med. Erfahrung.* 2. B. p. 204. SPRY in *Mem. of the med. Soc. of London. Vol. VIII.* p. 137. — VETTER *Aphor. aus der pathol. Anatomie. Wien* 1803. p. 109. — WEITBRECHT *Comment. Acad. Petropol. T. IV.* p. 264.

36) TREU de differ. inter hom. nat. et nasc. T. I. f. 21. MORGAGNI op. c. Epist. XV. 46. — HUNAULD in *Mém. de l'acad. des sciences* 1735. p. 26.

37) VIEUSSEUX, MORGAGNI, SANDIFORT, DÜRET, ABERNETHY, MECKEL l. c. p. 450.

38) PLANCUS de sanguinis per cor motu.

39) LINDNER diss. de lymphat. vasorum systemate. Ha-lae 1787. p. 2.

valvula Eustachii praemagna ⁴⁰⁾, cum septo ventriculorum perforato ⁴¹⁾, imperfecte evoluto ⁴²⁾, cum arteriis coronariis tribus, quin immo quatuor ⁴³⁾; cum vena coronaria magna sese deplente in atrium venarum pulmonalium ⁴⁴⁾, inque venam subclaviam dextram ⁴⁵⁾, cumque venis coronariis in unum truncum concurrentibus ⁴⁶⁾.

§. XVI.

De vitiis congenitis et anomaliis arteriarum et venarum.

1. *Arteriae* a norma deflectere possunt ⁴⁷⁾ De vitiis arteria-
quoad numerum, originem, decursum et volu-
men.

40) WOLFF de foramine ovali in Comment. Petropol. T. XX. MECKEL l. c. p. 458.

41) *Medic. Observations and inquiry. Vol. 5.* — PULTNEY *Med. Transact. Vol. 3.* — SANDIFORT *Mus. Anat. Vol. I. p. 234. N. 7.* Ejusdem *Obs. Anat. pathol. l. c.* — FARRE ex observat. COOPER, RING, LAWRENCE.

42) STANDERT v. MECKEL l. c. p. 424.

43) J. F. MECKEL in nota ad opus CUVIER *Vorlesungen über vergleichende Anatomie. 4. B. p. 79.*

44) MECKEL. v. LINDNER l. c.

45) SOEEMMERRING l. c.

46) LE CAT *Mém. de Paris. A. 1738. Hist. p. 44.*

47) LODER nonnullae arteriarum varietates. Jenae 1786. — WHISBERG varietatum angiologicarum per XXX. annos seriem in corpore humano observatarum P. I. quae arteriam aortam et carotidem complectitur.

men. Sic in monstris cum defectu dimidii corporis superioris, arteriae vel omnes, vel plurimae deficere solent ⁴⁸). Gibbositas, vasorum sanguiferorum directiones saepe immutat ⁴⁹). Arteriae totius corporis detectae fuere solito modo angustiores ⁵⁰), modo ampliores ⁵¹). *Ductus arteriosus Botalli* nunc deficit ⁵²), nunc, veluti in foetu apertus est ⁵³). Oritur ille ductus hinc inde

Goett. 1791. J. F. MECKEL *Ueber d. Verlauf d. Arterien u. Venen. v. Deutsches Archiv f. die Physiologie.* 1. B. 2. H. p. 125.

48) MECKEL l. c. 1. Th. p. 125.

49) WATZEL diss. de efficacia gibbositatis in mutandis vasorum directionibus. Francf. ad Viadr. 1778. (Aorta incurvata).

50) MORGAGNI de sed. et causis morborum. Epist. XXX. 12.

51) GRAEFE de notione et cura angiectaseos labiorum ratione habita communis vasorum extensionis. Lips. 1807.

52) CHEMINEAU in *Mém. de l'acad. des sciences* 1699. p. 42. BARTHOLINUS Act. Hafn. T. 1. N. CX. p. 200. SANDIFORT l. c.

53) FRANKISCHE Samml. 4. B. p. 242. — SANDIFORT l. c. — MUTH in *den Geschichten u. Versuchen einer Chir. Privatgesellschaft in Kopenhagen.* 1774. — DE WITT in *Verhandelingen van het Batafsch Genootschap te Rotterdam.* 1775. T. II. p. 195. — WRISBERG in *Götting. gelehrt. Anzeig.* 1778. N. 50. et *Anmerk. zu HALLER's Grundriss der Physiologie f. Vorlesungen; übers. und mit Anmerk. begleitet von TH. SOEMMER-*

inde vel ex arteria pulmonali ante illius bipartitionem desinendo in arteriam subclaviam sinistram⁵⁴⁾, vel ex ventriculo cordis dextro sub arteria pulmonali⁵⁵⁾. Haec arteria detecta est in tres ramos divisa⁵⁶⁾, oblitterata⁵⁷⁾, minima⁵⁸⁾, cum duobus cordis ventriculis cohaerens⁵⁹⁾, nata ex aorta⁶⁰⁾, ex ventriculo cordis sinistro⁶¹⁾, in aortam cum duobus suis ramis desinens⁶²⁾, et, postquam ramos dederat pulmonibus, vices aortae

RING u. PH. F. MECKEL. *Berlin* 1788. p. 77. §. 114.
Anmerk. 54.

51) OBET in *Bulletin des sciences médicales par la Société médicale d'émulation* 1803. May.

55) OTTO l. c. p. 101.

56) Idem ib. p. 100.

57) HUNTER in *medical Observat. and inquir.* Vol. 4. p. 230. — *Memoirs of the medical Society.* Vol. I. p. 228. — *Samml. auserl. Abhandl. f. pr. Aerzte.* 17. B. p. 478. FARRE l. c.

58) SANDIFORT, STENSON, HUNTER, ABERNETHY, CALLIOT et DURET. v. MECKEL. l. c. p. 433.

59) COOPER apud FARRE l. c.

60) WILSON in *Phil. Transact.* Y. 1798. P. II. p. 463. STANDERT ib. 17. 1805. (Corde tantum singula auricula singuloque ventriculo praedito). SÉDILLOT *Rec. périodique de la Soc. de méd. de Paris.* T. 13. p. 74. (Arteria pulmonalis ex aorta abdominali orta).

61) BAILLIE, LANGSTOFF et FARRE l. c. (Aorta oriebatur simul ex ventriculo cordis sinistro).

62) LOESEKE *Observ. anat. Chir. med. rar.* p. 26. Tab. III.

tae descendens agens ⁶³). Reperiebatur *aorta* e corde sejuncta ⁶⁴), angusta ⁶⁵), ortum ducens ex utroque cordis ventriculo ⁶⁶), ex ventriculo dextro ⁶⁷) et ex ventriculo sinistro cum duobus radicibus ⁶⁸). Exhibuit truncus aortae rimam, per quam trachea et oesophagus penetrabant ⁶⁹). Nascebantur ex *arcu aortae* (deficiente trunco anony-mo) rami duo ⁷⁰), quatuor et quinque ⁷¹); am-bae carotides deindeque arteria subclavia dextra ⁷²), inter:

63) STEIDELE *Samml. chir. Beobacht.* 2. B. p. 114. (Aorta solum partibus superioribus providebat). KREYSIG op. c. 3. B. p. 108.

64) ROEDERER de foetu parasitico. v. *Comment. Soc. Goett.* T. IV. p. 121.

65) MORGAGNI *Epist.* XXX. 12. *Epist.* XVIII. 2. MECKEL l. c. p. 474.

66) NEVIN *medic. Comm.* Dec. II. Vol. 9. p. 325. v. *Samml. auserl. Abhandl. f. pr. Aerzte.* 17. B. 1. St. p. 86. et: *Commentarien von einer Gesellschaft d. Aerzte zu Edinburgh. Uebers. v. A. FR. A. DIEL. Altenb.* 1797. Dec. 2. Vol. 9. SANDIFORT l. c.

67) BAILLIE *Series of engravings to illustrate the morbid anat.* Fasc. I. Tab. VI. v. *Samml. auserl. Abhandl. f. pr. Aerzte.* 20. B. p. 332.

68) STEIDELE l. c. p. 114.

69) HOMMEL *Commerc. Liter.* Norimb. 1737. p. 162.

70) CONRADI l. c. p. 40. (ex MORGAGNI).

71) PH. A. BOEHMER *Observat. binae de 4 et 5. ramis ex arcu aortae magnae ascendentes.* Hal. 1744.

72) SANDIFORT *Obs. anat. pathol.* T. I. p. 78. *Journal de médecine.* 1791. Février. N. 8.

inter oesophagum et laryngem decurrens ⁷³). Ex arcu aortae pullulabant etiam, utrinque et separatim, carotides et arteriae subclaviae ⁷⁴). Interdum truncus anonymus usque ad corpus thyreoideum ascendit ⁷⁵). Visus ille est sinistrorsum depressus arteriam subclaviam et carotidem ejusdem lateris suppeditans, iisdem arteriis in latere dextro ex aorta provenientiibus ⁷⁶). Aorta quandoque non super ramum tracheae sinistrum, sed super dextrum, retro oesophagum, ad latus sinistrum columnae vertebralis decurrit ⁷⁷). Deficiebat *carotis cerebralis dextra*, canale carotico vix setam porcinam admittente ⁷⁸). Describuntur *carotides*, quae, cum ad suae longitudinis medium ascendissent, ibi se intorquebant cochleae instar ⁷⁹). Alias *carotis dextra* tracheam transversim decussabat ⁸⁰). *Carotis* interdum jam inferius, circa marginem scilicet superiorem vertebrae sextae cervicalis, bipartitur, sicque cum

duo-

73) BAYFORD in *Mem. of the med. Society of London* Vol. 2. 1789. p. 271. — AUTENRIETH resp. PFLEIDERER diss. de dysphagia lusoria. Tubing. 1806. — ALLAN BURNS l. l. p. 322. (Observatio MORGAGNI).

74) NEVIN l. c. MECKEL l. c. p. 434.

75) ALLAN BURNS l. c. p. 323.

76) CAILLIOT, DURET, OBET, MECKEL l. c. p. 435.

77) MECKEL l. c. p. 435.

78) TODE *med. chir. Bibl.* 10. B. p. 407.

79) MORGAGNI *Epist.* XLIX. 18.

80) ALLAN BURNS l. c. p. 325.

duobus ramis ad latera colli ascendit ⁸¹). Quandoque truncus communis carotidis non bipartitur in ramum externum et internum, sed primi rami carotidis externae quot quot sunt ad latera trunci nascuntur ⁸²). Carotis externa aliquando truncum brevem, crassum, arteriae coeliacae similem, exhibet, ex cujus extremitatibus rami prodeunt ⁸³). Exempla habentur, ubi carotis non bipartitur ad collum, et ramos laterales eousque suppeditat, donec haud pervenerit super angulum maxillae. Tunc autem e regione processus mastoidei bipartitur, uno ramo carotidem internam constituyente, altero truncum communem arteriae temporalis et maxillaris efficiente ⁸⁴). Rami, qui ex *carotide externa* profisciscuntur, multis anomaliis subjici solent, quod inprimis de *arteria thyreoidea superiore* et de *arteria linguali* valet. Ambae hae arteriae truncum communem, ex carotide emergentem, constituebant ⁸⁵). Et rami, qui ex *arteriis subclaviis* oriuntur, anomaliis haud carent. Obvenerunt ambae *arteriae thyreoideae inferiores* in trunco communi ex arteria subclavia lateris dextri ortum trahentes ⁸⁶). *Arteria vertebralis* ut ramus spe-

cialis:

81) Idem, ib. p. 326.

82) Idem, ib. p. 327.

83) Idem, ib. p. 328.

84) Idem, ib.

85) Idem, ib. p. 330.

86) Id. ib. p. 331.

cialis ex aorta nascebatur⁸⁷⁾. Apparuit *arteria coeliaca* duplex⁸⁸⁾, et triplex⁸⁹⁾ cum ramis modo duobus, modo quatuor⁹⁰⁾. Deficiebat quoque *arteria coeliaca*, ramis suis tribus directe ex aorta prodeuntibus⁹¹⁾. Prodibant etiam ex aorta, singulatim tunc *arteria coronaria ventriculi*⁹²⁾, tum *arteria hepatica*⁹³⁾; haec quoque ex *arteria mesenterica* nascebatur⁹⁴⁾. Erant *arteria lienalis* duplex⁹⁵⁾ et *arteria mesenterica* triplex⁹⁶⁾, sine anastomosi⁹⁷⁾. Aorta suppeditabat tres *arterias renales*⁹⁸⁾ et *arterias spermaticas*⁹⁹⁾. Prominebat aorta adeo, ut ante vesicam

87) Id. ib. p. 332. CONRADI l. c. FARRE l. c.

88) MORGAGNI. Epist. LXX. 9.

89) Idem, Epist. LIII. 37.

90) OTTO l. c. p. 103.

91) Idem l. c. p. 103. Nota 28.

92) MAYER *Beschreibung der Blutgefäße*. p. 158.

93) SANDIFORT l. c. L. II. C. 7. p. 126.

94) ISENELAMM Comment. Vol. III.

95) SOEMLERRING l. c. p. 304.

96) MORGAGNI. Epist. LIII. 37.

97) VICQ-D'AZYR *Observation sur un sujet dans lequel la grande anastomose, qui reunit les deux artères mésentériques, manquoit absolument*. v. *Mém. de Paris* a. 1776. *Mém.* p. 702.

98) MORGAGNI. Epist. LXVI. 8.

99) CONRADI l. c. p. 41. Cfr. de arteriis spermaticis deficientibus: in *Miscell. Nat. Cur.* Dec. I. A. 3. 1672. p. 183. RAYGER ib. a. 4 et 5. p. 1. MORTIMER *an account of some uncommon anastomosis of the spermatic Vessels in a Woman*: in *Phil. Transact.* Y. 1730. p.

cam urinariam et uterum in *arterias iliacas* divideretur ¹⁰⁰). Legitur de *arteria renali sinistra*, arteriam ad vesicam urinariam mittente ¹), — de *arteriaca iliaca sinistra*, duplici ratione longiore quam dextra ²); — de *arteria umbilicali* ex aorta ortum ducente ³), singula ⁴) postque partum aperta relicta ⁵). *Arteriae umbilicales* nonnunquam in unum truncum coalescunt ⁶). *Arteriae pudenda communis* adhaeret interdum partibus lateralibus et inferioribus vesicae urinae et attingit sectionem superiorem prostatae ⁷). Decurrebat *arteria obturatoria* ex crurali orta, sub annulo abdominali ⁸). Deficiebat *arteria peronea* ⁹). Narratur de *arteria brachiali* duplici ¹⁰)

373. BSCHERER de arteriae spermaticae sinistrae propagatione rariori; in Misc. Acad. Nat. Cur. Dec. II. a. 4. 1685. p. 337.

100) OTTO l. c. p. 104. (*) et: Monstr. sex hum. anat. et phys. disquisitio. Francf. ad Viadr. 1811. p. 38.

1) MORGAGNI. Epist. LXX. 7.

2) Idem, ib. Epist. XLVIII. 34.

3) KERKRINGII Specil. anat. Obs. 9.

4) OTTO l. c. p. 104.

5) Idem, ib. p. 104.

6) WEITBRECHT in Comment. Acad. Petrop. T. IV. p. 263. Cfr. HUBER in Act. Nat. Cur. Vol. 9. p. 382.

7) ALLAN BURNS l. c. p. 350.

8) MAYER l. c. p. 207. OTTO l. c. p. 104. Cfr. HESSELBAOH in der Salzbg. med. chir. Zeitung. 1811. N. 62. p. 186.

9) ISENFLAMM l. c.

ci ¹⁰⁾ deque illa jam in parte superiore humeri in arteriam ulnarem et radialem bipartita ¹¹⁾. *Arteria radialis* super articulum primae phalangis pollicis decurrebat ¹²⁾. Haud raro illa super dorsum radii decurrit, conceditque locum suum *arteriae volari*, quae, utpote tenuis et parva medicum pulsum explorantem facile in errorem ducit ¹³⁾.

2. *Venae* easdem quas arteriae varietates, De vitiis licet rarius ¹⁴⁾, exhibere solent. Sic monstra ^{venarum.} acephala interdum venis carent ¹⁵⁾. *Vena jugularis externa* triplex quoad progressum, et, quoad insertionem quadruplex erat ¹⁶⁾. *Vena cava* potissimum in gibbosis, curva reperiatur ¹⁷⁾. *Vena cava descendens* anomalias exhibuit ¹⁸⁾.

10) MOHRENHEIM op. c. 2. Th. ISENFLAMM l. c. CHR. G. LUDWIG. Progr. de varietatibus arteriae brachialis ramorum, in aneurysmatis operatione attendendis. Lips. 1767.

11) ALLAN BURNS l. c. p. 336.

12) GILIBERT *Beobachtungen*. p. 159. Cfr. ESCHENBACH *Verm. med. u. chir. Wahrnehm.* Leipz. 1784. 1. B. p. 1.

13) ALLAN BURNS l. c. p. 343.

14) MECKEL *Deut. Archiv f. d. Physiologie* l. c. contra HALLERI opinionem.

15) WINSLOW in *Mém. de l'académie des sciences*. 1740. p. 811.

16) WILDE in *Comment. Acad. Petrop.* T. XII. p. 316.

17) MORGAGNI l. c. Epist. LVI. 21.

Frank *Prax.* II. 2. 2.

buit ¹⁸). *Vena cava ascendens* duplex erat ¹⁹). Sub diaphragmate in illa *valvulae* repertae sunt ²⁰). Septem *venae pulmonales* observatae fuere ²¹). Duplex erat *vena subclavia* ²²), et *vena azygos* ²³). Haec mirum in modum interdum distribuitur ²⁴) bifurcaturque ad basin cordis ²⁵). *Vena umbilicalis* aperta remansit ²⁶). Deficiebat *vena cephalica* in brachio dextro ²⁷).

CAPUT

- 18) MURRAY *Beschreibung einer ganz sonderbaren Stellung und Vertheilung der obern Blutader des vorderen Herzhohrs*; in *neu. Schwed. akad. Abhandl.* 1781. p. 283.
- 19) *Abhandl. der chir. Akad. zu Wien.* 1. B. WILDE l. c. p. 262.
- 20) REISSEL in *Miscell. Acad. Nat. Cur. Dec. I. A.* 9 et 10. p. 316. — WINSLOW in *Mém. de Paris a. 1717. Hist.* p. 17. *Mém.* p. 211.
- 21) MÜLLER *diss. exhibens Syllogen observationum quorundam anatomicarum.* Giessen 1760.
- 22) MORGAGNI *Epist.* LXIX. 2.
- 23) WRISBERG de *vena azyga duplici aliisque hujus venae varietatibus.* Goett. 1777. — SANDIFORT *Obs. anat. pathol.* L. II. — GUATTANI in *Mém. de mathématique et Physique.* T. 3. p. 512. — WILDE l. c. p. 318. — VALENTIN in *Journal de méd. février 1791*.
- 24) MEISTER de *singulari et pulchra distributione venae azygos*; in *Ephem. Acad. Nat. Cur. Cent. 7 et 8* p. 369.
- 25) LE CAT in *Mém. de Paris. A.* 1738. *Hist.* p. 45.
- 26) MECKEL l. c. p. 468.
- 27) MORGAGNI *Epist.* LIV. 45.

CAPUT VI.

De morbo coeruleo.

§. XVII.

Definitio. Literatura.

1. **L**ivor cutis, praecipue ad labia, manus et pedes, cum extremitatum frigore, cordis motu abnormi, dyspnoeâ periodice recurrente, imbecillitate musculorum et proclivitate ad haemorrhagias, *morbum coeruleum*¹⁾ constituit.

2. Morbi hujusmodi mentionem primum in-Literatura.
stituerunt: MERY²⁾, STENSON³⁾, MORGAGNI⁴⁾,
J. HUNTER⁵⁾ et SANDIFORT⁶⁾. Illustrarunt illius

F 2

doctri-

1) *Syn. Cyanosis, Coerulosis. GALL. Ictère bleu, cachexie bleue. GERM. die blaue Krankheit, die Blausucht.*

2) *Mém. de Paris. 1700. Hist. p. 54.*

3) *Acta Hafn. T. I. p. 200.*

4) *De sed. et caus. morb. Epist. XVII. Art. 12.*

5) *Medical observations and inquiries. Lond. 1772. Vol. 4. p. 330. Vol. 6. p. 291. — Memoirs of the medical Society. T. I. p. 238.*

6) *Observationes anatomicae pathologicae. C. I. p. 16.*

doctrinam LENTIN ⁷⁾, PULTENEY ⁸⁾, NEVIN ⁹⁾,
 ABERNETHY ¹⁰⁾, TROLLER ¹¹⁾, CAILLIOT et DU-
 RET ¹²⁾, OBERT ¹³⁾, PALOIS ¹⁴⁾, SPRY ¹⁵⁾, JURI-
 NE ¹⁶⁾, TACCONI ¹⁷⁾, SCHULER ¹⁸⁾, SACHSE ¹⁹⁾,
 MARCET ²⁰⁾, NASSE ²¹⁾, BAILLIE ²²⁾, STAN-
 DERT ²³⁾, KAEMMERER ²⁴⁾, HAASE ²⁵⁾, GIN-
 TRAC ²⁶⁾,

7) *Beyträge zur ausübenden Arzneywissenschaft. Leipzig*
 1798. 2. B. p. 68—78.

8) *Medical Transactions. Vol. 3.*

9) *Medical Commentaries by DUNCAN. Dec. II. Vol. 9*
 et 10.

10) *Philosophical Transactions. Y. 1798. P. I. Et Chir.*
und phys. Versuche, übersetzt von BRANDIS 1795.

11) *Medical and chemical Essays. Lond. 1796.*

12) *Bulletin de la Soc. méd. de Paris. 1801. p. 153.*

13) *Bulletin des sciences médicales. 1808.*

14) *Bulletin de la Soc. de méd. de Paris. 1809.*

15) *Memoirs of the med. Society of Lond. Vol. 8. p. 150.*

16) *Mémoire de la Soc. de méd. de Paris. T. X.*

17) *Comment. Instituti Bononiensis. 1785. T. VI. p. 64.*

18) *Diss. de morbo coeruleo. Oeniponte 1810.*

19) *HUFELAND'S Journal der pr. Heilk. 15. B. p. 127.*

20) *Medical and surgical Journal of Edinb. 1805. p. 412.*

21) *REIL'S Archiv f. Physiologie. 10. B. 2. Heft. Et An-*
hang zu ALLAN BURNS l. c.

22) *Anatomie des krankhaften Baues, von SÖMMERING.*
Berlin 1794. p. 21—25.

23) *Philosoph. Transact. Y. 1805. v. HARTLES u. RITTER*
Neues Journal f. die ausländ. med. Litteratur. 7. B.
1. Heft.

24) *Diss. de morbo coeruleo. Hal. 1811.*

25) *Diss. de morbo coeruleo cum tabulis aeneis. Lips.*
1813.

TRAC ²⁶⁾, MÜLLER ²⁷⁾, FLEISCHMANN ²⁸⁾, SEILER ²⁹⁾, THOMAS ³⁰⁾, POLIMERE ³¹⁾, HOWSHIP ³²⁾, GROSS ^{*)}, KWIATKOWSKI ³³⁾, MARX ³⁴⁾, M. RICHTER ³⁵⁾, BIELKIEWICZ ³⁷⁾, RYMKIEWICZ ³⁸⁾, HESSELBACH ³⁹⁾, OLIVRY ⁴⁰⁾, ZIMMERMANN ^{**)}, PETERS ^{***)},

26) *Recherches analytiques sur diverses affections dans lesquelles la peau présente une couleur bleue et en particulier, sur celle qu'on a designé sous le nom de cyanose.* Paris 1814.

27) HORN's *Archiv f. med. Erfahrung.* Jahrgang 1822. May, Junius. p. 438.

28) *Leichenöffnungen.* 1815. p. 193. — de chondrogenesi asperae arteriae et de situ oesophagi abnormi nonnulla. Erlang. 1820.

29) HORN's *Neues Archiv f. med. Erfahrung.* 2. B.

30) In *Memoirs of the med. Society.* Vol. 6. Lond. 1813.

31) *Bibliothèque médicale.* T. LVII. 1817. p. 145. — HUFELAND's *Journal der prakt. Heilk.* 1819. Octob. p. 72.

32) *The Edinb. med. Journal* 1813. Vol. 9. N. 36. III. p. 399.

*) Diss. de infante morbo coeruleo laborante. Marb. 1818.

33) Diss. aetiologiam morbi coerulei amplificans. Vilnae 1815.

34) Diss. morbi coerulei exemplum memorabile. Berol. 1820.

35) De cyanosi cardiaca. Mosquae 1821.

37) *Dziennik Medycyny, Chirurgii i Farmacyi, przez Cezarskie Towarzystwo Lekarskie w Wilnie wydawany.* 1822. T. I. N. 1. p. 93.

38) ibidem. T. II. N. 1.

39) *Medicinisch-chirurgische Zeitung* 1820. N. 82. p. 57.

TERS ***), GREGORY⁴¹⁾, MARECHAU⁴²⁾, SEIDEL⁴³⁾, THIBERT et FOUQUIER⁴⁴⁾, ALLAN BURNS⁴⁵⁾, KREYSIG⁴⁶⁾, FARRE⁴⁷⁾ maximeque MECKEL⁴⁸⁾.

§. XVIII.

Symptomata. Autopsia cadaverum.

Sympto-
mata.

1. *In morbo coeruleo congenito*, recens natus praevio interdum universae cutis pallore, livorem, quandoque subrubrum manuum pedumque modo evanescentem modo redeuntem⁴⁹⁾ exhibet. Livor iste sub actu suctionis (saepè interrupto), sub vagitu (interdum ad horas protracto⁵⁰⁾

40) In *Journ. de méd. françoise et étrangere*. T. LXXIII. 1820. Novembre. p. 125.

**) Diss. de morbo coeruleo. Berol. 1822.

***) Diss. sistens relationem de puero morbo coeruleo laborante c. nonnull. adnot. Kil. 1822.

41) *Medico-chirurg. Transact.* Vol. XI. 1821. p. 29.

42) *Journal de méd.* T. LXIX. p. 354.

43) *Index musei anatomici Kiliensis*. Kiliae 1818. p. 61.

44) *Bulletin de la faculté de méd.* T. VI. p. 355. 363.

45) *Op. c.* p. 1 — 42.

46) *Op. c.* 1. Th. p. 371. 2. Th. 2. Abth. p. 784. 3. Th. p. 104. 319.

47) *Op. c.*

48) REIL's *Archiv f. Physiologie*. 9. B. *Handbuch d. patholog. Anatomie*. 1. B. *Eilft. Abschnitt*. — *Deutsches Archiv f. Physiologie*. 1. B. 2. H. N. 5. 7. B. 2. H. N. 8.

49) COOPER apud FARRE. — MARX l. c. (*Manus albissimae*).

tracto ⁵⁰⁾ et flebili ⁵¹⁾), sub tussi et sub erecta corporis positione augetur ⁵²⁾ fermeque nigrescit ⁵³⁾. Dyspnoea, quandoque tussis ⁵⁴⁾, nunc continuo nunc per intervalla affligit. Paroxysmi tunc convulsionibus stipari solent. Iis cessantibus aegrotulus veluti exanimis jacet. Cor interea vehementer pulsatur ⁵⁵⁾. Pulsus autem frequens et regularis est ⁵⁶⁾. Functiones reliquae rite absolvuntur. *Morbus coeruleus acquisitus* sese manifestat livore transitorio digitorum, unguium, faciei, praecipue labiorum. Accedit ocyus serius quaedam dyspnoea. Livor tunc ad universam cutim (praeputio et glande non exceptis) extenditur, ac permanens fit. Cutis nonnunquam in plurimis locis glabra est ⁵⁷⁾. Jam vero respiratio per paroxysmos difficilis, celer, profunda et singultuosa ⁵⁸⁾ et suspiriis interrupta atque gemebunda evadit. Cor vehementer et inordinate vibrat; pulsus arteriarum ejusdem sequitur rhythmum. Venae jugulares interdum turgent ⁵⁹⁾.

Qua-

50) RING apud FARRE l. c. HOWSHIP l. c.

51) KWIATKOWSKI l. c.

52) HAASE l. c. MARECHAU l. c.

53) FARRE et WESTON.

54) FARRE l. c.

55) HUNTER, KREYSIG l. c.

56) KREYSIG l. c.

57) FARRE l. c.

58) ENGLISH apud FARRE.

59) FARRE l. c.

Qualiscunque vero morbi fuerit origo, aegri extra paroxysmum per vices sat libere respirant ⁶⁰). Conqueruntur autem continuo de sensu frigoris ab attactu sed vix a thermometro ⁶¹), confirmato. Etiam si dentitio ⁶²) et pubertas *) tarde ingruant, corpus tamen crescit formamque sat agilem induit ⁶³). Brachia praelonga, ultima phalanx digitorum tumidula ⁶⁴), mollis ⁶⁵), aspera et verrucis

60) NEVIN, NASSE l. c.

61) NASSE ope thermometri corporis temperiem internam normalem detexit. Superficies gradus 24. thermometri REAUMURIANI habuit (*Archiv* l. c. p. 285.) FARRE thermometro FARENHEITII ori immisso temperiem auctam, — illo vero manibus tradito, immixtam invenit. Debetur illi sequens tabula:

Temperatura.

D i e s	aëris exter- ni	cubi- culi	ma- nuum	pe- dum	Sub lin- gua	Pul- sus	Respi- ratio
23. Augusti	—	70.	98.	97.	99.	108.	28.
13. Septembris	52.	59.	74.	—	99.	96.	32.
17. Septembris	61.	69.	96.	—	99.	100.	28.
30. Septembris	58.	61.	92.	—	99.	100.	31.

62) CAILLIOT l. c.

*) Menstruabat aegra TACCONI a. 14. — Illa BIELKIEWICZ a. 15.; illa SPRY an. 17. catameniis adhuc or-
bata erat.

63) HUNTER corpus aegri morbo coeruleo laborantis cum illo vertagi comparat l. c. FARRE exemplum corporis haud proceri narrat l. c.

64) MARX l. c.

65) PALOIS apud MECKEL in *Deutsches Archiv* l. c. p. 257.

rucis obsessa ⁶⁶⁾ et ungues convexi cernuntur ⁶⁷⁾. Facies saepe tumidula, oculi prominentes ⁶⁸⁾, subflavi ⁶⁹⁾; gingivae spongiosae, halitus foetens, frequentes oscitationes, et lingua inaequalis, praemagna ⁷⁰⁾. Sunt etiam qui vomant ^{**)}. Aeger demum iners est, lusus aetatis suae respuit ⁷¹⁾, risu haud gaudet ⁷²⁾ ac cito defatigatur. Cutis variis in locis admodum sensibilis reperitur ⁷³⁾. Facultates animi haud torpent ⁷⁴⁾. Somnus pavorebus interruptus ⁷⁵⁾ vigetque in genere ciborum desiderium. Aggravantur vero symptomata a pastu, ab animi pathematibus, a temperie frigida et a fortuita affectione catarrhali. Motus, dyspnoeae paroxysmum, aliquando coecitatem transitoriam, lipothymias, profluvium salivae excitat ⁷⁶⁾. Magna perro ad haemorrhagias narium, gingivarum, pulmonum et animadvertitur proclivi-

66) FARRE l. c.

67) SACHSE, KREYSIG l. c.

68) FARRE l. c.

69) ENGLISH apud FARRE l. c.

70) TRAVERS apud FARRE l. c.

***) FARRE l. c. BIELKIEWICZ l. c.

71) BIELKIEWICZ l. c.

72) FARRE l. c.

73) FARRE l. c. ita ut minima compressio nasi, menti digitorumque dolores fortes excitaret.

74) SANDIFORT l. c. aegra BIELKIEWICZ iracunda erat.

Aegra TRAVERS et FARRE imbecillis fuit.

75) TRAVERS apud FARRE l. c.

76) SANDIFORT l. c.

clivitas *). Aegri aetatis provectoris de cephalaea, vertigine ⁷⁷⁾, obfuscatione visus, anxietate, dolore pectoris, nausea ⁷⁸⁾ et debilitate conquerruntur. Alvus ut plurimum languet **); urina interdum turbida et foetens ⁷⁹⁾. Paroxysmi semel bisve de die, horis modo matutinis ⁸⁰⁾ modo vespertinis et nocturnis ⁸¹⁾ recurrunt; saepeque ad quartam vel dimidiam horae partem protrahuntur ⁸²⁾. Illis appropinquantibus aeger libenter super abdomen decumbit, pectusque manibus comprimit. Nisi miser in paroxysmo suffocatus pereat, per hydropem ⁸³⁾, hemiplegiam ⁸⁴⁾, pneumonorrhagiam ⁸⁵⁾, aut accidentalem morbum, e. c. ex ingluvie ⁸⁶⁾ necatur.

Autopsia
cadaverum.

2. En phaenomena, quae hucusque e sectione *singulorum* cadaverum emergebant. Septum ventriculorum cordis perforatum, arteria pul-

*) KREYSIG l. c.

77) FARRE l. c.

78) COOPER apud FARRE l. c.

**) SANDIFORT, LENTIN, NASSE. Contrarium testatur COOPER apud FARRE l. c.

79) FARRE l. c.

80) NEVIN l. c.

81) HAASE, ENGLISH.

82) KREYSIG l. c.

83) MARECHAU l. c.

84) COOPER et FARRE l. c.

85) TRAVERS et FARRE l. c.

86) Sic juvenis 22. annorum post lautum prandium de repente obiit apud FARRE.

pulmonalis angusta, aorta ex utroque ventriculo, ductus arteriosus nullus ⁸⁷⁾; — communicatio ampla inter cor dextrum et sinistrum, unum dumtaxat atrium et ventriculus cordis sinister minor dextro ⁸⁸⁾, cor rotundum, septum ventriculorum superne perforatum, aorta ex utroque ventriculo, arteria pulmonalis diametri normalis ast cum duabus tantum valvulis ⁸⁹⁾; — foramen in septo ventriculorum ⁹⁰⁾; — foramen in septo, aorta ex ventriculo cordis utroque pullulans, valvulae imperfectae, arteria pulmonalis parva, trunco uno ex aorta haud procul illius basi, emergente ⁹¹⁾; — septum ventriculorum perforatum ⁹²⁾; — apertura ampla in medio septi ventriculorum, foramen ovale plus solito clausum, arteria pulmonalis amplior ⁹³⁾; — foramen ovale et ductus arteriosus hiantes, arteria pulmonalis oblitterata ⁹⁴⁾; — duo atria, ventriculus singulus, arteria pulmonalis minima ⁹⁵⁾; — unum atrium, unus ventriculus, duae arteriae pulmonales ex aorta, venae pulmonales a venis cavis separatae ⁹⁶⁾;

87) STENSON l. c.

88) MERY, OLIVRY ll. cc.

89) SANDIFORT l. c.

90) HUNTER l. c. BAILLIE *Morbid Anatomy*. p. 29.

91) MECKEL in REIL's *Archiv* l. c.

92) Idem, ib.

93) Id. ibid.

94) LANGSTOFF apud FARRE p. 9.

95) CHEMINEAU *Mém. de Paris* 1699. *Hist.*

tæ⁹⁶); — arteria pulmonalis ex ventriculo dextro orta, sed cum sinistro communicans et aortam descendantem efformans; aorta ascendens sub arcu clausa, ventriculus dexter nimis crassus et amplus⁹⁷); — unus ventriculus, unum atrium, arteria pulmonalis ex aorta, venae pulmonales in venam cavam descendentes, nulla vasa bronchialia?⁹⁸); — aorta et arteria pulmonalis (ad originem filamentis cartilagineis circumdata) ex ventriculo dextro venientes, septum ventriculorum partim deficiens⁹⁹); — valvula foraminis ovalis imperfecta, septum ventriculorum tribus in locis perforatum; arteria pulmonalis oblitterata¹⁰⁰); — singulus ventriculus, singulum atrium, arteria pulmonalis ramum aortae constituens, aorta et venae dimidium justo minores, venae pulmonales a vena cava sejunctae¹); — ventriculus dexter parvus, ostium dextrum et foramen ovale praemagna, arteria pulmonalis angusta, orificio occluso²); — fere nulla valvula foraminis ovalis, ductus arteriosus nimis amplus³);

96) FARRE l. c. p. 2.

97) COOPER apud FARRE p. 10.

98) WILSON *Philos. Transact. Vol. 88. REIL's Archiv. 4. B.*

99) GREGORY l. c.

100) HODGSON apud FARRE p. 19.

1) STANDERT l. c.

2) HUNTER l. c.

plus 3); — septum ventriculorum perforatum, aorta ex utroque ventriculo, arteria pulmonalis oblitterata, cor dextrum amplior sinistro 4); — origo aortae et arteriae pulmonalis permutata 5) et ductus arteriosus angustissimus 6); — singulus ventriculus, foramen ovale fere sine valvula, arteria pulmonalis parum angusta 7); — origo aortae et arteriae pulmonalis permutata, arteria pulmonalis aortam descendantem constituens 8); — foramen ovale amplum, septum ventriculorum crassum, ventriculus dexter angustus, aorta valde ampla, arteria pulmonalis angusta 9); — ventriculus unus aortam largiens dextrorsum situs, arteria pulmonalis oblitterata, duo atria 10); — origo aortae et arteriae pulmonalis permutata, haecque angustissima 11); — aorta ex utroque ventriculo, arteria pulmonalis imperforata, angusta, tenuis 12); — foramen ovale et ductus arteriosus hiantes, arteria pulmonalis angusta, aper-

3) ENGLISH apud FARRE p. 12.

4) FARRE l. c. p. 27.

5) WISTAR *a system of anatomy for the use of students of medicine. Philad.* 1811.

6) BAILLIE l. c. p. 6.

7) LAWRENCE apud FARRE l. c. p. 31.

8) LANGSTOFF apud FARRE p. 28.

9) SCHULER l. c. p. 12—14.

10) FLEISCHMANN l. c. p. 193.

11) FARRE l. c. p. 29.

12) HOWSHIP l. c. 233. HESSELBACH.

apertura ampla in septo ¹³⁾; — cor amplum, quadratum, foramen ovale magnum, arteria pulmonalis major quam aorta; illa ex utroque ventriculo nata ¹⁴⁾; — auricula dextra praeter consueta vasa venam crassitiei calami scriptorii quae a thymo proficiscebatur accipiens, cor magnum ¹⁵⁾, — cor magnum, aorta ex utrisque ventriculis, arteria pulmonalis oblitterata, foramen ovale apertum ¹⁶⁾; — foramen ovale et ductus arteriosus hiantes ¹⁷⁾; — septum perforatum, defectus septi atriorum, aorta ex utroque ventriculo, arteria pulmonalis angusta, vena cava ascendens in atrium sinistrum depleta; — septum ventriculorum perforatum, aorta ex ventriculo sinistro, arteria pulmonalis angusta ¹⁹⁾; — cor obliquum, atrium dextrum amplum, ventriculus dexter crassus, aorta ex utroque ventriculo, arteria pulmonalis angustissima, rami ex arcu aortae inversi, aorta descendens dextrorsum ²⁰⁾; — cor ex transverso, atrium dextrum amplum, sinistrum valde angustum, septum ventriculorum superne perforatum, aorta ex utroque ventriculo et ampla, arteria pulmonalis angusta, ductus

13) LANGSTOFF apud FARRE l. c. p. 10.

14) COOPER apud FARRE l. c. p. 15.

15) NEVIN l. c.

16) JURINE l. c.

17) RING apud FARRE l. c. p. 26.

19) ABERNETHY l. c.

20) CAILLIOT l. c.

ductus arteriosus parum apertus, rami ex arcu aortae inversi ²¹⁾; septum ventriculorum ad basin perforatum, aorta ex utroque ventriculo et ampla, arteria pulmonalis angusta, duae tantum valvulae, illae venosae cordis crassae, cor magnum, ventriculus uterque similis, atrium dextrum amplum, sinistrum angustum, hepar magnum ²²⁾; — ductus arteriosus extra arteriam pulmonalem ex ventriculo dextro in aortam apertus ²³⁾; — septum ventriculorum perforatum ²⁴⁾; — septum ventriculorum perforatum, arteria pulmonalis angusta ²⁵⁾; — septum ventriculorum perforatum, aorta ex utroque ventriculo, arteria pulmonalis angusta, ductus arteriosus clausus, abscessus cerebri ²⁶⁾; — aorta ampla potius ex ventriculo dextro quam ex sinistro, arteria pulmonalis angustissima, valvulae concretae, foramen ovale valde hians, vesicula fellea magna, bile nigra repleta, pulmones graves, hydrocephalus ²⁷⁾; — aorta ampla ex utraque camera, arteria pulmonalis angustissima, tenues duae valvulae, cor maximum, rami arcus aortae inversi, thymus

21) OBET l. c.

22) HODGSON apud FARRE l. c. p. 35.

23) WRISBERG in HALLER's *Physiologie*. p. 77.

24) PROCHASKA *Bulletin de la Soc. de méd.* 1807.

25) MAYER apud MECKEL *Deut. Archiv. Tabelle*.

26) COOPER apud FARRE l. c. p. 24.

27) HALLER l. c.

thymus maximus ²⁸⁾; — perforatio septi ventriculorum ²⁹⁾; — foramen ovale apertum ³⁰⁾; — aorta ampla ex utroque ventriculo, dextraque parietibus crassis insignita, cor praemagnum ³¹⁾; — aorta ex ventriculo dextro, eo loco quo arteria pulmonalis, desiderata, oriri debuisset, nata, aorta ramos pulmonales suppeditans; ex ventriculo sinistro emergens, tracheam adit, hicque in carotidem dextram et sinistram et in arteriam subclaviam dextram dividitur; arteria subclavia sinistra ex aorta descendente evoluta ³²⁾; — aorta ex utroque ventriculo, arteria pulmonalis angustissima ³³⁾; — foramen ovale ventriculusque dexter ampli; sinister angustissimus ³⁴⁾; — cor magnum, ventriculi ejusdem crassitici, sinister angustior, arteria pulmonalis angusta, aorta ampla, ex utroque ventriculo, pulmo suppuratus ³⁵⁾; — aorta ex utroque ventriculo, arteria pulmonalis normalis, ex tertia quadam cavitate ³⁶⁾; — atrium dextrum amplum, in ventriculo dextro
duo

28) CAILLIOT l. c.

29) TIEDEMANN *Zoologie*. 1. B. p. 177.

30) JURINE l. c.

31) SANDIFORT l. c.

32) SEIDEL l. c.

33) HUNTER l. c. HUET apud OBET l. c. PULTENEY l. c.

34) MECKEL *Handb. d. pr. Anatomie*. 1. B.

35) FARRE l. c. p. 34.

36) LAWRENCE apud l. c. p. 26.

duo hydatides, cavum pectoris dextrum sero repletum, hydrocephalus ³⁷⁾; — cor praemagnum, vasa pulmonalia ampla et tenuia, pulmo tuberculosus concretus ³⁸⁾; — foramen ovale amplissimum, ventriculus sinister amplior, dexter crassior, arteria pulmonalis angustissima, cor subrotundum, hepar praemagnum ³⁹⁾; — foramen ovale amplum, arteria pulmonalis obliterated, ventriculus dexter longe crassior sinistro, cor parvum ⁴⁰⁾; — foramen ovale amplum, ductus arteriosus apertus, cor et hepar maxima ⁴¹⁾; — cor normale, majus, pulmo duriusculus, undique concretus ⁴²⁾, — foramen ovale apertum, valvula Eustachii praemagna, nullum quidem septum ventriculorum, attamen prolongatio coeca ventriculi sinisterum illum indicans, orificia bina venosa angusta ad ventriculum dextrum ducentia, e quo aorta, arteria pulmonalis angustissima ⁴³⁾; — singulus cordis ventriculus dilatatissimus ⁴⁴⁾; — foramen ovale amplissimum, arteria pulmonalis angustissima, parietes ventriculorum crassissimi-

37) TROTTER l. c.

38) LENTIN l. c.

39) TACCONI l. c.

40) MORGAGNI l. c.

41) SPRY l. c.

42) MARCET l. c.

43) FARRE l. c. p. 37.

44) POZZIS apud SENAC l. c.

Frank Prax. II. 2. 2.

sissimi, ductus arteriosus apertus ⁴⁵⁾; — foramen ovale apertum, cor praemagnum ⁴⁶⁾; — septum ventriculorum perforatum, aorta ex utroque ventriculo, arteria pulmonalis amplissima ⁴⁷⁾; — septum ventriculorum perforatum, cor dextrum et arteria pulmonalis ampla, ductus arteriosus apertus ⁴⁸⁾; — foramen ovale et ductus arteriosus valde aperti ⁴⁹⁾; — foramen ovale diametri pollicis, atria, ventriculus dexter et arteria pulmonalis amplissima, ventriculus sinister et aorta angusta ⁵⁰⁾; — foramen ovale diametri dimidii pollicis ⁵¹⁾; — septum perforatum, arteria pulmonalis oblitterata, foramen ovale nimis magnum, ductus arteriosus apertus ⁵²⁾; — ductus Botalli apertus, septum atriorum cordis vix ullum, septum ventriculorum plane nullum et illius loco membrana pendula ⁵³⁾, annuli tracheae inter se et cum cartilagine cricoidea ita concreti, ut tubum cartilagineum constituerent, glottide per plicam semilunarem dimidio clausa ⁵⁴⁾; — livor
cada-

45) SEILER l. c.

46) FARRE l. c. p. 10.

47) FARRE l. c. p. 26.

48) RICHERAND *Nouv. élém. de Physiologie. Vol. I.*

49) ALLAN BURNS l. c.

50) CORVISART l. c.

51) GREEN *Philosoph. Transact. N. 454.*

52) FARRE l. c. p. 20.

53) MARX l. c.

54) FLEISCHMANN l. c. de chondrogenesi etc.

cadaveris, vasa cerebri turgida, pulmones cruore obruti, caeterum sani, cor majus, parietes crassiores, ductus arteriosus apertus, tres lineas longus, quinque autem largus, aorta in exordio suo inque arcu dilatata, foramen ovale clausum ⁵⁵⁾; — pulmo dexter in duos modo lobos divisus, quorum superior normalis, inferior compactus, hepatis similis, ita et pulmo sinister inferior, superiore normali, praeter superficiale pulmonum ruborem nullum inflammationis vestigium (nec gutta enim sive seri sive lymphae coagulabilis in cavitatibus pleurae, nec ullibi pseudomembranae inveniebantur), cor cum pericardio normalia, foramen ovale et ductus arteriosus clausi, valvulae itidemque vasa quo decet pacto disposita, sanguis ater ⁵⁶⁾; — serum in cerebri ventriculo laterali dextro, triplo ambitu majori, vasa venosa meninges perreptantia sanguine quaquaversus praecipueque circa cerebellum turgida, pulmones, cor et vasa majora normalia ⁵⁷⁾.

§. XIX.

C a u s s a e.

1. Inter causas ad morbum coeruleum prae-
disponentes hucusque innotuerunt: vitium haere-
C. Praedis-
ponentes.

G 2

dita-

55) BIELKIEWICZ l. c.

56) KWIATKOWSKI l. c. (Observatio clinici instituti Vilmensis).

57) RYMKIEWICZ. l. c.

ditarium ⁵⁸), sexus masculinus ⁵⁹), forteque terror matris ⁶⁰).

C. Excitantes.

2. Nisi morbus congenitus sit, excitatur sub partu ⁶¹), primis *diebus* ⁶²) a nativitate, *hebdomade* secunda *), *mense* primo, secundo ⁶³), sexto ⁶⁴), decimo sexto ⁶⁵), *anno* primo versus finem vergente ⁶⁶), secundo ⁶⁷), tertio ⁶⁸), quarto ⁶⁹), quinto ⁷⁰), vigesimo primo ⁷¹), vigesimo ter-

58) COOPER apud FARRE (saltem vitia cordis in familia infantis coerulei haereditaria erant).

59) NASSE apud BURNS l. c. p. 190. MECKEL *Deutsch. Archiv.* l. c. p. 267. (Inter 75. casus numerabantur 17. foeminae 40. mares, 18. sexus ignoti).

60) KWIATKOWSKI l. c. (ab incendio ultimis graviditatis diebus). HESSELBACH l. c. (sexto graviditatis mense a morbo gravissimo mariti).

61) COOPER, HODGSON, ENGLISH, LANGSTOFF apud FARRE l. c. p. 10. 12. 19. 28. 29. HUNTER, THIEBAUT, CHAMSERU, HAASE, MORGAGNI.

62) Ad finem diei secundi (FARRE l. c. p. 2.) post nonnullos dies (PALOIS l. c.).

*) HOWSHIP l. c. COOPER apud FARRE l. c. p. 15. HESSELBACH l. c.

63) SCHULER, NEVIN, CAILLIOT, OBET l. c. THOMAS l. c.

64) HESSELBACH l. c.

65) CAILLIOT l. c.

66) SANDIFORT l. c.

67) COOPER apud FARRE l. c. p. 24.

68) BURNS l. c. POLIMERE l. c.

69) GINTRAC l. c.

70) TACCONI, BIELKIEWICZ l. cc.

tertio ⁷²⁾, quinquagesimo septimo ⁷³⁾, — sub opere dentitionis ⁷⁴⁾, sub usu lactis matris aegrotantis ⁷⁵⁾, post coqueluche ⁷⁶⁾, variolas ⁷⁷⁾, epidemiam catarrhi ⁷⁸⁾, refrigerationem corporis ⁷⁹⁾, suppressionem menstruorum ⁸⁰⁾, ictus ad pectus ⁸¹⁾, lapsum ex alto ⁸²⁾, cursum velocem et animi pathemata ⁸³⁾, resectionemque plicae ⁸⁴⁾.

3. *Causa proxima* morbi coerulei juxta C. proximationes physico-physiologicas (quae potissimum ^{ma.}

CRAW-

71) MARCET l. c.

72) RYMKIEWICZ l. c.

73) CORVISART l. c.

74) KREYSIG l. c.

75) THOMAS l. c.

76) CAILLIOT, KREYSIG ll. cc.

77) BIELKIEWICZ l. c.

78) OBET l. c.

79) MARCET l. c.

80) GINTRAC l. l.

81) CORVISART l. c.

82) TACCONI l. c.

83) KREYSIG l. c.

84) RYMKIEWICZ l. c. Femina 26. annorum ablata plicae, quod erat ante triennium, experiebatur per vices redeuntia vaniloquia et dolorem capitis maximum; quibus demum, exacto anno, accesserunt frigus universi corporis, livor faciei et extremitatum inferiorum una cum dyspnoea et motu cordis inordinato vehementique. Tandem die 20. Novembris 1822. obiit. Quid cadaver exhibuit jam dictum est §. XVIII. N. 2. (57).

CRAWFORD⁸⁵⁾, DAVY⁸⁶⁾, ALLEN et PEPYS⁸⁷⁾, BRODIE⁸⁸⁾, DALTON⁸⁹⁾, et DUPUYTREN⁹⁰⁾ debentur), quaeritur: 1° in mixtione sanguinis arteriosi cum venoso, et 2° in impedita transformatione sanguinis venosi in arteriosum, seu, quod idem significat, in impedita spoliatione sanguinis a principio carbonico impeditaque absorptione principii oxygenii. *Mixtioni sanguinis arteriosi cum venoso* ansam praebent: a) communicatio abnormis atriorum, quatenus septum omnino desideratur, aut plus minusve imperfectum est; — b) apertura venae cavae inferioris aut venarum coronariarum cordis in atrium sinistrum; — c) formatio imperfecta septi ventriculorum, — d) ductus arteriosus apertus relictus; — et e) origo arteriae pulmonalis ex aorta. *Transformationi sanguinis venosi in arteriosum* obstant: a) obliteratio arteriae pulmonalis; — b) ori-

85) *Versuche und Beobachtungen über die thier. Wärme. A. d. E. Leipz. 1785.*

86) v. GILBERT's *Annalen der Physik.* 19. B. p. 298.

87) v. *Biblioth. Britannique. Vol. 42. N. 3. 4. et Journal für Chemie u. Physik v. SCHWEIGGER. 1. B. 2. H.*

88) *Philosoph. Transact. Y. 1812. P. II. v. GILBERT's Annalen der Physik, neue Folge. Jahrg. 1811. 1. St. p. 80.*

89) *On respiration and animal heat in memoirs of the literary and Philosophical Society of Manchester. Vol. II. 1813. p. 15 — 44.*

90) *Nouveau Bulletin des sciences. T. I. N. 2. p. 26.*

b) origo arteriae pulmonalis et aortae permutata, venis in statu normali perstantibus; c) pulmonum actio impedita; d) et cerebri affectio. Posse vitia utriusque generis inter se complicari, ex autopsia cadaverum patet. Angustatio vel obliteratio arteriae pulmonalis saepissime aliis vitiis jungitur, forteque plurimorum illorum (e. c. apertionis foraminis ovalis, communicationum inter ventriculos cordis) causam sistit⁹¹⁾.

§. XX.

D i a g n o s i s.

1. Morbum coeruleum in *cardiacum*, *pul-* Divisio.
monalem et *encephalicum* dividimus.

2. *Morbus coeruleus cardiacus* omnium com-^{M. c. car-}
munissimus est. Frequentissime conformatio im-^{diacus.}
perfecta septi ventriculorum, ut illius caussa ob-
venit⁹²⁾. Septum quidem atriorum saepius quam
illud ventriculorum a norma deflectit, at vero
ex hoc vitio non semper morbus coeruleus ori-
tur⁹³⁾. Posse ipsum foramen valde hiare, quin
sanitas

91) MECKEL *Deutsches Archiv* l. c. p. 274.

92) MECKEL l. c. p. 275. (In 64. casibus morbi coerulei status morbosus ventriculorum cordis 42. vicibus detectus est).

93) GREEN in cadavere feminae 80. annorum foramen ovale adapertum invenit; femina quidem haec semper valetudinaria fuit, sed nunquam symptomata morbi coerulei exhibuit. (*Philosoph. Transact. N. 454. IV.*).

sanitas detrimentum capiat, contenditur⁹⁴). Sunt vero qui constantem ex hoc vitio repetant dyspnoeam⁹⁵); quod saltem sub vehementiori motu expectandum est. Plurima sane vitia conformationis cordis vasorum majorum eousque innocua esse, donec externae superveniant causae, novas in partibus jam pridem male constructis aegritudines excitantes, tot exempla morbi coerulei in aetate provectione evoluti docent. Forte jam commutatio lactis nutricis cum cibis solidioribus, forte major infantis adultioris oxygenii hauriendi necessitas, forteque transitus illius a gestatione ad gressus, pro serotina evolutione morbi coerulei explicanda sufficerent. Utut sit, mechanica partium affectarum actio, potissimum autem aequilibrium debitum inter ventriculos cordis ablatum (quatenus unus plus altero sanguine obruitur), magnam in morbo, de quo agitur, ludere videntur scenam⁹⁶).

M. c. pulmonalis.

3. *Morbus coeruleus pulmonalis* ex impedita instrumenti pneumatici actione oritur. Vitia enim

94) „Unter übrigen normalen Bedingungen kann selbst ein sehr weites eirundes Loch ohne Nachtheil für die Gesundheit ertragen werden, indem selbst die Blutsäulen des rechten und des linken Vorhofes einander das Gleichgewicht halten, daß wenigstens keine bedeutende Vermischung erfolgt.“ MECKEL l. c. p. 276. Idem fatetur FARRE l. c.

95) ALLAN BURNS l. c.

96) KREYSIG l. c.

enim *tracheae* et *pulmonum* a morbo coeruleo non esse semper aliena exempla supra allata ⁹⁷⁾ demonstrant. Nec id mirum si concedatur, pulmones officio oxygenationis sanguinis praeesse et morbi coerulei causam proximam, in impedita transformatione sanguinis venosi in arteriosum, consistere; ad quam hypothesein rectificandam optandum adhuc foret ut aëris ab aegro coeruleo expirati conditio chemica examinetur. Morbum deinde coeruleum pulmonalem quandam, cum *induratione textus cellulosi*, analogiam alere verisimile est ⁹⁸⁾.

4. Morbum coeruleum nonnunquam cum M. c. encephalicus. hydro-

97) FLEISCHMANNI, LENTINII, TROTTERI et maxime nostri a KWIATKOWSKI v. supra §. XVIII. N. 2. (56) commemorati. Sic enim habet de suo casu KWIATKOWSKI (l. c.): „haud temere arguere nobismet videmur, hîc solos pulmonis lobos superiores aëri atmosphaerico fuisse pervios, inferiores vero in ea conditione qua in foetu, aut in infante mortuo nato inveniuntur, perstitisse; primis itaque vitae mensibus, lobos superiores ad sanguinem venosum in arteriosum commutandum suffecisse, tardius autem crescente infante dimidiam hancce pulmonum partem officio isto, pro ampliori corporis mole praestando, imparem evasisse, ita ut deficiente aliquomodo oxygenationis processu, morbo coeruleo ansa porrecta fuerit.“

98) Nonnullos aegrotulos Parisiis ex *endurcissement du tissu cellulaire* mortuos, foramen ovale apertum exhibuisse, mihi retulit ex itineribus rediens auditor quondam meus mihiq. carus *Abicht*.

hydrocephalo societatem inire, jam dudum innouit *). Novum forte est, illum ex hoc morbo *oriri* ⁹⁹⁾; quod imperio cerebri ope nervorum vagorum in pulmones ¹⁰⁰⁾, tribuendum. Porro, cum cutis nervos ex medulla spinali accipiat, cumque haec medulla motus cordis gubernet ¹⁾ et

*) §. XVIII. N. 2. (27). Cfr. MECKEL l. c. p. 258.

99) RYMKIEWICZ l. c. Plus vice simplici morbum coeruleum in plicosis ipse observavi, illumque ex vitiis solidis cordis et vasum majorum repetii. Hanc sententiam adgressus est Dr. HRECZYNA, quondam discipulus meus, asserens, se livorem cutis modo rubellum, modo nigrescentem plane illi plicosorum similem, in *lepra*, quae in KAMCZATKA (ubi praxin nunc exercet) grassatur, observare. (*Pamiętników towarzystwa lekarskiego Wileńskiego. T. I. Wilno. 1818. p. 281*).

100) DUPUYTREN (l. c.) demonstravit quod compresso pape nervorum vago, pulmonum non solum paralysis oritur, sed quod etiam sanguis in pulmonibus circulum absolvens illico colorem atrum contrahit. Comparando hoc experimentum cum phaenomenis in morbis plurimis pulmonum observatis (P. II. Vol. II. Sect. I. Cap. XII. §. LIX. N. 2. Cap. XIV. §. LXIV. N. 7.), vix BRODIE assentire poterimus contendenti (l. c.), oxygenationem sanguinis etiamsi cerebri nexus cum pulmonibus destructus sit, per mechanicam respirationem continuare, solumque sic deleri calorem animale.

1) P. II. Vol. I. Sect. II. Cap. II. §. VII. N. 2. (38). LE GALLOIS *expérience sur le principe de la vie, notamment sur celui des mouvemens du coeur. Paris 1812.*

et columnae vertebralis in morbo coeruleo ratio habenda foret.

5. Caveamus vero ne ob solum livorem cutis *Monitum*. (saepe et in scorbuto, hydrothorace, asphyxia et articulo mortis obveniente) praesentiam morbi coerulei proclamemus. Requiritur enim absolute ad istum morbum efficiendum, ut cutis simul frigeat, ut dyspnoea, cordisque motus abnormes adsint.

§. XXI.

P r o g n o s i s. C u r a.

1. Morbi coerulei sanati paucissima habent *Prognosis*.
 tur exempla ²⁾: Nihilominus dummodo aegrotu-
 lus proximos a nativitate menses, utpote maxi-
 me periculosos, superet, vitam ad pubertatem
 usque protrahere solet ³⁾. Pauci qui hanc epo-
 cham superarunt ad annos octodecim ⁴⁾, vigin-
 ti ⁵⁾,

2) THOMAS in *medical transaction of the medical Society of London. Vol. 6. Lond. 1813. v. HUFELAND's Journal d. pr. Heilk. 1815. Mai. p. 52. ODIER l. c.*

3) Teste NASSE inter viginti octo aegros nullus inter tertium et undecimum annum obiit. Ab hoc vero anno usque ad annum decimum quintum, periit *undecim* (omnes sexus masculini) et ab anno decimo quinto ad decimum octavum periit *tres* (omnes sexus feminei). Septem autem numerantur aliorum observationes, quibus colligitur et puellas ante unum et decimum annum mori. (MECKEL *Deutsch. Archiv. l. c. p. 270.*) Cfr. ODIER et THOMAS l. c.

4) GREGORY l. c.

ti ⁶⁾, viginti unum ⁷⁾, viginti duo ⁸⁾, viginti quatuor ⁹⁾, viginti septem ¹⁰⁾, triginta unum ¹¹⁾, quadraginta ¹²⁾, quadraginta unum ¹³⁾, quadraginta duo ¹⁴⁾, sexaginta ¹⁵⁾, octuaginta ¹⁶⁾, pervenerunt. Majus minusve periculum mortis a natura caussae morbum coeruleum gignentis et a morbis accessoriis ¹⁷⁾ pendere videtur. Ex obliteratione universali arteriae pulmonalis infans jam die vitae decima tertia obiit ¹⁸⁾. Infans cui una tantum auricula erat unusque ventriculus die vitae decima periit ¹⁹⁾. Pusio in quo aorta ex ventriculo dextro et arteria pulmonalis ex sinistro oriebantur, transitu ex auricula in ventriculum simul impedito, dies dumtaxat quinque vixit ²⁰⁾. Sine hoc impedimento aegrotulus, cui etiam

6) SACHSE l. c.

7) MARCET l. c.

8) FARRE l. c. p. 37. WENDT *Die Kinderkrankheiten systematisch dargestellt. Breslau u. Leipzig 1822.*

9) MEYER apud MECKEL l. c.

10) POZZIS apud SENAC l. c.

11) SEILER l. c.

12) FARRE l. c. p. 10. 26.

13) RICHERAND *Nouv. élém. de Physiolog. T. I.*

14) BURNS l. c.

15) CORVISART l. c.

16) GREEN l. c.

17) GREGORY (Phthisis pulmonalis).

18) HUNTER l. c.

19) STANDERT l. c.

20) KREYSIG l. c.

etiam origines aortae et arteriae pulmonalis permutatae erant, vitam ad duos menses protraxit ²²⁾. Vixerunt aegrotulus cum corde extra thoracem sito cumque auricula et ventriculo singulis — dies septem ²³⁾; alter cum corde quidem sano, sed mala conformatione arteriarum — menses duos ²⁴⁾; alii cum aorta, duplici radice, ex utroque ventriculo pullulante — dies undecim ²⁵⁾, duodecim ²⁶⁾, tredecim ²⁷⁾, et dum arteria pulmonalis simul amplior fuerat, — annos quadraginta ²⁸⁾; alii cum foramine ovali aperto — annos sexdecim ²⁹⁾, viginti unum ³⁰⁾ et longe ultra ³¹⁾; alii cum foramine ovali et ductu arterioso simul apertis — annos septem et decem ³²⁾, viginti novem ³³⁾, et quadraginta duo ³⁴⁾. Mares citius quam feminae pereunt ³⁵⁾. Hyems prae aestate funera exhibet ³⁶⁾.

2. Fru-

22) BAILLIE l. c. GREGORY l. c.

23) WILSON l. c.

24) BAILLIE l. c.

25) TIEDEMANN l. c.

26) HAASE l. c.

27) HUNTER, SANDIFORT.

28) FARRE l. c.

29) MOROAGNI ex VALSALVA.

30) KREYSIG l. c.

31) §. XX. N. 2. (94).

32) SPRY l. c.

33) SEILER l. c.

34) BURNS l. c.

35) MECKEL l. c. p. 265.

Cura.

2. Fructus, quem ex doctrina hucusque tradita respectu ad *therapiam* accepimus, in eo potissimum consistit, quod misellos farragine medicamentorum non esse excrucandos intelleximus. Inprimis ab illis periculum novos, eosque acutos cordis morbos contrahendi evitandum est ³⁷⁾. Conducunt temperatura modica ³⁸⁾, diæta lactea ³⁹⁾ vegetabilis, facilis digestionis, quies corporis et animi, *balnea tepida* ⁴¹⁾, lotiones calidae extremitatum, involutio membrorum in lintea, lenes frictiones et repetiti *clysteres emollientes*. *Sub insultu*, aegrotulo debita corporis positio concilianda; alii super abdomen ⁴²⁾,

36) MECKEL l. c. p. 271. (ratione 6. ad l.).

37) Vide infra. Cap. VII. §. XXIV. N. 1. (31).

38) SEILER et PALOIS rite animadvertunt, aegros coeruleos frigus aequè ac aestum reformidare.

39) ODIER in *Biblioth. Britannique des sciences et arts*. Vol. VI. p. 158. et N. 359—360. Decembr. 1810. p. 371. „Une fille de cinq à six mois, après avoir été sévrée, commença à avoir des accès d'oppression, pendant lesquels son pouls devenait irrégulier et très fréquent, ses lèvres, ses pieds et ses mains prenaient une couleur bleuâtre et livide et rien ne soulageait que le grand air et les bains tièdes. Les accès devenaient toujours plus fréquents et enfin la maladie quasi permanente. L'enfant paroissait dans le plus grand danger. Au bout de trois mois on donne la nourrice à l'enfant, qui ne voulant plus têter avala du moins le lait et en trois semaines il guérit parfaitement.“

41) COOPER, ENGLISH, FARRE.

men ⁴²⁾, alii in latus modo dextrum ⁴³⁾, modo sinistrum ⁴⁴⁾ decumbere malunt. Imminens suffocatio *venae sectione* e brachio sinistro instituta, vel saltem hirudinibus ad regionem cordis appositis, avertitur. Antispasmodica generis calidioris ut moschus et valeriana potius aerumnas adaugent ⁴⁵⁾. In aegro coeruleo adulto *folia digitalis purpureae* et *elixir acidum* HALLERI cum levamine adhibuimus ⁴⁶⁾. Alias timendum haec pharmaca cordis inertiam augere posse. Forte potius lenia *martialia* conducerent. Quid inspiratio *gaz acidi oxygenii* ⁴⁷⁾, quid *galvanismus* ⁴⁸⁾, quid *transfusio sanguinis* ⁴⁹⁾ a priori proposita valebunt, ulterior, dummodo in perniciem aegrotulorum non redundans, experientia docebit.

CAPUT

42) ABERNETHY l. c.

43) FARRE l. c.

44) HUNTER l. c.

45) CORVISART, NASSE ll. cc.

46) Idem fatetur MÜLLER l. c. adhibuit digitalem cum acido sulphurico diluto.

47) LENTIN l. c.

48) NASSE l. c.

49) NEVIN l. c.

CAPUT VII.

*De pericarditide.*¹

§. XXII.

Definitio. Literatura.

Definitio. 1. *P*ericarditidis nomine inflammationem pericardii et cordis designamus, morbum modo acute, modo chronice decurrentem, febre, dolore sub sterno, aut ad latus sinistrum thoracis, motu cordis abnormi, angustiiis et anxietate, dyspnoeâ, interdum tussi cum sputo cruento, lipothymiis et vomitu stipatum¹⁾.

2. Pe-

1) Α περί, circa et καρδία, cor. Sicuti enim sub nomine *peripneumoniae* inflammationem pleurae et pulmonis comprehendebam (P. II. Vol. II. Sect. I. Cap. VIII. §. XXXI. 1.), ita, sub nomine *pericarditidis* illam pericardii et cordis comprehendo, idque praeeunte DAVIS (l. c. p. 34.) qui ait: „*Die Entzündung des Herzens und des Herzbeutels scheint mir als eine Krankheit zu betrachten zu seyn, obgleich manche Schriftsteller sie als zwey verschiedene ansehen.*“ Impellor eo magis, ut utrumque morbum uno nomine comprehendam, cum ad lectos aegrorum inflammationem pericardii (*pleuritis pericardii*) ab illa cordis (*carditis*) conjecturâ dumtaxat distinguere valeamus. Rigidior adhuc est DAVIS (l. c. p. 32.) dicens: „ob

2. Pericarditidis mentionem primam injece-
runt: AVENZOAR²⁾, RONDELETUS³⁾, SALIUS DI-^{ra.}
VERSUS⁴⁾ et FORESTUS⁵⁾. Propius illam descri-
pserunt BERGER⁶⁾, GLOGER⁷⁾, HILDANUS⁸⁾, BO-
NETUS⁹⁾, LIEUTAUD¹⁰⁾, MORGAGNI¹¹⁾, HAUTE-
SIERK¹²⁾, VAN DOEVEREN¹³⁾, STOERK¹⁴⁾, FER-
RO¹⁵⁾, TRECOURT¹⁶⁾, METZGER¹⁷⁾, NUNN¹⁸⁾,
ME.

*die Entzündung des Herzens und des Herzbeutels jemals
in der Praxis unterschieden werden können, scheint sehr
zu bezweifeln.“*

- 2) Qui ipse hoc morbo laboravit, ac venae sectione sa-
natus fuit (DAVIS l. c. p. 7. (*)).
- 3) l. c. Vide supra Cap. IV. §. XII. N. 2. (38).
- 4) l. c. ibidem (45).
- 5) l. c. ibidem (51).
- 6) Diss. de inflammatione cordis. Wittemb. 1717.
- 7) Diss. de inflammatione cordis vera. Jenae 1758.
- 8) Observ. Chir. Cent. I. 43.
- 9) Sepulchr. anat. Lib. II. Sect. 8. Obs. 2. Sect. 9. Obs.
17. Sect. 10. Obs. 13.
- 10) Historia anatomico-medica. Paris 1767. Lib. II.
Obs. 669. 670.
- 11) De sedibus et causis morborum. Epist. XXIV.
Art. 2.
- 12) *Recueil d'observat. T. II. p. 580.*
- 13) Spec. Observ. academ. Cap. 4. p. 69.
- 14) Annus medicus. T. II.
- 15) Med. Ephemerid. p. 14. 17. 167. 173.
- 16) *Chirurg. Abhandl. und Wahrnehmungen. A. d. Fr.
übers. Leipzig 1777.*
- 17) Diss. de carditide. Regiom. 1789.
- 18) Diss. de carditide spontanea. Erford. 1788.

MECKEL ¹⁹⁾; et exactissime recentiores de morbis cordis scriptores ²⁰⁾ DAVIS ²¹⁾, STANLEY ²²⁾, DORN ²³⁾, HERTZBERG ^{*)}, ROUX ^{**) et PETRENZ ^{***)}.}

§. XXIII.

Symptomata. Autopsia cadaverum.

Symptomata.

1. Pericarditis orditur ut plurimum derepente cum frigore ²⁴⁾, aut forti et continuo, aut leviori et

19) l. c. ibid.

20) CORVISART op. c. *Première classe. Chap. I. p. 6 — 24. — Quatrième classe. Art. premier. p. 236 — 251.* ALLAN BURNS l. c. p. 67. TESTA l. c. p. 197. 201. et KREYSIG l. c. 2. Th. 1. Abtheil. 2. Abschn. p. 67.

21) *Inquiry into the symptoms of carditis, illustrated with cases and dissections. Lond. 1809. Utor versione germanica: Untersuchung über die Symptome und die Behandlung der Herzentzündung durch Krankheitsgeschichten und Leichenöffnungen erläutert. Nebst Dr. W. K. WELLS Bemerkungen und Fällen über Rheumatismus des Herzens. A. d. E. übers. von J. L. CHOU-LANT, mit einer Vorrede und Anmerkungen von F. L. KREYSIG. Halle 1816.*

22) in *Medico-chirurg. Transact. Vol. VII. P. II. Art. 2.*

23) *Beytrag zur Diagnostik der Herzentzündung in HUFELAND's Journal d. pr. Heilkunde 1822. Januar. p. 49.*

*) *Diss. de carditide. Hal. 1817.*

**) *Diss. collectanea quaedam de carditide exsudativa. Lips. 1819.*

***) *Diss. pericarditidis pathologia. Lips. 1822.*

24) Sub frigoris accessu corpus interdum, ac si gypsum esset, pallet.

et intercurrente calore. Calor autem est conspicuus, saltem dum morbus acute decurrit ²⁵). Calent maxime pectus inprimis ad latus sinistrum ²⁶). Percipit interdum aeger acsi vas liquore fervido repletum super hoc latus effunderetur. Concomitantur vero aestum externum et internum magna inquietudo ²⁷). Facies est aut rubra, aut pallida, subflava; oculi splendent humidique sunt ²⁸); lingua apparet rubra, nigra et sicca; sitis est inexplebilis *), cum aquae frigidae desiderio ²⁹), deglutitioneque dolorificâ et impeditâ ³⁰). Vox rauca ³¹) et respiratio, sub

H 2

actu

25) DAVIS dubitat, num febris ad symptomata essentialia pericarditidis pertineat; provocatque ad SELLE, qui calorem exiguum in definitione carditidis stabilivit. (Pyretol. rudim. method. p. 119.). Et casus MOROAGNI (l. c. Epist. XXIV. 2.) de carditide absente febre testatur.

26) STOERK l. c. p. 92.

27) MIROR KREYSIG dicere: „... *Angst und Unruhe klagen viele Kranken von Anfang nicht.*“ l. c. p. 121.

28) TESTA l. c. p. 231. KREYSIG aegros libenter oculos claudere asserit (l. c. p. 122.).

*) Hoc symptoma a P. SALIO DIVERSO notatum non ita est constans, ut vulgo contenditur.

29) TESTA l. c. p. 234.

30) TESTA l. c. p. 237. 241. (In epidemia a TRECOURT descripta hydrophobia animadvertebatur).

31) PORTAL *Mém. de l'académ. des sciences* a. 1780. p. 323.

actu bibendi, inhibita³²⁾. Pulsus valde frequens³³⁾, oppressus plenus et interdum durus³⁴⁾, saepe inconstans**), vix sibi in utroque carpo similis³⁵⁾. Urina pauca flammea, saepe cum largo sedimento puriformi. Aegri adspectus gravem plerumque morbum designat. Conqueritur potissimum de dolore sub sterno aut ad latus sinistrum thoracis atque ad regionem epigasticam³⁶⁾. Infantes regioni dolenti manum, ipso sub somno, admovent. Dolor est modo gravativus

32) In aegro Clinici Instituti Vilmensis.

33) Ad 130. Sub morbi ingressu numeravi.

34) Auctores pulsuum duritiem nimis extollere videntur, cujus tamen erroris KREYSIG non est particeps. Explicare conatur sequentibus verbis LOWERUS, cur pulsus in pericarditide sit potius debilis. „Si enim cordis parenchyma aut nimia pinguedine oneretur, aut *inflammatione*, ulcere, abscessu aut vulnere laborat, adeo ut sine magna molestia atque difficultate aut absque gravi offensa sese vibrare aut contrahere non possit; motum suum valde remittit et sanguinem quantum potest, licet *non quantum* opus est, reliquo corpori distribuit, unde sanguinis quoque motus debilis admodum et languidus existit.“ (Tract. de corde. Cap. 2. p. 97.).

**) Debet hinc pulsus hoc in morbo plusquam in alio repetitis vicibus et per protractum temporis spatium explorari.

35) Inveni modo duriores, modo molliores in carpo sinistro.

36) TRECOURT l. c. (commune symptoma).

vus et terebrans ³⁷⁾, modo acutus et punctorius ^{***)}, fere semper aestuans ³⁸⁾. A profunda inspiratione ille vix augetur, immo aegri sponte spiritum veluti suspirando profunde ducunt ³⁹⁾. Haud raro dolor ad latus sinistrum colli ⁴⁰⁾, ad scapulam sinistram, aut inter scapulas, ad brachia, aliaque loca dissita percipitur ⁴¹⁾. Decubitus modo undique, modo in alterutrum tantum latus, maxime in dextrum, concessus. Provectiori in morbo plurimi sedere student. Dyspnoea, potius per angorem e regione cordis prodeuntem ⁴²⁾, quam per motum thoracis manifestatur.

Sunt

37) P. SALIUS DIVERSUS dixerat dolorem in carditide non esse pungentem.

***) Valde pungens erat dolor in aegra STÖERKII, quae tamen simul peripneumoniâ laborabat.

38) Ac si quid calidi ad locum affectum transfunderetur, dicebat aeger Clinici Instituti.

39) KREYSIG (l. c. p. 120.) id cum levamine fieri (*mit Behagen*) rite animadvertit.

40) Si aeger qui mense Novembri a. 1821. in Clinico Vilmensi carditide laborabat.

41) Dolores ad lumbos, iterum et vesicam obvenire asserit KREYSIG (l. c. p. 121.), item REEDER (l. c.) quod nunquam observavi. Cavendum sane ne symptomata, quae cum pericarditide fortuito societatem ineunt, morbo primario adscribantur. Hujus praecepti memor est DAVIS (l. c. p. 72.) ubi ulteriori observationi reliquit, num dolores ad plantas pedum alique vagi ad pericarditidem spectent nec ne!

42) „... anxietates continuæ in regione cordis.“ SAUVAGES Nosol. method. Class. III. 19. DAVIS ta-

Sunt tamen qui anhelent. Vibrat cor *), vibrant carotides; oscillant jugulares pulsatque epigastrium. Plurimi aegrorum de variis speciebus rumorum in thorace conqueruntur⁴³⁾. Sanguis interdum ex narice sinistra ruit⁴⁴⁾. Tussis per insultus, haud raro a motu corporis excitatos, redit. Est illa ab initio sicca, dein vero cum sputis ex mūco albo cum sanguine coloris atri aut lateritio mixtis, aegrumque vix sublevantibus absolvi solet. Interdum tamen sputa omnino desiderantur⁴⁵⁾. Halitus saepe calidus est. Plurimi aegrorum vomitum, nunc potus, nunc bilis, patiuntur⁴⁶⁾. In multis hypochondria tensa sunt. Sinistrum illud sursum comprimendo angustiae augeri solent. Crescente morbo debilitas et jactatio invalescunt. Accedunt praeterea sensus suffocationis, oedema faciei et extremitatum, ob-

nūbi-
men anxietati huic nimis tribuit, dum illam veluti pro pathognomico signo habet. l. c. p. 54.

*) Num cor maxime vibret dum cum pericardio ad haesionem contraxerit, aut dum adhuc liberum sit, Cap. VIII. §. XXIX. N. 2 (46) examinabitur.

43) „Kochendes Geräusch (TESTA l. c. p. 260.); „bruisse-
mens fugaces (CORVISART l. c. p. 27.).

44) Hoc symptoma non satis aestimatum hucusque fuit.

45) DAVIS l. c. p. 62.

46) De vomitu ut symptomate pericarditidis praesertim locuti sunt: DARWIN (Zoon. Vol. II. Cl. 2 — 1. 2 — 7.), BANG (Scl. diarii Nosoc. R. Frid. Hafn.), DAVIS (l. c. p. 68.). Observavi emesin praecipue in pericarditide senum chronica.

nubilatio oculorum, ac objecta, ac si viridi colore tincta essent ⁴⁷⁾, cernuntur. Nec desiderantur symptomata nervosa ⁴⁸⁾, potissimum delirium, nonnunquam furibundum ⁴⁹⁾, vertigo, aurium' susurrus ⁵⁰⁾ tetanus ⁵¹⁾ et lipothymiae ⁵⁵⁾. Haec maxime sub motu, in alvo deponenda et tempore nocturno observantur. Pulsus, duritiem

reti-

47) In plurimis aegrorum meorum.

48) Illorum mentionem injicit potissimum TRECOURT l. c.

49) TESTA (l. c.) delirium inter symptomata essentialia pericarditidis recenset. Aliter sentit DAVIS (l. c. p. 62.), ac re quidem vera multas pericarditides sine hoc symptomate (cui interdum fortuito complicatio cum encephalitide ansam porrigere posset) observavi: Caeterum non mirum homines sensiles sub tanta febre, quanta pericarditidem concomitatur, aliena loqui.

50) Pluries observavi.

51) DAVIS l. c. p. 53.

55) Quamquam lipothymiae, rite monente DAVIS (l. c. p. 67.) non spectent ad symptomata essentialia pericarditidis, obveniunt illae tamen nonnunquam, non solum in morbo proVecto, sed etiam in recentissimo. Tale exemplum narrat SENAC (l. c.), alterum propria exhibet praxis. Autumno scilicet A. 1820. Vilnae Vir juvenis a venatione defatigatus, super solum humidum sese conjecit, ibique obdormivit. Evigilatus se a gravi morbo correptum percepit, cui parum post tam vehemens lipothymia supervenit, ut aeger veluti exanimis domum deportaretur; ubi praecipua carditidis symptomata demum evoluta sunt. Quamvis recta medela illico adhibita fuerit, attamen labes cordis, verisimiliter polypus, relictus est.

retinens; fit parvus irregularis ⁵⁶⁾, et intermittens. Extremitates lividae, sudore irrorantur. Tunc mors sub summis angustiis ocuus ⁵⁷⁾ serius ⁵⁸⁾ scenam claudit. Felicissimo in casu consuetae criseos signa ingruunt. Saepe tamen crisis potius febrem, quam inflammationem, respicit, atque aeger in alios morbos inflammationis reliquias, infraque describendos, incidit. *Pericarditis chronica* cum iisdem quam acuta symptomatibus, sed lenius affligentibus, decurrit. Insignitur nonnunquam ciborum desiderio aucto ⁵⁹⁾, sudoribus colliquativis ⁶⁰⁾, diarrhoea mucosa, foetida ⁶¹⁾, ardore oesophagi ⁶²⁾, cessatione pulsus arteriarum ⁶³⁾ et oedemate ⁶⁴⁾.

2. Cada-

56) Pulsus irregularis ut symptoma constans pericarditidis describi solet. DAVIS fatetur se illud raro observasse (l. c. p. 61.), quod tunc de morbo recente vallet, unde pulchre FREYER (ibid. nota 12.): „Wenn man auf den unregelmäßigen Puls warten will, ehe man eine Herzentzündung erkennt, so wird man schwerlich einen solchen Kranken retten.“

57) Die 6. STOERK l. c. Die 7. crisis de vita et morte judicabat apud TRECOURT l. c.

58) Die 20. MECKEL l. c.

59) TESTA l. c. p. 249.

60) SENAC op. c. Lib. 4. Sch. 10. TESTA l. c. p. 250.

61) TESTA l. c. p. 254.

62) TESTA l. c. p. 258.

63) TESTA (l. c. p. 261.) de puella 14. annorum loquitur, in qua per 20. dies nullibus pulsus percipiebatur, praeter tremorem sub cartilagine ensiformi.

2. *Cadavera* hominum qui pericarditidem Autopsia cadaverum. perpassi erant, exhibuere: A) *pericardium* concretum cum pleura ⁶⁵⁾ et pulmonibus ⁶⁶⁾; — ad superficiem internam sacci et externam cordis, vasis innumerabilibus, sanguinem rubrum continentibus, notatum ⁶⁷⁾; — alias rubore quidem destitutum, sed omnibus notis, quae de praegressa inflammatione testantur, insignitum ⁶⁸⁾. Loquimur scilicet de *exsudatione lymphae coagulabilis* sub forma tum puris (modo obducentis superficiem utramque sacci pericardii ⁶⁹⁾, ac illam cordis externam ⁷⁰⁾, modo replentis plus minus cavitatem pericardii ⁷¹⁾), tum floccorum et villorum ⁷²⁾, tum filorum ab interna superficie peri-

64) TESTA l. c. p. 258.

65) DAVIS l. c. p. 51. Plus vice simplici ipse vidi.

66) STOLL *Heilungsmethods*. 2. B. 2. Th. p. 203.

67) Sic uno fere ore omnes qui de pericarditide scripserunt, testantur, testaturque propria quoque experientia. Cfr. BAILLIE l. c. Tab. I. DAVIS l. c. p. 44.

68) BICHAT demonstravit membranas inflammatione acuta detentas, ruborem brevi post mortem amittere (*Anatomie générale*. T. II. p. 491.). De hoc argumento alibi jam abunde locutus sum (P. II. Lib. II. Sect. I. Cap. III. §. XII. N. 4 (14)). Cfr. KREYSIG l. c. p. 77.

69) SOEEMMERRING *Anmerk. zu BAILLIE Op. c. Anmerk. 1.*

70) BAILLIE l. c. Tab. I. fig. 2.

71) Cfr. Cap. IX.

72) *Cor hirsutum, villosum*. Lege: BOSE Progr. de historia cordis villosi. Lips. 1771. — WEITBRECHT

pericardii ad externam cordis migrantium ac interdum rete constituentium ⁷³); loquimur de *pseudomembranis* (interdum duplicibus ⁷⁴), vasis sanguiferis instructis ⁷⁵), quae, modo indica-

tis

in Novis Comment. Petropol. T. III. p. 403. T. VI. p. 268. — SANDIFORT Obs. anat. patholog. Lib. I. Cap. 2. p. 43. — SOEMMERRING l. c. *Anmerk.* 9. p. 28. — WALTER Obs. anat. Tab. IV. fig. I. — HALLER de corporis humani fabrica. Lib. IV. Sect. I. §. 32. p. 54. — SCHENK Observ. Lib. II. Obs. 182. p. 351. — VAN DER WIEL Obs. Cent. I. p. 384. — BONETI sepulchr. Anat. Lib. II. Sect. 8. Obs. 39. — Miscell. Nat. Cur. Dec. III. An. 5 et 6. Obs. 122. Ephem. Cens. VIII. Obs. I. — LIEUTAUD hist. anat. Lib. II. Sect. 2. Obs. 469. T. II. p. 152. Nec datur museum pathologicum, quod cordis villosi exempla non exhibeat. Plura museo Vilmensi tradidi. Flocci interdum cordi adspectum, ac si id *erosum* esset, conciliant (HAEN *Heilungsmethode.* 4. B. 9. Th. 1. Kap. p. 199.). Num exempla *crinium cordi adhaerentium*, de quibus narrant RIOLANUS (*Anthropographia et osteologia.* Paris 1626. Lib. 3. C. 7.), BAUHINUS (*Instit. anat.* Lib. II. Cap. 17.), LANZONI (*Miscell. Nat. Cur.* Dec. III. A. 5 et 6. Obs. 122.) et HALLER (*Elem. Physiol.* Vol. I. p. 285.), ad corda villosa spectent nec ne, determinare non audeo. Constat etenim *legitimos crines* alia viscera detinere posse. (v. operis praesent. P. I. Vnl. II. Cap. XXV. §. XCIX. 5.) cur non quoque cor?

⁷³) Vide Cap. VIII. §. XXIX. N. 2 (32).

⁷⁴) STOLL *Heilungsmethode.* 2. B. 2. Th. p. 183.

⁷⁵) STOLL l. c. p. 207. SOEMMERRING zu BAILLIE *Anmerk.* 1.

tis pericardii et cordis superficiebus aut omnino adhaerent ⁷⁶⁾ (ex quo fit incrassatio pericardii ⁷⁷⁾, saepe dilatati, asperi ⁷⁸⁾, structurae fere muscularis ⁷⁹⁾; aut dumtaxat partim accretae sunt (ex quo fiunt veluti pendulae appendices vermiculares ⁸⁰⁾), modo cor involvunt ⁸¹⁾ et abscondunt ⁸²⁾,
modo-

76) BAILLIE l. c. Tab. I. fig. 3. Pseudomembranis et maculae illae albae et opacae originem debere videntur, quae plerumque superficiem ventriculi cordis arteriosi obsidere solent, quaeque a BAILLIE et SOEMMERRING pro morboris non habentur (l. c. *Anmerk.* 25.) quarumque originem se ignorare fatetur CORVISART l. c. p. 42. Atque hinc per transennam monere juvabit, cordis superficiem externam interdum *ecchymomata* et *peticulas* exhibuisse (STOLL *Heilungsmethode*, übersetzt von FABRI. 2. B. 2. Th. p. 197.).

77) Ad crassitudinem septem linearum v. LIEUTAUD l. c. Obs. 693. p. 217. Ad pollicem v. SENAC l. c. p. 72. Cfr. CHAMBON DE MONTAUX *merkwürdige Krankengeschichten und Leichenöffnungen*. 3. B. p. 260.

78) WALTER l. c. p. 57. Tab. IV. fig. 3. SOEMMERRING zu BAILLIE *Anmerk.*

79) BOERHAAVE l. c. p. 498. BUDDAEUS *miscell. medico-practica et forensia*. T. I. p. 3. *Miscell. N. Cur.* Dec. II. a. 7. Obs. 12. a. 9. Obs. 92. Dec. III. a. 2. Obs. 188.

80) BONET *sepulchr. Anat.* I. p. 820. 832. 836. 869. — HAEN *Heilungsmethode*. 4. B. 9. Th. Kap. I. p. 196.

81) BOERHAAVE l. c. p. 494. VAN DOEVEREN l. c. p. 74. HAEN *Op. c.* 6. B. 14. Th. Kap. I. §. 9. p. 210.

82) JOSEPH FRANK *Ratio Instituti Clinici Ticinensis*. Vindob. 1796. Cap. IX. (Casus hic maxime memorabilis tabula aenea illustratus est. Pericardium cum

modoque illius cum interna superficie pericardii adhaesionem efficiunt ⁸³); — loquimur de *extra-vasato seri aut sanguinis* in cavum pericardii ⁸⁴), nec non de *defectu liquoris pericardii* *), sacco ipso veluti pergameno ⁸⁵), cartilagineo ⁸⁶) red-
dito;

corde ponderis erat undecim librarum. Continebat circa sex libras seri purulenti, caeterum *vacuum apparebat*. Cor enim cum parte posteriori pericardii concretum, et anterieus a pseudomembrana obductum, plane abscondebatur. Illius praesentia solum ex eo dignosci potuerat, quod spatium aliquod triangulare in pericardio spissius detegebatur.

83) Vid. Cap. VIII. §. XXIX. N. 1.

84) Cap. IX. §. XXXIII. 2.

*) BAILLIE l. c. Docent tamen observationes MORGAGNI (Epist. VII. 2. Epist. XI. 13.) et SANDIFORTI (Obs. anat. pathol. Lib. IV. Cap. 6. p. 55.) posse liquorem pericardii deficere quin vel saccus vel cor a norma deflectent.

85) HUNTER et BAILLIE l. c.

86) BORRICHIIUS apud MORGAGNI Epist. XXII. 20. RYOLAN Anthropol. Lib. III. Cap. 12. — HAUTESIERK l. c. p. 553. — Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 20. „Die 5. Octobris 1807. coram oculis mihi positum fuit a Professore Clinices chirurgicae Petropolitanae BUSCH cor pueri duodecim annorum. Hic puer per mensem laboraverat induratione utriusque testiculi, praeterea nullis aliis morbis obnoxius fuisse visus est, nisi quod tussin subinde pateretur. Nullam ille respirationis difficultatem accusaverat, hilaris semper erat, saepe ob suam petulantiam insolitam a patre correctus. Ob testiculorum illum morbum susceptus ante mensem in Clinicum, quondam noctis tempore tussi

dito, interdum plagas osseas ⁸⁷⁾ exhibente; loquimur de pericardii *tumoribus suppuratis* ⁸⁸⁾ deque *ulceribus* ⁸⁹⁾ atque destructione membranae substantiam muscularem cordis extus cooperientis ⁹⁰⁾; — *Cordis substantiam muscularem* ⁹¹⁾,
rubram ⁹²⁾,

vehementissima correptus in paroxysmum, epilepsiae similem, sed subito letalem, incidit. Cor nihil quidem a consueta magnitudine et forma aberrare conspectum est; sed *pericardium* tantae crassitiei fuit, ut quibusdam in locis *ultra pollicem densitatis* habuerit et ad attactum *cartilagineam* duritiem manifestaverit. Pinguedinosa quasi steatomatosa videbatur, modo durior, hujus pericardii substantia, non tamen ubique sibi aequalis, sed crassior versus locum, cum quo diaphragmati pericardium incumbit. Admiratione vero dignum est, hoc a vitio pericardii non prius, quam brevi ante mortem, symptomata producta fuisse consueta. An haec pericardii constitutio cum induratione testiculorum quodammodo conspirat? (Ex schedis Patris mei).

87) AURIVILLIUS Nova Act. Soc. Scient. Upsal. 1773. Vol. I. p. 101. WALTER Observ. anatom. p. 63. — Ejusdem anat. Museum. I. B. p. 148. 149. 297. SENAC l. c. p. 68. HALLER addenda ad Elem. Physiol. p. 128. Vide infra Cap. XI. §. XLI. N. 1.

88) BELL Zerglieder. des menschl. Körpers. I. B. p. 191.

89) PLATER T. III. Cap. 5. VAN DOEVEREN l. c. p. 58. SCHMIEDEL Diss. de exulceratione pericardii et cordis exemplo illustrata. Jenae 1742. STOERK Ann. med. II. p. 235.

90) MECKEL in Mém. de Berlin. l. c. p. 31.

91) CORVISART pulchre effectus inflammationis substantiae muscularis sequentibus explicat verbis: „Quant à

rubram ⁹²⁾, albam ⁹³⁾, nigram ⁹⁴⁾, relaxatam, friabilem ⁹⁶⁾, volumine tum auctam ⁹⁷⁾, tum imminutam ⁹⁸⁾, suppuratam et exulceratam ⁹⁹⁾, induratum

L'inflammation du tissu musculaire, il semble, d'après les observations citées, que cette affection convertit à la longue la partie musculaire du coeur en une substance molle et pâle; les fibres charnues conservent peu de ténacité, le tissu cellulaire qui les unit parait lâche; quelque fois il est pénétré de matière lymphatico-purulente; dans certain cas, il est en partie détruit; le système vasculaire est plus apparent, plus développé que dans l'état ordinaire“ (l. c. p. 249.).

92) DAVIS l. t. p. 62.

93) RIVERIUS Observ. centuria I. Obs. 87. p. 490. Lugd. Bat. 1679.

94) KERRRING Specilegium Anat. Amstel. 1670.

96) Vide infra. Cap. XIII. §. LIV.

97) Vide infra. Cap. XII. §. XLVI.

98) ibid. §. XLVII.

99) Exempla hujus generis narrant: BLANCARD Anat. rar. Cent. I. Obs. 40. p. 93. Cent. II. Obs. 6. p. 202.; — BONET Sepulchr. anat. Lib. II. Sect. 8. Obs. 8. 38. 41. Sect. 9. Obs. 10. 42. Sect. 10. Obs. 2. 8 T. I. p. 349.; — SCHMIEDEL l. c.; — MORGAGNI Epist. XXV. 17. 18. 19. 21. 22. Epist. XXXVIII. 10.; — SENAC Lib. 4. Cap. 7. p. 385.; — LIEUTAUD Hist. anat. T. II. p. 164. Lib. II. Sect. 20. Obs. 510 — 516. — SCHAAR-SCHMIDT med. u. chir. Nachricht. Berlin 1743. Jahrg. I. p. 45. Jahrg. 3. 1745. p. 244.; — HALLER Elem. physiol. T. I. p. 285 et 432.; — JUNKER de morbis cordis Tabula synoptica. Hal. 1763.; — FANTONI Obs. Anat. 16. 22. 28.; — RIVERIUS Obs. med. Lib. II. p. 298.; — SCHENK Obs. med. Lib. II. Obs. 202.

duratam ¹⁰⁰⁾, gangraenosam ¹⁾: C) *Membranam inter-*

204. 207. p. 377.; — FABRICIUS HILDANUS Obs. Chir. Basil. 1606. Cent. IV. Obs. 51.; — FR. HOFFMANN de hydropo pericardii rarissimo. Hal. 1697.; — BAA-
DER Obs. XXXVI. Ephem. Nat. Cur. Dec. I. An. I. Obs. 31. Cent. IX. Obs. 15. etc. Fides autem istis observationibus omnibus tribuenda non est, quoniam illarum plurimae confusio inter lympham coagulabilem et pus superstruuntur. Fide digna exempla *legitimorum abscessuum et ulcerum cordis* leguntur apud LANCISIUM de motu cordis et aneurysmatibus P. II. Cap. 23. p. 181.; — TRECOURT l. c. p. 30.; — BOER-
HAAVE l. c. p. 476.; — VAN DOEVEREN l. c. p. 70.; — STOERK Ann. Med. II. p. 262.; — BALDINGER *Krankh. einer Armee. Lang.* 1774. p. 301.; — CAR-
CASSON *mém. de la Sociét. R. de médecine.* 1778. SANDIFORT Obs. anat. pathol. Lib. IV. Cap. 10. p. 109.; — CHAMBON DE MONTAUX l. c. p. 133.; — CRUIK-
SHANK *Geschichte u. Beschreibung der Saugadern. Uebersetzt v. CH. F. LUDWIG. Leipz.* 1794. 3. B.; — STANLEY l. c.

100) SCHAARSCHMIDT l. c. 3. Jahrg. p. 244. — BARTHOLOMI hist. anat. rar. Cent. IV. hist. 20. T. II. p. 266. — IC. PEYER method. hist. anat. med. Cap. 6. p. 87. — Miscell. Nat. Cur. Dec. II. An. I. Obs. 89. Dec. II. An. 6. Obs. 194. — LIEUTAUD l. c. Lib. II. Sect. 2. Obs. 541. T. II. p. 169. — MORGAGNI l. c. Epist. XXI. 4. aliique. Plurimae tamen indurationes, de quibus allati auctores agunt, potius a scrophulis et carcinomate, quam ab inflammatione repetendae videntur.

1) LIEUTAUD l. c. T. II. p. 168. Obs. II. Sect. 2. Obs. 539. — TRECOURT l. c. STOERK l. c. p. 262. — MECKEL l. c. Cfr. §. XLC. N. 8.

internam cordis rubram (cum vasis sanguineis veluti arte injectis ²⁾), tumidam et inspissatam ³⁾, pseudomembranâ tum obductam ⁴⁾, tum sub forma polyporum obsessam ⁵⁾; angustationes et dilatationes cavitatum cordis orificiorumque arteriarum et venarum ⁶⁾; — E) *Valvulas* et *trabes* rubras et lymphâ coagulabili obductas ⁷⁾ induratas ⁸⁾, illas cum parietibus cordis concretas ⁹⁾, tuberculis et excrescentiis obsessas ¹⁰⁾,
tendi-

2) KREYSIG l. c. p. 87. PORTAL *anat. méd.* p. 77.

3) PORTAL l. c.

4) BURNS l. c. p. 206. CORVISART l. c. p. 460.: „J'ai trouvé (ait), dans la cavité du ventricule gauche, une concretion lymphatique épaisse, dure et très adhérente à la partie moyenne de la surface du cloison des ventricules.“

5) BURNS l. c. p. 223. — KREYSIG l. c. p. 90. Vide infra Cap. X. §. XXXVII. N. 2.

6) Cap. XII. §. LII.

7) BAILLIE l. c.

8) WARREN *New England Journal of medicine and surgery*. T. 2. Vol. I. Boston. 1812. — DAVIS l. c. p. 48.

9) RAIGER in *Ephem. Nat. Cur.* Dec. I. a. 3. Obs. 282. p. 498. — LITRE in *Mém. de l'acad. des sciences à Paris* 1713. — LIEUTAUD l. c. Lib. II. Sect. 2. Obs. 596. T. II. p. 184. Plurima exempla ipse vidi.

10) MORGAGNI *Epist.* XI. 11. *Epist.* XXIV. 18. *Epist.* XXIX. 12. *Epist.* XL. 23. *Epist.* LXIV. 2. — LANCISI *de subit. mort.* — SANDIFORT l. c. Lib. I. Cap. I. p. 31. Tab. III. fig. 4. Lib. III. Cap. I. p. 41. —

tendineas et incrassatas ¹¹⁾ ossificatasque ¹²⁾; — F) *Vasa coronaria cordis*, materiâ, cum illa quae ex trachea croup laborantium exsodat, similitudinem alente, repletâ et ossificatâ ¹³⁾; — H) grumos lymphae coagulabilis circa auriculas cordis et originem vasorum majorum ¹⁴⁾; G) *cerebri vasa cruore turgida* ¹⁵⁾, serum ibi extravasatum ¹⁶⁾; *pulmones* valde rubentes sanguine atro refertos ¹⁷⁾, indicia inflammationis circa *diaphragma* et *ventriculum* ¹⁸⁾; *hepar* magnum *intestinaeque* sanguine plena ¹⁹⁾; *collectiones* demum *serosas* in cavitatibus thoracis non solum sed et peritonaei atque sub cute ²⁰⁾.

§. XXIV.

C a u s s a e.

1. *Pericarditidi praecipue obnoxii sunt, qui* Praedispo-
habitum nentes.

FORLANI Obs. anat. — SOEMMERRING apud BAILLIE p. 21.

11) MORGAGNI Epist. XXV. Epist. XXVI. 33. Epist. XLVIII. 38. Epist. XXX. 7. BAILLIE und SOEMMERRING l. c. *Anmerk.* 42.

12) Cap. XI. §. XLI. N. 5.

13) Vide infra Cap. XXVI.

14) DAVIS l. c. p. 52.

15) DAVIS l. c. p. 45.

16) Idem ib. p. 48.

17) MECKEL et DAVIS l. c. p. 48.

18) DAVIS l. c. p. 48.

19) DAVIS l. c. p. 52.

20) TESTA l. c. p. 254.

Frank Prax. II. 2. 2.

habitu athleticum prae se ferunt, qui vitiis cordis congenitis ²¹⁾ aliisque chronicis ²²⁾, iis pulmonum non exceptis ²³⁾, laborant, gravidae et puerperae ²⁴⁾, senes ²⁵⁾, hepate et liene
prae-

21) Cap. V. §. XV.

22) Sicuti oculus, pulmo, morbis chronicis detenti, facile in ophthalmitidem et peripneumonias incidunt, ita et cor.

23) SENAC l. c. T. II. p. 381. „*Le sang ne peut passer facilement dans les poulmons enflammés; les efforts redoublés du coeur irritent son tissu, y arrêtent le cours des fluides.*“

24) MECKEL in *Mémoires de Berlin* l. c. p. 56. — BURNS l. c. p. 78. — TESTA l. c. p. 350. JAHN in *HUFFELANDS Journal der pr. Heilkunde*. 23. B. 3. St. p. 57. — KREYSIG 2. Th. 2. Abth. p. 170. Uterus gravidus super aortam abdominalem vim exercens necessario congestionibus circa cor sinistrum ansam praebere debet. Praeterea eadem proclivitas ad exsudationes, quae in peritoneo puerperarum animadvertuntur, et pericardio propria esse solet. Immo hic saccus, utpote mammae contiguus, effectus suppressionis lactis praeprimis experiri debet.

25) Dum medicus nosocomii generalis Vindobonensis fui, opportunitate fruebar multos milites veteranos qui in aula Imperatoria excubias agebant, curandi. Plurimi illorum *febre catarrhali* cum paucisputo cruento, anxietate, virium jactura magna, voce flebili et *lingua arida*, laborare videbantur. Fere omnes paucorum dierum spatio morte veluti senili mortui sunt. Licuit duo cadavera aperire, in quibus *cor exsiccatum*, ac linguae instar aridum, inveni. Similes circiter observationes apud RANCHIN *Opuscul. medica*

praemagnis praediti ²⁶), affectionibus flatulentis subjecti ²⁷), vitio arthritico ²⁸) et scorbuti-

I 2

co ²⁹)

p. 380. Edit. Lugd. Bat. 1627. — MORGAGNI op. c. Ep. XLIX. BOERHAAVE l. c. p. 495. in Misc. N. Cur. Dec. I. An. 3. Obs. 65. Dec. III. An. 3. Append. p. 86. obveniunt.

26) Observationes meae plane verba TESTA (l. c. p. 65.) confirmant: „So habe ich in den Leichen derer, die an Krankheiten des Herzens gestorben waren, meistens eine widernatürliche große Leber gefunden“ et (p. 68.): „durch sie (die Anschwellungen der Milz) entstehen mancherlei Fehler der Brusthöhle.“ Idem CORVISART testatur, ubi ait (l. c. p. 443.): „dans presque tous les cas de maladies du coeur le foie devient le siège d'un engorgement sanguin que j'ai souvent constaté sur les cadavres ...“ Habet vero CORVISART affectionem istam hepatis pro affectu morbi cordis, asserens: „par suite des dérangemens de la circulation et particulièrement du dégorgement difficile de la veine cave inférieure dans l'oreillette droite, le foie, dans les maladies du coeur, éprouve des altérations particulières.“ Quin et hoc fieri negaverim, fateor tamen me saepe affectionem hepatis jam tunc observasse ubi de illa cordis necdum umbra suspicionis obvenerat. Porro quid miri, si arteria hepatica et lienalis difficultatem sese deplendi experiantur, quod sanguis in arteriam coeliacam, aorta et corde accumuletur, quodque congestio haec ad inflammationem hujus visceris disponat? — KNEYSIG (op. c. I. Th. p. 363.) hepar aliunde sanum, in morbis cordis interdum prolabi asserit, idque ex relaxatione diaphragmatis fieri suspicatur.

27) TESTA l. c. p. 67.

co ²⁹) contaminati, morbos exanthematicos infantiles haud dudum perpassi, inprimis si annua constitutio ³⁰) aut vitium haereditarium superaccedunt ³¹).

Excitantes. 2. *Excitatur pericarditis* a violentiis externis, nempe a vulneribus ³²), a contusionibus, a lapsu ³⁴),

28) Quanta sit diatheseos arthriticae vis in cor et arterias ex Cap. XI. §: XLIII. N. 1. elucebit.

29) Cum diathesis scorbutica maxime musculorum et vasorum sanguiferorum vim infringat, cor autem musculus sanguinem recipiens sit, diathesin scorbuticam a morbis cordis haud fore alienam, intelligitur.

30) TRECOURT l. c. carditidis epidemicae meminit; ac re quidem vera cum constitutio annua saepe causam contineat cur pulmones, oculi, fauces intestinaque inflammantur; cur idem relate ad cor locum non haberet?

31) Utrumque fratrem W. Vilnae ex morbis cordis defunctos vidi. Alterum illorum secui (praesente! altero fratre octo annis serius ex carditide chronica mortuo) invenique cor praemagnum, ventriculis dilatatis parietibusque incrassatis.

32) SEBIZ examen vulnerum partium dissitarum. P. II. §. 71. SENAC l. c. Cap. 7. TRILLER Diss. de mirando cordis vulnere post 14. dies lethali. Vittemb. 1775. BOSE Pr. de vulneribus cordis in foro absolute lethalibus. Lips. 1785. — METZGER Diss. de lethalitate vulnerum cordis. Regiom. 1799. MORGAGNI l. c. Epist. LIII. 4. 26. 27. Ejusdem Dissert. anat. N. 15. — LARREY Medic. chir. Denkwürdigk. A. d. Franz. übers. 1811. p. 620. — BUCHNER in Geneeskundige Mengelingen. Derde Stuk 1819. Amsterdam (Acus

lapsu³⁴⁾, ab ictu³⁵⁾, a compressione³⁶⁾, a concussione³⁷⁾, a nisu in ponderibus gestandis³⁸⁾ elevandisque³⁹⁾, in campanis pulsandis⁴⁰⁾, in cursu⁴¹⁾,

quae ab externis partibus ad cordis substantiam penetravit in infante novem mensium).

34) Ab equo, ex curru v. OGIA in *Abhandl. der Londoner med. Gesellsch.* 1. B. p. 71.

35) Praecipue in militibus, judaeis pauperibus, in infantibus punitiois causae.

36) A. 1821. Lectiones Professoris historiae Universalis in Universitate Vilnensi a tanto discipulorum numero frequentabantur, ut unus illorum a sociis in angustissimum spatium compressus, in plurima pericarditidis symptomata incidit, non sine suspitione relictii vitii cordis gravioris generis.

37) A vactione in curru incommodo super vias saxosas pericarditidis reliquias in veredariis, itineratoribus, pluries consexi. Cfr. Casus a CORVISART narratus. Op. c. p. 262.

38) TESTA l. c. p. 90.

39) Observavi pericarditidem ex vi adhibita in amphora puteo profundo extrahenda; in curru sublevando; in eo sub veloci decursu declivis retinendo; in ponderibus portandis, in ocreis angustis induendis etc. — A. 1812. aegra in clinico Vilnens. decubuit, quae, dum anno aetatis suae decimo sexto, partem superiorem preli, quo lintea levigantur, lapidibus magnis oneratum elevasset, illico vehementem pectoris dolorem, sensumque, ac si quid in eo ruptum esset cum strepitu, percepit, subsequente lipothymia.

40) Sic in Monacho Vilnensi, sicque in duobus aegris. TESTA l. c. p. 243. et p. 245.

cursu ⁴¹⁾, in saltatione ⁴²⁾, in exercitiis gymnasticis absolvendis ⁴³⁾, in retentione spiritus ⁴⁴⁾, a laboribus rusticanis et hortulanis antrorsum flexo corpore peragendis ⁴⁵⁾, ab animi pathematibus, maxime a moerore ⁴⁶⁾, ab anxietate per diuti-

41) Cursores morbis cordis valde obnoxios fuisse ex VALSALVA et TESTA (l. c. p. 91.) intelligitur. Ex cursu in equo fugitivo prosequendo pericarditidem KREYSIG (l. c. p. 149.); vidit ortam. Vidi et ego binis vicibus in hominibus exercitiis militaribus prope nimis adstantibus et, a cohortibus equestribus obviam venientibus, ad praecipitem fugam coactis.

42) Saltatores theatrales (inter quos tum in Ticino tum Vindobonae praxin sat amplam exercui) morbis cordis et vasorum majorum valde obnoxios esse rite animadvertitur in *Journal général de médecine françoise et étrangère. Tome LXX. IX. de la 2de Série 1820. Mars. p. 342.* Pulchre ait quoque KREYSIG (l. c. p. 149.): „Ich zweifle nicht, daß schnelle Todesfälle, welche auf unmäßiges Tanzen bei jungen Frauenzimmern nicht selten erfolgen, oftmals nicht in den Lungen, sondern in den Herzen ihren Grund haben.“ Cfr. TESTA l. c. p. 91. DAVIS l. c. p. 81.

43) TESTA l. c. p. 93. SENAC l. c. T. II. p. 380. Huc sane gladiatorum syncope, de qua GALENUS (Opp. edit. CHARTER T. VII. p. 484. de locis affectis. Lib. V. Cap. 2.) loquitur, spectat.

44) TESTA l. c. p. 148. (a tractatione instrumentorum musicalium pneumaticorum cantuque).

45) TESTA l. c. p. 90.

46) KREYSIG l. c. p. 150. inquit: „Von SOEEMMERNING meldet mir, er habe mehrmals Herzentzündungen in den

diutinum tempus protracta ⁴⁷⁾, a terrore ⁴⁸⁾, ab amore ⁴⁹⁾, a veneris abusu ⁵⁰⁾, a refrigeratione corporis-

Leichnamen junger Soldaten gefunden, wo sie als Folgen eines großen Heimwehs eingetreten sey.“

47) Judaei Poloni, commercio mercium vitatarum indulgentes, dum diu de exitu negotiorum huc spectantium anxii vixerunt, mihi saepius symptomata pericarditidis chronicae exhibuerunt. Idem in hominibus chartarum lusui addictis, observavi.

48) Virgo Vilnensis vicennalis a. 1812. a pluribus militibus praedantibus exercitus NAPOLEONTIS, qui glande plumbea eam exanimare moliebantur, prosequuta erat. Terrore discriminis vitae ineffabili plane confecta in diuturnam incidit lipothymiam, ex qua resecta calore febrili ardente, moxque insigni cordis palpitatione, nec non respirationis difficultate magna excruciebatur. Febris post paucos dies evanuit, sed reliqua symptomata, cordis nempe palpitatio atque dyspnoca, remanserunt. (Continuatio hujus historiae traditur Cap. XII. §. XLVIII. N. 1 (93)). Virgo octodecim annorum, urbis Minsk incola, a. 1822. post breve iter domum redux exequiis celebrantibus obviam venit, auditque illas proprium patrem respicere. Desperabunda humum veluti exanimis cecidit, domumque deportata in dolorem sterni cum vehementi cordis motu ac angustia incidit. Negligitur venae sectio et adhibentur antispasmodica calcfacientia. Post sex menses video aegram notas dilatationis cordis exhibentem!

49) Non est sane metaphora quod cor ab amore patitur, vidique plus vice simplici ex hoc pathemate diu protracto, concurrentibus tamen aliis quoque causis graves hujus visceris affectiones.

50) TESTA l. c. p. 91.: „Leider ist auch der Mißbrauch

corporis ⁵¹⁾, praecipue a haustu gelido aestuante corpore ingurgitato ⁵²⁾, a potu liquorum fermentatorum nimio ⁵³⁾; a fuga praepostera impetiginum et exanthematum, inprimis psorae ⁵⁴⁾, herpetis ⁵⁵⁾,

des Geschlechtstriebes eine der wichtigsten Quellen, woraus diese Uebel entstehen. Bedenkt man die gewöhnlichen Erscheinungen bei dem Beischlase, besonders das Herzklopfen, das Keichen und die Beschleunigung des Pulses; so ist wohl nichts gewisser, als dafs, zumal in gewissen Jahren, und wenn der Körper schon vorher angegriffen war, sehr leicht dauernde Fehler des Herzens entstehen.“

51) Pericarditidum mihi visarum pars maxima refrigerio aestuante corpore suscepto ortum debebat.

52) Considera proximitatem oesophagi et pericardii et intelliges, quod potus gelidus, aestuante inprimis a motu corpore ingestus, pericarditidem producere debet.

53) Potatores strenuos pericarditidi et illius sequelis obnoxios esse, propria experientia edoctus sum. Videtur id multiplici ratione fieri, nimirum hepar obstruendo, corpus calefaciendo, animum perturbando etc. Opificia ad abusum potus vini ducentia, quammaxime morbis cordis favere TESTA (l. c. p. 91.) affirmat: „Die Fuhrleute und Führer der Saumthiere, die die Lasten des Lebens und die Beschwerden ihres Standes in Wein zu ertränken pflegen, diese machen in unsern Hospitälern die grösste Zahl derer aus, welche an Krankheiten des Herzens leiden.“

54) MECKEL l. c. p. 81. PRESSAVAIN *Nouveau traité de vapeur* p. 81. OSIANDER *Denkwürdigkeiten aus der Geburtshülfe*. 2. B. 1. Th. p. 146.

petis ⁵⁵), erysipelatis ⁵⁶), urticariae ⁵⁷), fonticulorum ⁵⁸); a contagio pestis ⁵⁹), morbillorum ⁶⁰), scarlatinae ⁶¹), rabiei caninae ⁶²), syphili-

55) TESTA l. c. p. 86.

56) A. 1817. Mense aprili Vilnae ad aegrotum de vitio chronico cordis prius suspectum, nunc vero pericarditide gravi laborantem vocatus sum; postridie erysipelas ad faciem comparuit evanescentibus illico symptomatibus inflammatoriis circa cor.

57) Dyspnoea, anxietas, jactatio, lipothymiae quae interdum eruptionem Urticariae praecedunt, aut illius fugam sequuntur (P. I. Vol. II. Cap. V. §. XXIII. 5.) nexum hujus exanthematis cum corde abunde demonstrant.

58) PORTAL *Cours d'anatomie médicale. T. III. p. 92.*

59) SALIUS DIVERSUS de febre pestil. Bonon. 1584. et QUESNAY *des fièvres. T. II. p. 448.*

60) Contagium morbillorum pericarditidem quandoque excitare docent observationes PORTALII (l. c. p. 127.) aliorumque (*Medic. Comment. von Edinbourgh. Dec. II. 2. B. p. 14.*). In epidemia morbillorum a mense Augusto usque ad Decembrem A. 1822. late per Lithuaniam grassante, pericarditides pluries mihi observare contigit. Inter alios aegros exemplum puellae undecim annorum memorabile est, utpote quae sub morbillorum eruptione in *epistaxin* librarum duarum *ex narice sinistra* incidit, concomitantibus febre magna, pulsu oppresso, anxietate, jactatione, torpore brachii sinistri, dolore sub sterno et vehementi cordis motu. Hirudines thoraci sinistro adpositae et sinapismi pedibus admoti illico morbillos ad simplicitatem reducerunt.

61) KREYSIG l. c. p. 151. A. 1819. Mense septembri ad pucrum Vilnensem 13. annorum vocatus sum, scarla-

philidis ⁶³); a mercurio ⁶⁴), arsenico ⁶⁵), et
maxime

tina laborantem. Aderant praeterea timor mortis, vomitus, qulsus irregularis, dolor ad thoracem sinistrum, tussicula et lipothymiae. Symptomata haec, pericarditidi adscribendo huiusmodi primū et dein vesicatorium regioni cordis amota fuere. Sic puer ex orci faucibus creptus est.

62) Inflammationem cordis interdum *concomitari* hydrophobiam rabiosam, atque inter phaenomena huius morbi ac pericarditidem quamdam intercedere similitudinem, debito loco demonstrabitur (P. IV. Vol. II. Caput de morsu animalium rabidorum); at vero ipsam rabiem pro effectu pericarditidis habere (KREYSIG l. c. p. 151—159.) a veritate alienum est. In tribus enim, ex hydrophobia in Clinico Vilmensi demortuorum, cadaveribus cor et vasa majora diligentissime examinavi, quin unquam inflammationis vestigium detegere potuerim. Argumentum, quod pro indole inflammatoria hydrophobiae ex effectu venae sectionum hoc in morbo desumitur, nullius est ponderis. Laudes enim his venae sectionibus impertitae, solum credulos in errorem ducere possunt.

63) Ex syphilide saltem pericarditidem chronicam et illius effectus oriri posse testantur observationes LIEUTAUDII (Hist. anatom. med. T. II. Obs. 510—516.), CARCASSONI (*Mémoires de société de méd. A.* 1778. p. 397.), PENADA (*Saggio d'osservazioni medico-pratiche. Padov.* 1793. p. 3.) et TESTA (l. c. p. 88.).

64) Ait TESTA l. c. p. 88. „Selbst das wichtigste Heilmittel der Lustseuche, das Quecksilber, ist nicht ohne Schuld bei Krankheiten des Herzens.“ Cit. PENADA l. c. ASTEURY in the new England Journal of medicine and Surgery. Vol. 8. 1819. — ORFILA

maxime a simultanea actione plurimarum causarum ⁶⁶).

§. XXV.

Toxicologie générale. Paris 1818. 2. édit. (sublimatum).

65) ORFILA I. C. „*L'arsénique agit sur le coeur dont il annéantit la contractilité et dont il enflamme souvent le tissu.*“

66) Pericarditidem nunquam ex una dumtaxat enumeratarum causarum ortam vidi. Causae quae in hoc malo gignendo saepissime societatem ineunt, sunt *nisus, animi pathemata et frigus*. Ex concursu istiusmodi causarum pericarditidis duo exempla observavi post magnum *incendium* Vilnae quod a. 1817. die 23. Septembris v. st. in domo iudaei Zawel locum obtinuit. Pluries indicia pericarditidis inveni post nonnullos dies in iis hominibus, qui ob gravem et repentinum morbum affinium anxie ex longinquo auxilii gratia ad me occurrebant. Frequentissime pericarditides inter *milites* obveniunt, quod illorum constitutioni athleticae vestium angustiae, cursu veloci, violentiis externis, animi pathematibus, scorbuto, psorae, lvi, mercurio, refrigerationi corporis aestuantis, adscribenda est, ut patefecit discipulus quondam meus, medicus Podoliensis, LUKOMSKI in diss. sua de statu et conditione militum morbis cordis gignendis idonea. Vilnae 1815. — Alter discipulorum meorum GEORGIUS PIETROW pulchram dissertationem necdum typis vulgatam a. 1821. de *carditide comitiali* scripsit. Per novemdecim enim annos, quorum curriculo praxin in Lithuania exercui, maxime de morbis huic regioni familiaribus quique ex consuetudinibus et moribus incolarum pullulant, sollicitus fui. Inter illos pericarditidem *comitiis* alligatam observavi. Comitia

§. XXV.

D i a g n o s i s.

Facilis
confusio.1. *Pericarditis* confundi potest (ne dicamus
de

istiusmodi sunt duplicis generis; alia sermone vernaculo vocantur *Kontrakty* alia *Seyniki*. Illa, pecuniam exercendi gratia, haec pro eligendo magistratu ut plurimum hyeme vel vere ingruente locum obtinent. Pro utrisque nobiles Sarmati, habitus laud raro athletici, adsuetique ruri vestiendi rationi climati rigido accommodatae, ad urbes proximas se transferunt. Hic vestes elegantiores minusque ad corpus tuendum idoneas induunt ac propriis negotiis diu noctuque vacare incipiunt. Cum vero haec tum ob defectum hypothecae publicae, tum ob factiones, ab electionibus inseparabiles, saepe spem fallant; alterationes, gravibus animi pathematibus ansam porrigentes, oriuntur. Accedunt epula cum spe curas poculo profligandi. Aestuante tandem corpore domum petitur, ac frigus excipitur. Noctu en horror, calor, sitis, vomitus et dolor pectoris. Famulus judaeus (*Faktor*), medicum proponit (a quo remunerationem pro hoc officio exspectat). Accersitur is, saepe mente iisdem ac aeger negotiis obrutâ. Adscribitur morbus *erroribus in diaeta commissis, ac bili*, exhibiturque emeticum. Nullum ex hoc levamen, immo vespere cuncta exasperantur symptomata, accedente tussi. Declaratur nunc morbus pro febre *catarrhali*, ac regimen commendatur *diapnoicum*. Nox accedit antecedenti pejor ac aeger, maxime anxius, nuntium domum mittendum proponit. Irridetur vano timori, reiteraturque declaratio: morbum nil aliud esse nisi *febrem catarrhalem cum vitio gastrico*. Jamvero vesperi aegri adspectus, virium jactura et sputa cruenta, gra-

de febribus catarrhalibus ⁶⁷⁾ et affectionibus verminosis ⁶⁸⁾), cum peripneumonis latus sinistrum occupantibus ⁶⁹⁾, cum cynanche faucium cumque inflammatione aortae ⁷¹⁾).

2. Peripneumonia.

Pericarditis.

Distinctio

1. Tussis, symptoma sat constans, continuo urget.

1. Tussis saepe nulla, vel per insultus evadit.

^a peripneumonia.

2. Sputa

violem morbum latere demonstrant. Oritur peripneumoniae biliosae suspicio; ob pulsum vero humilem conditionem reformidatur venaesectio, sed obeso thoraci nonnullae hirudines, pinguedinem magis quam sanguinem sugientes, apponuntur. Usui interno inservit sal ammoniacum et ad sputa promovenda sulphur auratum antimonii; doctiores calomel praescribunt. Morbo autem quotidie in pejus ruente convocatur consilium medicorum per quod carditidis saepe jam in hydropem purulentum pericardii conversae praesentia statuitur. Moritur sic haud raro aeger, qui paucos ante dies domum sanissimus reliquerat, cuique quivis longaevitatem spopondisset!

67) Post febres catarrhales interdum morbos chronicos evolvi vidimus, qui clare indicant, sub illarum febrium forma pericarditidem occultam latitasse.

68) Contigit mihi detexisse inflammationem chronicam cordis in Virgine Vilmensi, quae ob nauseam, vomitum matutinum, dolorem epigastrii, tussiculam siccam, screationem frequentem, de vermibus suspecta videbatur.

69) MARCUS (*Ephemeriden* falso contenderat, pericarditidem nullam habere similitudinem cum peripneumoniis. v. DORN l. c.

71) Cap. XIV. §. LVII. N. 1.

Peripneumonia.

2. Sputa aegrum evidenter sublevant.

3. Respiratio laboriosa;

4. Profunda inspiratio haud concessa, dolorifica.

5. Decubitus ob *tussim* impeditus.

6. Anxietas et cordis vibratio dumtaxat in morbo provento occurrit.

7. Vomitus solum ope tussis accidit.

Pericarditis.

2. Sputa sine levamine conspicuo rejiciuntur ⁷²⁾.

3. Respiratio oppressa.

4. Profunda inspiratio concessa, levamen afferens ⁷³⁾.

5. Decubitus ob *anxietatem* impeditus.

6. Anxietas et cordis vibratio in morbo quamvis recente observantur.

7. Vomitus sine tussi.

Illorum morborum complicatio.

3. *Complicantur* vero interdum *peripneumoniae* cum *pericarditide*, quod ex experientia tum aliorum ⁷⁴⁾ tum propria ⁷⁵⁾ comprobatum habemus.

4. Cum

⁷²⁾ RONDELETO jam observante l. c.

⁷³⁾ KREYSIGIO jam observante l. c.

⁷⁴⁾ KREYSIG op. c. 2. Th. p. 229. — DAVIS l. c. p. 48. 53. — SMERDON in the *London medical and physical Journal published by FOTHERGILL. Vol. XLVI. 1821. Decemb.*

⁷⁵⁾ In plurimis cadaveribus notas inflammatorias tum in pleuris et pulmonibus, tum in pericardio et corde observavi. Et sequens casus complicationem *peripneumoniae* cum *pericarditide* exhibere videtur. Vir 30.

4. Cum *pericarditis* haud raro deglutitionis ^{Distinctio}
diffi-^{a cynanche}
faucium.

annorum, corpore firmo praeditus, antea sanus, die 9. Martii 1822. sub temperie humida frigidaque, grave onus portabat, quo sub opere, quamvis leviter vestitus, valdopere aestuabat. Accidit simul quod cum in viam angustam urbis Vilnae intrasset, currus, ab equis fugam tentantibus, tractus, illum a tergo prosequeretur. Vehementer terrfactus domum petiit, ubi parum post correptus est a frigore, subsequentibus calore et siti, quam aeger ope aquae frigidae incassum extinguere tentaverat. Acelebant anxietas, palpitatio cordis, sensus lipothymiae imminens, visus obnubilatus et viridescens, dolores pectoris, respirandi difficultas et tussis cum sputis cruentis. Secunda huius morbi die aeger ad clinicum medicum deportatur, exhibens faciem ruberrimam, tussim continuam quidem sed per accessus suffocationis periculum minitantem, anxietatem tantam ut continuo sese undique jactaret, manusque modo capiti modo pectori admo-veret, pulsationem magnam cordis, regionis epigastriacae et carotidum, decubitum in latus dextrum dumtaxat concessum, respirationem difficilem et plane abdominalem, loquelam intersectam, pulsum vibrantem, contractum, parvum, irregularem ad 125. ictus in sexagesima horae parte. Conquerebatur aeger de pondere sub sternum, de doloribus lateris sinistri thoracis, de cruciatibus artuum, de sensu caloris et frigoris et de mortis angore. Revera adspectus erat hominis suffocaturi. Medicus adiensens Instituti Clinici morbum pro *peripneumonia*, nonnulli autem commilitonum pro *pericarditide* declararunt; quam diagnoseos differentiam, morbum pro *carditide ac pneumonia* definiendo, conciliavi. Tres venaesectiones, copiosae

difficultatem sociam habeat, cum *cynanche* confusa fuit ⁷⁶). Inspectio faucium ab hoc errore tuetur. Atvero non reticendum et pericarditidem cum *cynanche* faucium *complicari* posse ⁷⁷).

Sedes pericarditidis.

5. Stabilita pericarditidis praesentia, in *se-dem morbi* propius, saltem conjecturando, inquire

rere

cucurbitulae scarificantes et hirudines (quorum auxiliorum ope quadraginta quatuor cruoris unciae detractae fuere) nitrum, digitalis ac reliquum regimen antiphlogisticum nec non vesicatorium ad pectus, impetum fregerunt morbi, cui die septimo sudor universalis ita finem imposuit, ut aeger sanitati restitutus Clinicum jam d. 23. Martii derelinquere potuerit.

76) Narrat PORTAL (*Mém. de l'académie des sciences Année 1780.* p. 333.) de femina nobili, quae magna deglutitionis difficultate laborabat, vocemque habebat singulariter immutatam; nunc enim acutissima fiebat, nunc profundissima, nunc suppressa. Cum simul febre acutissima laboraret, credebatur *cynanche* correptam esse. Post mortem, organa deglutitionis atque vocis naturaliter erant constituta, magna vero inflammatio detecta est ad pericardium, eo in loco, ad quem numerosos ramos accipit ex nervis recurrentibus. Cfr. TESTA l. c. p. 238.

77) Legi merentur: TESTA (l. c. p. 237.), KREYSIG op. c. 1. Th. p. 369.: „*ich bemerke hier nur, dass Entzündungen des Herzens und der grossen Gefäße nicht selten mit einer Bräune sich verbinden.*“ Cfr. HUFELAND'S *Journal der prakt. Heilkunde.* 31. B. 1. St. p. 142. — Notari meretur jam in libris HIPPOCRATIS (*Epidem.* VII. N. 30.) de connubio *cynanches* cum pericarditide mentionem fieri.

rere juvabit. Potest enim detinere inflammatio modo *pericardium*, modo *substantiam muscularem cordis*, modo illius *cavitates* (ne dicamus de *arteriis coronariis* ⁷⁸⁾) modo *plures vel omnes partes simul*.

6. Conjicimus *inflammationem pericardii* ^{Inflam-}
 (*pericarditis* proprie dicta, *pleuritis pericardii* ⁷⁹⁾) ^{tio peri-}
 aut saltem illam *mediastini anterioris* ⁸⁰⁾, adesse,
 si morbus, sub forma pleuritidis obveniens, sti-
 patur dolore sub sterno, inconsuetâ anxietate et
 jactatione, facie a statu sano valde aberrante,
 gena sinistra rubente ⁸¹⁾, pulsu vacillante, irre-
 gulari ⁸²⁾, aut magno quoddam symptomate alias
 a pleuritide alieno. Conjecturae probabilitas auge-
 tur, si morbus febrem rheumaticam aut exanthe-
 maticam sociam agnoscat, si ille ex impetigine
 praepostere fugatâ ⁸³⁾, vel ex ictu cordis regioni
 illato ⁸⁴⁾, originem trahat sique puerperam de-
 tineat.

78) Et illas inflammari posse et quidem maxime culpa
 arthritidis infra ex Cap. XI. §. XLI. N. 6. elucebit.

Interea lege KREYSIG Op. c. 2. Th. p. 141.

79) SAUVAGES Nosol. method. Cl. III. 13. 4.

80) KREYSIG l. c. 2. Th. p. 122.

81) CORVISART l. c. p. 16.

82) „qui caractérise principalement la pericardite aiguë.“

CORVISART l. c. p. 8.

83) „cette affection (la pericardite) ne paroît pas recon-
 naître d'autres causes que celles qui donnent naissance à
 l'inflammation dans les membranes analogues.“ COR-
 VISART l. c. p. 4.

84) CORVISART l. c. p. 17.

Frank Prax. II. 2. 2.

tineat. Quo magis allata urgent symptomata, eo magis ad inflammationem partis illius pericardii, quae ipsam superficiem externam cordis ambit, concludere licet.

Infl. sub-
stantiae
muscula-
ris.

7. Arguimus *inflammationem substantiae muscularis cordis* (*Phlegmasia cordis* ⁸⁴), si inflammatio pericardii, neglecta aut male curata fuerit ⁸⁵; si sub curriculo morbi, alii muscoli vel et articuli affecti fuerint ⁸⁶; si symptomata febris inflammatoriae praesto sint; si morbus ex nisu in ponderibus elevandis, portandis, ac vulneribus profunde in thoracem penetrantibus ortus sit; si ipsa cordis regio doleat motusque abnormis

84) DANIEL Systema aegritudinum p. 111.

85) „*Les membranes sereuses sont en général si intimement unies aux organes qu'elles recouvrent, que leurs affections intéressent presque toujours les tissus de ces organes eux-mêmes, et réciproquement. En effet, la péripneumonie ou l'inflammation de la pleure pulmonaire existe-t-elle jusqu'à sa terminaison, sans que la substance ou les différens tissus du poumon ne participent plus ou moins de l'inflammation?*“ CORVISART l. l. p. 237.

86) De nexu carditidis cum rheumatismo a mea experientia omnino confirmato, Lege BAILLIE op. c. (praecunte DAVID PITCAIRN), — ODIER Manuel de méd. pratique 1803. — DAVID DUNDA Transactions of the medical and surgical Society of London. — The Edinburgh medical Journal 1806. Octobre. — WELL'S Transactions of a Society for the improvement of medical and surgical Knowledge. Lond. 1812. Vol. III. p. 373 — 424.

mis in parte affecta, ab aegro, aut ab aliis percipiatur; si angustiae et jactationes summopere urgeant; si sputa sint cruenta, sique pulsus irregularis, oedema faciei et lipothymiae obveniant.

8. Suspicamur *inflammationem cavitatum* ^{Infl. cavitatum.} *cordis* dum symptomata generalia pericarditidis acmen attigerunt, dum aeger antrorsum flexo corpore decumbit, aut sub summis angustiis se undique jactat, dum respirandi difficultas maxima est, dum sub cordis motu conspicuo, pulsus irregularis, formicans, intermittens observatur, dumque vomitus, suffocationis periculum et lipothymiae continuo saeviunt. Cum observationes FANTONII ⁸⁷⁾, HARDERI ⁸⁸⁾, SEVERINI ⁸⁹⁾, PIS-
SINI ⁹⁰⁾, WICHDIANNI ⁹¹⁾, THOMANNI ⁹²⁾, TESTA ⁹³⁾ et praecipue HUXHAMI ⁹⁴⁾ doceant, hac

K 2 sub

87) Observ. anatom. med. p. 22.

88) Observ. anat. practicae in BONETTI Sepulchreto anat. T. I. L. 2. Sect. 7. Obs. 24. p. 789.

89) De noviss. observ. absces. Cap. 2. p. 280.

90) De cordis polypo; vide opus PASTA infra (Cap. X. §. XXXVI. N. 2 (46)).

91) *Ideen zur Diagnostik*. p. 192.

92) *Annales Instituti Clinici Würzburgensis*. T. II. p. 92.

93) Op. c. p. 299.

94) *Opera physico-medica curante REICHEL*. Lips. 1764. T. III. p. 50.: „Tempestate maxime sicca frigidaque mensis februarii et martii praeterlapsi, nautarum varii navicus bellicis, quibus nomen DEPTFORD et DUN-

sub rerum positione saepe *pseudomembranas* in cavitatibus cordis exstare; KREXSIG huic morbo, nomen *carditidis polyposae* meritissime imposuit, illiusque cum *croup* similitudinem patefecit⁹⁵).

Signa

KIRK, ab India occidentali advecti, tussi brevi, importuno asthmatico absque ulla excretionem afficiebantur. Aderat violenta et fere continua cordis palpitatio, cum perpetuo intermittente tremulo, fornicante pulsu et perpetua anxietate, dolore et cordis lapsu (*sinking of the heart*) prouti appellabant. Spiritum maxime cum difficultate trahebant, et vix lectulo jacere absque suffocatione poterant. Humeris quasi innitebantur capita et facies erat pallida et tristis. — Lateris dolore affligebantur nonnulli, licet vix ulla appareret febris. — Plusquam viginti homines tali modo versus mensis martii finem brevi temporis spatio e vivis tollebantur. — Quo facto, ut bina mortuorum, quadraginta circiter annorum cadavera mox dissecarentur, imperabat D. WYATT; quorum quolibet in corde, *polypos* reperiens *monstruosos* ea directe propriam in domum reportabat. Non carneis solum columnis cordis firmiter adhaerebant, sed usque ad intercolumnia quoque vel sulcos progredientes his non minus quam ipso ventriculorum fundo fortiter inserebantur. “

- 95) Op. c. 2. Th. p. 140.: „*Sehr grofs ist die Analogie der polypösen Herzentzündung mit der polypösen Bräune.*“ Cfr. P. II. Vol. II. Sect. I. Cap. III. §. XII. N. 9. Interim jam dudum PAXTHERUS simile quid suspicatus est, uti ex verbis Dr. PARRY (*Inquiry into the symptoms and causes of the syncope anginosa. Bath 1799. p. 136.*) elucet: „Dr. JENNER also thought so, when, in the case of Mr. BELLAMY, he saw a hard

Signa inflammationis arteriarum coronariarum cordis indicare nequimus. *Suspicio* hujus morbi haberi posset, si symptomata inflammationis cavitatum cordis in arthritico cum nonnullis signis angoris pectoris ⁹⁶⁾ obvenirent.

9. Ne nimis de facultate sedem peculiarem *Monitum*. pericarditidis arguendi gloriemur, a periculo enim pericarditidem ipsam non dignoscendi, continuo circumdamur. Sic uno ore testantur scriptores de *pericarditide occulta* seu *larvata* ⁹⁷⁾, saepe *chronica* et cum aliis morbis e. c. pleuropneumonia ⁹⁸⁾, diaphragmitide ⁹⁹⁾, hydrothorace, a quibus obfuscatur, *complicata*.

10. Symptomatibus et caussis pericarditidis ^{De pericarditidis} probe indole.

tubular crust not unlike coagulated lymph and which Mr. PAYTHERUS compares to the secretion attached to the trachea in the croup, lining the cavity of coronary arteries degenerated into a sort of cartilage."

96) Cap. XI. §. XLVII. N. 3.

97) KREYSIG Op. c. 2. Th. p. 127. „*Schleichende, versteckte, meist complicirte Entzündung des Herzens.*"

CORVISART l. c. p. 25. „*Des diverses complications, de l'intrusion souvent insensible de cette espèce de pericardite, de sa marche cachée, dans beaucoup de cas, nait une difficulté souvent insurmontable, dans le diagnostic de cette inflammation.*"

98) CORVISART l. c. p. 7. „*L'observation prouve que la pleuropneumonie en est la complication la plus fréquente.*"

99) Idem, ib.

probe inter se comparatis, inveniemus hunc morbum, pro re nata, esse indolis *traumaticae, inflammatoriae, rheumaticae, metastaticae et arthriticae*. Pullulatne ille aliarum inflammationum instar vel ex affectione *gastrica*? Inquirendum quoque foret, num pericarditis interdum non occultatur sub forma *febrium intermittentium perniciosarum*, quas *syncopticas* vocant.

Distinctio necessaria. 11. Postremo diversa est pericarditis prout illa aut in homine alias sano, aut in valetudinario, forte prius vitio cordis chronico subjecto, locum obtinuit ¹⁰⁰).

§. XXVI.

P r o g n o s i s.

- Generatim. 1. Utrumque sit, pericarditis semper, morbum aleae plenum sistit.
- Varii exitus. 2. Nisi enim *resolvatur*, dum illa vehemens est et acuta, morte praecipiti terminatur, et dum mitis est et lenta, *morbis chronicis*, ipsa morte peioribus, nimirum *symphysis cardiacaе, hydrocardiaе, polypo, lithiasi, volumini aucto, imminuto, dilatationi et angustationi cavitatum*, ortum praebet ¹).
- Resolutio. 3. Si perpendamus pleurae inflammationem sat

¹⁰⁰) Lege de hoc argumento KREYSIG op. c. 2. Th. p. 204. 186.

¹) Horum morborum doctrina mox in tot capitibus specialibus exponetur.

sat secure profligari, graviusque vulnera ipsius cordis substantia mirifice sustineri²⁾; — de *resolutione*

- 2) De globo sclopetario in substantia cordis latente, legatur PENADA *Osservazione medico-anatomica sopra un ulcere corrodente e profondo riscontrato nel cuore di un cadavere anatomizzato l'an. 1783. in Saggi di Padova. Vol. III. P. II. p. 59.* v. WEIGEL's *Ital. med. Bibl.* 3. B. 1. St. p. 10. — De cicatricibus cordis exstat observatio in Act. Lips. A. 1705. — De vulneribus cordis vero lethalibus narrant BARTHOLINUS hist. Anat. Cent. I. Hist. 77. T. I. p. 127. — Miscell. Nat. Cur. Dec. III. a. 3. Append. p. 2. — in TULPIUS Observ. med. Lib. III. Cap. 18. p. 125. — BONETUS Sepulchr. anat. Lib. IV. Sect. 3. Obs. 23. — DIEMERBROECK Anat. Lib. II. Cap. 6. — LIEUTAUD hist. anat. Lib. II. Sect. II. Obs. 607—609. T. II. p. 188. — BLANCARD anat. rar. Cent. I. Obs. 26. p. 66. — MORGAGNI Epist. LIII. 3. — ZITTMANN medicina forensis. d. c. geöffnete zur Med. u. Chir. anweisende Aussprüche u. Responsen der Facultät zu Leipzig. Frankf. 1706. Cent. III. Cas. 59. — AMMANN medicina critica. Stad. 1677. Cent. I. hist. 8. — Journ. de méd. T. XLVI et XLVIII. N. 243. — TRILLER de mirando cordis vulneri post 14. diem demum lethali. Wittemb. 1775. et SCHLEGEL Coll. disp. ad med. forens. spectant. Vol. 5. N. 36. — DANIEL Samml. med. Beobachtungen. Leipz. 1776. p. 297. Anmerk. 41. — MEYER in BALDINGER's Neuem Magaz. 4. B. 2. St. p. 105. — TICHNER Beiträge zur prakt. u. gerichtl. Arzneykunde. 1. B. N. 6. THOMASSEN in HUFELAND's Annalen der Franz. A. W. I. B. p. 301. — BOHN de renunciatione vulnerum. Lips. 1711. — FOURCROY la médecine éclairée par les sciences de chimie etc. T. 2. p.

lutione pericarditidis, in homine caeterum sano nidulantis atque mature riteque curatae, haud facile desperabimus. Resolutionis indicia sunt, levamen conspicuum et promptum a methodo medendi et solitae crises. Haec fieri solent inprimis per haemorrhagias conspicuas narium, ani, uteri, — per sudorem universalem, cuncta symptomata, potissimum autem pulsum conditionem, emendantem, per restitutionem exanthematum praepostere fugatarum et per somnum reficientem.

Mors praeceps.

4. *Mors praeceps* adscribenda est, *hydropi acuto purulento pericardii*, — *pseudomembranis orificia vasorum occludentibus et gangraenae*.

Hydrops acutus purulentus.

5. *Hydrops acutus purulentus pericardii* maxime expectatur ex pleuritide rheumatica pericardii, inprimis si aeger fuerit juvenis et morbus neglectus aut male curatus. Indicia ingruentis extravasati sunt, inefficientia methodi antiphlogisticae, urina pauca, oppressio pectoris a motu aucta, sensus ponderis e regione cordis ad epigastrium et diaphragma extensus, motus cordis irregularis, pulsus parvus, celer, intermittens, oedema faciei vel extremitatum inferiorum et somnolentia.

6. Mors

92. — FUGG *The Edinburgh med. and surgical Journal* 1818. *April.* et HUFELAND's *Journal*. 1819. *Jan.* p. 65. (Miles globum sclopetarium in Hispania die 16. Januarii 1809. accepit ac in Anglia die 30. ejusdem mensis obiit).

6. Mors ex *pseudomembranis* orificia vasorum occludentibus, in pericarditide, *cavitates* ^{Pseudo-membranae.} *cordis detinente* ⁴⁾, timenda est, dum lipothymiae, extremitatum frigus, facies hippocratica, summaeque angustiae obveniunt.

7. *Sphacelus cordis*, a tot observationibus ^{Gangrae-} confirmatus ⁵⁾ vix permittit ut de exitu pericarditidis in *gangraenam* dubitemus ⁷⁾. Praeter generalia gangraenae signa ⁸⁾, alia, pericarditidi propria, indicare nequimus.

§. XXVII.

C u r a.

1. Cum pericarditis, etiamsi mitis sit et ^{Prophylaxis.} lente decurrat, vitae tamen insidias struat, hinc quoties caussae illam excitantes, praecipue violentiae externae regioni cordis infensae, nixus et animi pathemata, locum obtinuerint, evolutioni gravioris morbi sine temporis jactura occurrendum est; quod fit *venae sectione* e brachio sinistro, *hirudinibus* lateri thoracis sinistro apposis, *potione nitrata*, *clysteribus antiphlogisticis*, *decubitu*.

4) §. XXV. N. 8.

6) §. XXIII. N. 2 (1).

7) Ait tamen CORVISART (l. c. p. 253.): „J'ajoute même, que je ne conçois pas aucun fait bien avéré de la gangrène du coeur, née immédiatement du carditis aigu et manifesté.“

8) P. I. Vol. I. Append. §. LXXVIII. N. 12.

cubitu corporis supino, diaeta severâ et quiete animi.

C. morbi. 2. Nec alia ad ipsam pericarditidem curandam auxilia requiri solent. *Venâe sectio*, quo maturius instituitur, eo certius juvat. Ne ab illa pulsuum irregularis conditio, aut virium apparens lapsus, absterreant! Nec credendum *unam* venae sectionem tantum abigere posse morbum. Interea ne quid nimis! Nisi enim vehementer fallimur, pericarditis tot phlebotomias quot peripneumoniae neutiquam perfert. Injecto hinc morbo nostro ope venae sectionum freno, illico ad *hirudines* deveniendum. Debent vero copiosae inter ipsa costarum interstitia, prope cor, applicari, ac pro re nata repeti. Aegrotantibus robustis, praeterea *cucurbitulae scarificantes* super sternum ponuntur. Usui interno solutio *nitratis* in aqua vel simplici, vel rubi idaei, cum syrupo ejusdem vel in *decocto tamarindorum*, non neglectis necessariis *clysteribus antiphlogisticis*, inservit. Vigente exacerbatione cruribus *sinapismi* admoventur. Nec *pediluvia acria*, praesertim si morbus fuerit arthriticus, hinc spernuntur. *Potui*, aqua syrupo vegetabili subacidulo mixta, modicae temperaturae, parvis ac repetitis haustibus sumenda inservit. *Cibi*, excepto juscule avenaceo, non requiruntur. Fracto sic morbi impetu (praecipue respectu affectionis cordis), feбри, ad criseos opus perficiendum, temporis quid conce-

concedendum. Praeceptum hoc, inprimis in pericarditide morbo cordis chronico juncta, magni ponderis est. Quodsi autem res in pejus rueret, viriumque realis lapsus ulteriori detractioni sanguinis obstaret, aut signa ingruentis hydropis purulenti acuti pericardii, methodo antiphlogisticae rebellis, obvenirent, *infusum foliorum digitalis purpureae* propinandum. Si vel hoc pharmacum per nychthemera unum alterumve adhibitum effectum destitueretur, nisi aegri constitutio usum mercurii impediatur, quid *calomel* ¹¹⁾ valeat, tentandum. Alternatim decoctum radicum aut *lapathi acuti* aut *vinetoxici* ¹²⁾, aut, quod nobis maxime ad urinae secretionem promovendam arridet, *stipitum solani dulcamarae* exhibendum. Miraculose interdum agit *vesicatorium* amplum sterno admotum, inprimis si pericarditis fuerit rheumatica, arthritica, metastatica. Virium extremo lapsui, *moschum* ¹³⁾ seu potius *auram* sic dictam *camphorata* a *nitro* temperatam ¹⁴⁾ opponimus.

CAPUT

11) Omni bihorio ad granum unum.

12) KREYSIG l. c. 2. Th. p. 193.

13) KREYSIG l. c. p. 195.

14) R. Camphorae rarae granum unum. Nitri puri scrupulum unum. Mucilaginis gummi arabici, syrupi althaeae aa unciam unam. Misce, affunde aquae fortis uncias decem. D. S. omni hora cochleare unum majus.

CAPUT VIII.

De symphysi cardiaca.

§. XXVIII.

Definitio. Literatura.

Definitio. 1. **N**omine *symphyseos cardiaca* illum designamus pericarditidis effectum, qui in *adhaesione pericardii cum corde* consistit morbumque constituit dyspnoeâ, oppressione pectoris, dolore et pulsatione epigastrii, pulsu frequente, parvo, irregulari et proclivitate ad hydropem insignitum.

Literatura. 2. De hoc morbo legendi sunt: BARTHOLINUS¹⁾, STALPARTUS VAN DER WIEL²⁾, RUYSCH³⁾, BRUNNER⁴⁾, VIEUSSENS⁵⁾, SENAC⁶⁾, WESZPREMI⁷⁾, PFANN⁸⁾,

1) Epist. III. p. 401.

2) Observ. Chirurg. Cent. I. Obs. 36. p. 147.

3) Thesaur. Anat. VI. 36. Nota X.

4) Praes. BARBECK Diss. de corde occulto.

5) Op. c.

6) Op. c. p. 338.

7) Observationes medicae. Traj. 1756. in HALLERI Coll. disput. ad historiam et curationem morborum facient. T. 6. p. 803.

PFANN ⁸⁾, HALLER ⁹⁾, MORGAGNI ¹⁰⁾, MECKEL ¹¹⁾,
 LIEUTAUD ¹²⁾, HEISTER ¹³⁾, CHAMBEON DE MON-
 TAUX ¹⁴⁾, POHL ¹⁵⁾, AURIVILLIUS ¹⁶⁾, BANG ¹⁷⁾,
 HAEN ¹⁸⁾, NEBEL ¹⁹⁾, WALTER ²⁰⁾, SANDIFORT ²¹⁾,
 FERRIAR ²²⁾, WAUCH ²³⁾, OGLE ²⁴⁾, WALLS ²⁵⁾,
 SANDER ²⁶⁾ aliique ²⁷⁾.

§. XXIX.

- 8) *Sammlung verschied. merkwürdiger Fälle aus d. gerichtl. u. prakt. Medizin.* 1750. p. 154.
- 9) *Elem. physiol. T. I. p. 56. — de corp. humani fabrica. Lib. IV. Sect. I. §. 22.*
- 10) *Op. c. Epist. XXIII. T. 17 et 18.*
- 11) *Mém. de l'acad. des sciences de Berlin* 1755. p. 56.
- 12) *Hist. anat. Lib. II. Sect. III. Obs. 695. T. II. p. 217.*
- 13) *Diss. observ. med. miscell. Helmstädt 1730. — Med. chir. Wahrnehmungen. 2. B. p. 136.*
- 14) *Merkwürdige Krankengeschichten u. Leichenöffnungen. Beob. 191. p. 548.*
- 15) *Progr. de pericardio cordi adhaerente ejusdem motum perturbante. Lips. 1775.*
- 16) *Nova Acta Societ. Scient. Upsal. 1773. Vol. I. p. 101.*
- 17) *Act. Reg. Soc. Havniens. Vol. II. p. 77. Vol. III. p. 135.*
- 18) *Rad. med. P. II. p. 113.*
- 19) *Progr. de pericardio cum corde concreto. Giess. 1778.*
- 20) *Mémoires de l'acad. R. de sciences de Berlin* 1785. T. IV. p. 57.
- 21) *Observ. Anat. patholog. Lib. I. Cap. II. p. 43.*
- 22) *Neue Bemerkungen p. 77. 1. Fall.*
- 23) *Edinb. Versuche u. Bemerk. 2. B. N. 22.*
- 24) *Memoirs of the med. Society of London.*
- 25) *Transactions of a Society for the improvement of med.*

§. XXIX.

*Autopsia cadaverum. Symptomata.*Autopsia
cadave-
rum.

1. *Universum cor* tam arcte cum pericardio concretum, ut unum inde corpus efficeretur, utque separatio sine laceratione fieri haud potuerit, cum aliis ²⁸⁾ vidimus. Saepe adhaesio pericardii dumtaxat *partialis* est, e. c. ad longitudinem et latitudinem digiti transversi ²⁹⁾, cum cordis ventriculo aut dextro ^{*)}, aut sinistro ³⁰⁾, cum

and surgical Knowledge. Vol. III. Lond. 1812. p. 373.

26) V. HUFELAND'S *Journal d. pr. Heilk.* 1820. *Novemb.* p. 19.

27) *Hist. de l'acad. R. des sciences de Paris.* 1712. p. 47. — *Commerc. Lit. Norimb.* 1735. p. 60. 1743. p. 39. — L'EVEILLÉ in *rapport général des travaux de la Société philomatique à Paris. Vol. I.* p. 145. — KNAW in *Nov. Comment. Petrop. I.* p. 361. *Acta N. Cur. Vol. VI. Obs. 6. 3.* — SOEEMMERRING zu BAILLIE p. 4. *Anmerk. 8.* — VOIGTEL *Handb. der pathol. Anatomie 2. Th.* p. 210. — CORVISART *Op. c.* p. 30. — TESTA l. c. p. 121. — BURNS l. c. p. 301. — KREYSIG l. c. 1. *Th.* p. 281. 2. *Th.* p. 616.

28) BRUNNER, HEISTER, WESZPREMI, SENAC, PFANN, MORGAGNI, HAEN, SOEEMMERRING, SANDIFORT, CORVISART etc.

29) MORGAGNI *Epist. LVI.* 12. Cfr. *Epist. XXV.* 15. *Ep. LIII.* 29. *Ep. LXII.* 5.

*) *Misc. Nat. Cur. Dec. III. A. 5 et 6. Obs. 207.*

30) *Fränkische Sammlung. 4. B.* p. 248.

cum apice cordis ³¹⁾. Nonnunquam illa per textum retiformem ³²⁾, per fila ³³⁾ et ligamenta ³⁴⁾, interdum veluti cornea ³⁵⁾ efficitur. Dum adhaesio *non* est universalis, spatia libera, aut fundus pericardii, plerumque lymphâ coagulabili repletâ sunt. Talis lymphâ et cavitates pleurae nonnunquam occupat ³⁶⁾. Reperiebantur porro in cadaveribus symphysin cardiacam exhibentibus, venae cavae cruore turgidae et dilatatae ³⁷⁾, sanguis fluidus ³⁸⁾, saepissime vero cor volumine auctum ³⁹⁾.

2. Aegri conquesti erant de dyspnoea ⁴⁰⁾ (in-Symptomata.
primis dum aut gressum instituebant, aut positionem corporis supinam cum alia commutabant ⁴¹⁾) de pectoris pondere, oppressione, distensione ⁴²⁾
et

31) HALLER l. c.

32) MORGAGNI Epist. XXXV. 12. — Cfr. Ep. XVIII. 25.
Ep. LVI. 12. Ep. XXXVIII. 23. VOIGTEL l. c. p. 317.
(Ex Museo MECKELII).

33) Miscel. N. Cur. Dec. III. A. 2. Obs. 78. Schol.
SENAC.

34) VALSALVA apud VOIGTEL l. c. p. 216.

35) SENAC l. c.

36) SOEMMERRING l. c.

37) CORVISART l. c. p. 34.

38) Idem ib.

39) SANDER l. c.

40) Vera orthopnoea apud CORVISART l. c. p. 37.

41) CORVISART l. c. p. 33.

42) „Le malade éprouve aussi un sentiment pénible de tiraillement dans la région du coeur, parceque dans l'acte

et constrictione ⁴³⁾ de impotentia sermocinationi protractae indulgendi, de sensu pulsationis in thorace sinistro, modo tremulae ⁴⁴⁾, debilis ⁴⁵⁾, modo concutientis et vehementis ⁴⁶⁾, deque dolore

de la respiration le diaphragme entraine, dans son abaissement, le pericarde et tout le coeur qui lui est devenu adhérent, et s'oppose, dans ce tems de son action au mouvement particulier d'élevation propre du coeur lors de ses contractions." CORVISART l. c. p. 35.

43) CORVISART l. c. p. 37.

44) SENAC l. c.

45) CORVISART l. c. p. 53.

46) *Abhandl. f. pr. Aerzte.* 20. B. p. 336. — SELLE *Beiträge z. prakt. Arzneiwissensch.* 2. Th. p. 26. — MECKEL l. c. TESTA l. c. p. 123. — FERRIAR l. c. — WAUCH. Apparet ex dictis symphysin cardiacam pulsatione modo debili modo vehemente stipari. Quae ritur vero nunc quo modo cor, pericardio adhaerens, contractiones alternas, quae *palpitationem* efficiunt, perficere possit. Dum adhaesio universalis est, aut cor praecipue ad basin ligamentorum ope pericardii jungitur, *palpitationem* locum habere non posse asserunt MORGAGNI (Epist. XXIII. 17. 18. 20. 21. 29.), SENAC (l. c. p. 341.) et CORVISART (l. c. p. 36.) qui ait: „*Les palpitations en effet doivent être considérées comme de mouvemens désordonnés, insolites et plus ou moins violens et tumultueux du coeur: or, comment cet organe, fixé médiatement au diaphragme par son enveloppe, pourroit il exécuter ces mouvemens étendus, si son déplacement étoit rendu impossible par ces adhérences avec elle? Les contractions du coeur sont dans ces cas promptes et dereglées, mais sourdes et profondes, petites et obscures et comme avortées.*“

dolore ad epigastrium ab assumptis cibis aucto. Observabantur praeterea pulsus frequens *), celer, parvus, saepe irregularis 47), contractus 48), intermittens 49), — pulsatio thoracis sinistri (ad carotides propagata) et regionis epigastricae 50), —
oscil-

Cum vero motus vehementes cordis in symphysis cardiaca aliquando observare contingat, KREYSIG (l. c. 1. Th. p. 281.) praeunte SALIO DIVERSO difficultatem solvere conatur, palpitationem distinguendo a *pulsationibus* (*gewaltsames Schlagen in der Brust*) ortis ex conatu cordis, obstacula illud circumdantia vincendi. Arridet haec explicatio dum agitur de adhaesione *partiali* unde SENAC (l. c. p. 343.): „*mais ces attaches étoient à la partie supérieure du coeur, cet organe pouvait s'approcher des côtés et s'en éloigner alternativement.*“ Quod si vero Cl. Vir contendat (2. Th. p. 623.) motum cordis aut aortae, majori *pulsatione* stipatam, quam symphysin cardiacam *non* dari, in gravissimum errorem incidit. Inter multa enim symphyseos cardiaca exempla a me visa rarissime cordis palpitationem magnam observavi, et ubi haec animadvertebatur, latebant alii adhuc morbi illam efficientes, inprimis dilatatio cordis. Concludo hinc nec palpitationem nec pulsationem *cordis* ad essentialia symphyseos cardiaca pertinere signa; quamobrem de illis in definitione sermonem non institui.

*) SENAC (ad 130.) saepius inter 110. et 120.

47) Pulsum non semper irregularem esse cum CORVISARTIO (l. c. p. 37.) observavi.

48) SENAC l. c.

49) SENAC l. c.

50) BURNS ait: „*Der mit dem Herzen fest verwachsene Herzbeutel legt sich bei der Systole der Kammer in Fal-*

Frank Prax. II. 2. 2.

L.

oscillatio venarum jugularium⁵¹⁾, — sonus obscurus, percutiendo lege artis pectus sinistrum⁵²⁾, — sibilus sub cordis systole⁵³⁾, — excavatio hypochondrii sinistri⁵⁴⁾ sub ascensu diaphragmatis, — erubescencia frequens, — facies tumidula, apex nasi ruber et genae vasis varicosis, notatae⁵⁵⁾, — fluctuatio abdominis⁵⁶⁾, oedema⁵⁷⁾)
crurum.

ten, und zieht dabei das Zwerchfell und somit auch die Leber nach oben. Wenn hierauf die blutleer gewordenen Kammern sich wieder ausdehnen, senkt sich auch die Leber und das Zwerchfell wieder herab; und diese Bewegung fühlt dann die auf der epigastrischen Gegend liegende Hand als Pulsation.“

51) LANCISI V. SENAC l. c. p. 340.

52) Constanter observavi. CORVISART l. c. p. 33. (*le côté gauche de la poitrine ne sonnait pas du tout*).

53) KREYSIG op. c. 2. Th. p. 623. (*Hoc symptoma non videtur immediate ad symphysin cardiacam spectare*).

54) HEIM apud KREYSIG l. c.: „*Betrachtet man den Thorax, so sieht man, daß derselbe nicht nur bei jeder Systole des Herzens gewaltsam erschüttelt und gleichsam aufwärts geschnellt wird, sondern man bemerkt auch gleichzeitig allemal eine Vertiefung unter den Rippen der linken Seite entstehen, gleichsam ein Loch hineinfallen.*“ (*Fateor me hucusque ad hoc signum non attendisse*).

55) *Les joues devinrent violettes et vergetées.* CORVISART l. c. p. 37. (*Conditio haec faciei omni attentione digna est*).

56) CORVISART l. c. p. 33. (*Pluries observavi*).

57) Nullus cordis morbus majorem proclivitatem ad hydropem manifestat, quam symphysis cardiaca.

crurum et scroti ⁵⁸⁾, sudores, — extremitates frigore marmoreo detentae ⁵⁹⁾, lividae, suffocationis insultus ⁶⁰⁾, lipothymiae ⁶¹⁾, dejectio animi ⁶²⁾, et proclivitas ad suicidium ⁶³⁾. Sunt praeterea qui a tussi et haemoptysi excruciantur ⁶⁴⁾.

§. XXX.

D i a g n o s i s.

1. Signis allatis eo magis fidendum, quo ^{Illius fontes.} magis sustententur ab anamnesticis, a praegressa scilicet pericarditide, imprimis rheumatica ⁶⁵⁾ et

L 2

chro-

58) Gangraenam scroti observavit LANCISI V. SENAC l. c. p. 340.

59) SENAC l. c.

60) SENAC l. c.

61) SENAC l. c.

62) Melancholia SENAC l. c.

63) KREYSIG l. c. p. 625. Et CORVISARTII aeger sese veneni ope interfecit. Interea prudenter ait Cl. Vir: „j'ai fréquemment rencontré ces adhérences, dans tous les degrés possibles, chés des individus, qui de leur vivant n'avoient jamais été atteints de cette mélancholia qui porte à se détruire.“ l. c. p. 41.

64) VALSALVA l. c. MORGAGNI Epist. XXII. 4. 10. AURIVILLIUS l. c. (Saepe etiam observavi).

65) Accedo ad CORVISART (l. c. p. 31.) dicentem: „Je suis tenté de regarder entre autres, comme cause fréquente de cette adhérence, les affections rhumatisantes et goutteuses.“

chronica ⁶⁶⁾, in aetatem juvenilem ⁶⁷⁾ incidente, neglecta aut male curata.

Facilis
confusio. 2. Interea memores esse juvabit *facilis confusio-
fusionis symphyseos cardiaca* cum *pericarditide
chronica*, cum *aliis vitiis pericardii*, cum *adipe*
et *tumoribus cor extrinsecus occupantibus*, *com-
primentibus* et *e loco removentibus*, cum *hydro-
pe pericardii purulento*, cumque *dilatatione cor-
dis*. Item memores esse juvabit *complicationis
reciprocae istiusmodi morborum* ⁶⁸⁾.

Distinctio
a pericar-
ditide
chronica. 3. A *pericarditide chronica*, symphysis car-
diaca, vix aliter distingui potest, nisi praemisso
tentamine curationis, quod nisi succedat, pro-
babilitas adhaesionis pericardii cum corde magis
magisque crescit, et vice versa.

Distinctio
ab aliis vi- 4. Cum praeterea ex pericarditide et *peri-
cardii*

66) Dum pericarditis *acute* flagrat, potius hydropem
purulentum pericardii, quam symphysin, expecto,
quod jam CORVISART (l. c. p. 30.) cognovit, ubi as-
serit pericardii cum corde adhaesionem praecipue ge-
nerari „*lorsque les malades ont succombé à une peri-
cardite dont la marche n'a pas été aussi vive
ou même chronique.*“

67) Quamvis multa exempla symphyseos cardiaca in
aetate provecta observatae fuerint, experientia mea
tamen docet, nullum cordis morbum in aetate juvenili
tam frequenter obvenire quam illum de quo agitur.
Intellexit id quodammodo CORVISART dicendo (l. c.
p. 41.): „*la jeunesse ne defend point de cette ma-
ladie.*“

68) SANDER l. c.

cardii incrassatio, exulceratio et ossificatio, tunc pericardium originem nanciscantur *), quaeritur quo pacto ^{cardii et tumoribus} haec vitia inter se distinguenda sint? Huic ^{externis.} quaestioni respondere nequimus. Ignoramus etiam quo pacto *adeps* ⁶⁹⁾ et *tumores* ^{**)} pericardium et cor ⁷⁰⁾ extrinsecus occupantes, comprim-

*) Cap. VII. §. XXIII. N. 2 (85 — 90).

69) BOERHAAVE l. c. p. 496. — MORGAGNI Epist. III. 20. Epist. XVI. 36. Epist. XXVII. 2. Epist. XXXV. 18. Epist. XLIII. 17. Epist. LII. 34. — Miscell. Nat. Cur. Dec. I. A. 3. Obs. 118. A. 6 et 7. Obs. 71. Dec. II. A. 2. Obs. 11. Dec. II. A. 7. Obs. 12. — Acta physica Med. a. 1780. T. II. — SCHENK Obs. med. Lib. II. Obs. 197. p. 373. — HOFFMANNI Cardianastrophe p. 2. — SCHURIG Haematologia. Dresd. 1744. p. 401. — BERGER in *Abhandl. f. pr. Aerzte*. 4. B. p. 449. — LIEUTAUD l. c. T. II. p. 150. Obs. 464. — WADE Lond. med. Obs. and Inquiry. Vol. 3. p. 69. — PORTAL in *Abh. f. pr. Aerzte*. 12. B. p. 11.

**) ALBERTINUS apud MORGAGNI op. c. Epist. XXIII. 23. (Tumor magnitudinis ovi, sanguine coagulato repletus pericardio insidens). — DIONIS apud LIEUTAUD op. c. Sect. 7. Obs. 840. Vol. II. p. 271. (pericardium nodis pisiformibus obsessum). — BELL *Zergliederung d. menschlichen Körpers*. 1. B. p. 191. (tumores albi, scirrhusi pericardii); — BONET *sempulchr. Anat.* Lib. I. Sect. 7. Obs. 58. Lib. II. Sect. 6. Obs. 5. Sect. 8. Obs. 21. (steatomata), BAILLIE l. c. (tumores scrophulosi), HORN (*neues Archiv f. med. Erfahr.* Berlin 1807. 6. B. 1. Heft p. 50. (steatomata pericardii degenerati).

70) WALTER Obs. anat. Berol. 1775. §. 20. (Tumor adiposus).

primentes ⁷¹⁾, aut e sede removentes ⁷²⁾, dignosci possunt; nisi forte habitus et opificium aegri, morbi praegressi, praesentia aut absentia symptomatis cujusdam inconsueti aut consueti ⁷³⁾ et examen abdominis nobis auxilientur.

§. XXXI.

P r o g n o s i s . C u r a .

Prognosis.

1. Adhaesiones pericardii cum corde haud amplae et filiformes magnum detrimentum non afferunt ⁷⁴⁾. Secus autem (fortè nonnullis concessis

⁷¹⁾ Cfr. P. II. Vol. II. Sect. I. Cap. XII. §. LIX. N. 8.

⁷²⁾ BOERHAAVE opuscula omnia quae hactenus prodierunt. Hag. Com. 1738. p. 3. (Steatoma cor in cavum thoracis dextrum premebat) et *Samml. auserl. Abhandl.* l. c. p. 502. (ventriculus per vulnus diaphragmatis in cavum pectoris penetrans, et cor e sede sua pellens), LANCISIUS l. c. MECKEL *Mem. de l'acad. de Berlin* 1759. p. 44. — SENNERT *med. pract.* Vitemb. 1628. Lib. II. P. II. C. 15. — MOEBIUS *fundam. med. physiol.* Cap. X. — FABR. HILDANI *Obs. Cent. II. Obs.* 33. — PLENCIZ *acta et observata medica.* Prag. 1783. p. 162. — HAEN *Rat. med.* Vol. V. T. XI. C. IV. (In ascitica diaphragma adeo distentum, ut cor probe jugulum comprimeret), SENAC l. c. T. II. p. 439. (Abscessus pulmonis cor dextrorsum premens).

⁷³⁾ e. c. conditio pulsuum, anxietas etc. Legi de his meretur KREYSIG *Op. c. 2. Th.* p. 634.

⁷⁴⁾ „ . . . quand l'adhérence n'est que partielle et formée par des filamens celluloux, plus ou moins allongés, ou même dans une adhérence immédiate, mais partielle et peu étendue, la fonction du coeur n'est pas

cessis exceptionibus ⁷⁵⁾) si symphysis conspicuam occupet superficiem, aut cor vehementer firmet ⁷⁶⁾. Verisimiliter adhaesiones quae ex inflammatione primaria pericardii pullulant, minus periculosae sunt illis quae ex phlogosi ipsius cordis proficiscuntur; hic enim plerumque simul substantia hujus visceris laesa est ⁷⁷⁾. Maxime nova inflammatio et hydrops aut illius augmentum timeri debent.

2. Suademus hinc ut cura inchoetur, aut a Cura.
parva *venae sectione* (si suspicio pericarditidis chronicae adsit), aut saltem a *hirudinibus* thoraci sinistro apposis, — ut illis succedat *fonticulus* sub cordis regione, — ut alvus ope salium, quae et urinae secretionem sollicitant ⁷⁸⁾, aperta teneatur — ut lene infusum *foliorum digitalis purpureae*

sensiblement dérangée; semblable en cela aux adhérences si fréquentes des poumons avec la pleure."

CORVISART l. c. p. 32.

75) MORGAGNI Epist. LVI. 12. (Sub magna licet adhaesione pulsus erat normalis), HAEN l. c. (Pulsus erat regularis, et respiratio solum sanae frequentior.

76) „ . . . je pense que l'adhérence totale du coeur au péricarde est nécessairement accompagnée d'un dérèglement tel dans les fonctions de cet organe, que la mort en est la suite inévitable." CORVISART l. c. p. 32.

77) Pulchre de hoc argumento scripsit KREYSIG l. c. 2. Th. p. 618.

78) e. c. Cremor tartari cum nitro, et saccharo aa ad scrupulum unum, semel bisve de die.

pureae interpositis intervallis exhibeatur ⁷⁹⁾, — ut pectori parvae doses *unguenti hydrargyrii* cum *unguento althaeae* illiniantur, — ut in casu hydropis regulae alibi expositae pro norma inservient ⁸¹⁾, — utque caeterum intempestivae artis conamina ultra Garamantes relegentur. Diaeta esto facilis digestionis, modice nutriens. A cibis et potu calefacientibus abstinendum, item a motu corporis.

CAPUT IX.

De hydropericardia.

§. XXXII.

Definitio. Literatura. Divisio.

Definitio. 1. **C**ollectio morbosa seri, sinceri, purulenti, cruenti, in cavo pericardii, manifestata signis generalibus hydrothoracis, praecipue vero

sensu

⁷⁹⁾ Timui ab initio *digitalem* (quatenus narcoticum) posse motum cordis aliunde jam impeditum, adhuc magis frangere; ast experientia talem timorem vanum esse, certiore me reddidit; exhibui etenim illam saepe cum magno aegrorum levamine.

⁸¹⁾ Inprimis illae P. II. Vol. II. Sect. I. C. XI. §. LVII, N. 4. expositae.

sensu ponderis sub sterno, tremore cordis, praecordiorum anxietate, praeoptata thoracis in anteriora inclinatione, suffocationis periculo sub motu, pulsu debili, obscuro, inaequali et frequenti, *Hydropericardia* ⁸²⁾ vocatur.

2. De hydropericardia legi merentur: GA-^{Literatu-}
LENUS ⁸³⁾, FABRICIUS HILDANUS ⁸⁴⁾, BARTHOLI-^{ra.}
NUS ⁸⁵⁾, TULPIUS ⁸⁶⁾, SCHENKIUS ⁸⁷⁾, PISO ⁸⁸⁾,
HARDER ⁸⁹⁾, DIEMERBROECKIUS ⁹⁰⁾, FR. HOFF-
MANNUS ⁹¹⁾, MERCKER ⁹²⁾, VIEUSSENS ⁹³⁾, LAN-
CISI ⁹⁴⁾, SENAC ⁹⁵⁾, ALBERTINI ⁹⁶⁾, DUVERNEY ⁹⁷⁾,
BONE-

82) *Synon. Hydrops pericardii. GERM. Herzbeutelwasser-
sucht. GALL. Hydropéricarde.*

83) De locis affectis. Lib. V.

84) Cent. I. Obs. 43.

85) Anat. reform. Lib. II. Cap. 5. p. 252.

86) Lib. IV. Obs. 43.

87) Observ. Lib. II. N. 176.

88) De serosis morbis observationes et consilia. Lugd.
Bat. 1650. Sect. III. Cap. 2. Obs. 39.

89) Aphorism. Obs. 50.

90) Anat. Lib. II. C. 5. p. 261. 372.

91) Diss. de hydrope pericardii rarissimo. Hal. 1667. v.
Opp. Suppl. II. 2.

92) Diss. de hydrocardia. Ultraj. 1711.

93) Op. c. p. 6.

94) De motu cordis et aneurysmatibus opus posthumum,
p. 26. 77. edit. 2da.

95) Op. c. T. 2. p. 349.

96) Comment. Bonon. T. I. p. 389.

97) *Mém. de l'acad. R. des sciences* 1703. p. 158.

BONETUS ⁹⁸), MORGAGNIUS ⁹⁹), KLAUNIG ¹⁰⁰), HAL-
 LER ¹), BARRÈRE ²), LIEUTAUD ³), HAENIUS ⁴),
 STOLLIUS ⁵), LENTIN ⁶), BORSIERI ⁷), J. P.
 FRANK ⁸), WERNER ⁹), BLANCARD ¹⁰), VAN DOE-
 VEREN ¹¹), PEYER ¹²), PORTAL ¹³), SANDIFORT ¹⁴),
 BAILLIE ¹⁵), SIDREN ¹⁶), WESTRING ¹⁷), SANDES-
 SEN ¹⁸),

98) Sepulchr. Lib. II. Sect. I. Obs. 101. Sect. 2. Obs. 15.
 Sect. 8. 9. 10.

99) De scdibus et causis morb. Epist. I. 2. Epist. X. 2.
 Epist. XVII. 14. 21. 25. Epist. XVIII. 28. Epist. XX.
 2. 11. 13. 30. 41. 47. 59. Epist. XXI. 2. 17. XXVI. 20.
 Epist. XXVIII. 12. Epist. XXXVIII. 6. 10. 12. Epist.
 LI. 19. Epist. LIII. 9. 18.

100) Nosoc. Charit. 16.

1) Elem. Physiol. Vol. I. p. 299.

2) Observ. anat. p. 83.

3) Histor. anat. medic. Lib. II. Obs. 611. 621. 648. 663.
 683. 857.

4) Rat. med. P. IX. Cap. I. §. 6.

5) Rat. med. T. I. p. 203. et in MOHRENHEIM'S *Bey-*
träge. 2. B. p. 336.

6) *Beyträge*. 2. B. p. 61.

7) Instit. med. pract. T. IV. Cap. V.

8) Epit. de cur. hom. morbis. Vol. V. p. 241.

9) Epistola observata quaedam in morbis. Lips. 1776.

10) Anat. pract. Cent. II. Obs. 8.

11) Spec. Obs. Academ. Cap. 4. p. 73.

12) *Pare ga* p. 150.

13) *Cours d'anatomie médicale*. T. 3. p. 11.

14) Observ. anat. pract. Vol. I. p. 40. Vol. IV. p. 109.

15) *Anatomie des krankhaften Baues*. N. 1.

16) *Abhandl. Schwed. Aerzte*. 1. B. p. 150.

17) *Neue Schwedische Abhandlungen*. 11. B. p. 272. v.

SEN¹⁸⁾, MATANI¹⁹⁾, BANG²⁰⁾, MAZZI²¹⁾, HAGER²²⁾, ROLLIN²³⁾, LEVEQUE²⁴⁾, SCHREIBER²⁵⁾, WENDELSTÄDT²⁶⁾, AEPLI²⁷⁾, CONRADI²⁸⁾, COLOMBIER²⁹⁾, KINGLAKE³⁰⁾, THUESSINK³¹⁾, J. BELL³²⁾, SCHAEFFER³³⁾, LANDVOIGT³⁴⁾, HEINECKE³⁵⁾, RICHERAND³⁶⁾, SACHTLEBEN³⁷⁾, alii-
que³⁸⁾

Sammlung auserles. Abhandl. f. prakt. Aerzte. 14. B. p. 581.

18) *Schwed. Abh.* 1790. II. Quartal. Th. 11. — *Samml. auserl. Abh. f. pr. Aerzte.* 14. B. p. 453.

19) *De Aneurysmatibus praecord.* p. 41.

20) *Act. Soc. Reg. Havn.* Vol. III. p. 129.

21) *Giornale per servire alla Storia ragionata della medicina di questo secolo.* T. 4. p. 129. v. *Samml. auserl. Abh. f. pr. Aerzte.* 15. B. p. 77.

22) *LODER's Journal f. die Chirurgie.* 1. B. p. 630.

23) *Journal de med.* T. XXXII. v. *Samml. auserl. Abh. f. pr. Aerzte.* 1. B. 3. St. p. 80.

24) *Recueil des actes de la société de santé de Lyon.* 1. Vol. p. 344.

25) *Nov. Comm. Petrop.* Vol. 3. p. 402.

26) *HUFELAND's Journal.* 20. B. 3. St. p. 212.

27) *Idem, ib.* 6. B. p. 767.

28) *ARNEMANN's Magazin.* 1. B. p. 81. 88.

29) *Journal de méd.* T. LXVI. p. 437.

30) v. *Auserl. Abh. f. pr. Aerzte.* 13. B. p. 388.

31) *HUFELAND's und HIMLX's Bibl.* 1812. May. p. 257.

32) *System of Surgery.* T. II.

33) *HUFELAND's Journal d. pr. Heilk.* 1810. p. 101.

34) *Diss. de hydropo pericardii dignoscendo.* Halae 1798.

35) *Diss. de hydropo pericardii.* Erf. 1799.

que³⁸⁾ praeter scriptores recentiores de morbis cordis³⁹⁾.

Divisio. 3. *Hydropericardia* dividitur in *complicatam* et *solitariam*. Haec rarissima est⁴⁰⁾. Potest hydropericardia quoque dividi in *acutam* et *chronicam*, inque *serosam*, *cruentam* et *purulentam*.

§. XXXIII.

Symptomata. Autopsia cadaverum. Caussae.

Symptomata. 1. *Symptomata hydropericardiae solitariae*, admodum sunt varia⁴¹⁾. Adscribuntur illis: sensus pressionis et angustiae circa partem thoracis ante-

36) *Nouv. journ. de méd. chir. et pharm.* 1818. Mai. T. II. p. 9.

37) *Klinik der Wassersucht* p. 527.

38) *Breslauer Sammlung* 1720. p. 217. *Commerc. Lit. Norimb.* 1736. p. 356. — REIMANN in *Act. N. Cur.* Vol. I. Obs. 170. *Museum der Heilkunde.* 2. B. p. 81.

39) KREYSIG op. c. 2. Th. p. 440. 636. 782. CORVISART p. 45. TESTA p. 263.

40) Se hunc morbum nunquam vidisse fatentur MORGAGNI (Epist. XVI. 20.) et Pater meus (l. c. p. 243.). Idem fateri adigor, si de hydrope pericardii chronico seroso quaestio sit; secus autem relate ad hydropericardiam acutam purulentam.

41) Pater meus, postquam quatuor hujus mali historias in medium attulerat, ait (l. c. p. 247.): „atqui sic nec unicum quidem ex quatuor hic allatis hydropericardiae, quamvis *solitariae*, exemplis, phaenomena nobis offert aequalia?“

anteriorem ⁴²⁾; dyspnoea, orthopnoea, dolor lumborum ⁴³⁾; decubitus (saltem a morbi initio) in dorsum difficilior ⁴⁴⁾; tussis sicca ⁴⁵⁾ cordis gravi-

42) BARRÈRE l. c. in *quinque* aegris, qui post mortem inventi sunt pericardii hydrope laborasse, symptomata sequentia adnotavit: „*Pressionis et angustiae sensum circa partem anteriorem thoracis*, quam pericardium occupat; compressionem pulmonis, hinc dyspnoeam, tussim siccam, irritantem; motum diaphragmatis difficiliorem, *palpitationes cordis*; pulsum inaequalitatem, quandoque et syncopen, praecedente suffocationis, quasi instantis sensu. Unde hic auctor, pro signis diagnosticis hujus morbi posuit: pedum oedema, pallorem faciei, pulsum parvum celerem, respirationem impeditam, difficilem in lecto decubitus, una cum suffocationis sensu, subinde recurrente.“

43) „Praeterea quandoque aqueus humor intra pericardium non sensim, sed repente et celeriter effunditur, idque immaniter distendit, tunc mole sua ita urget deorsum diaphragma, ut ejus appendices protrusae et distractae *atrocem in lumbis dolorem* excitent.“

BORSIERI l. c. Cap. V. §. CLXXIII.

44) LANCISIUS (l. c.) sequentia hydropericardiae signa posuit: „urinas paucas, rubras, crassas, citoque putrescentes, una cum cordis pondere, tremore, gravitate, difficili anhelitu, praecordiorum anxietate. Subinde corripiunt oedematosi crurum tumores aliaque signa, quae pectoris hydropem comitari consueverunt; tandem peculiare symptoma, quod cordis prolapsui commune est, inducitur; scilicet aegrotantes lecto stare nequeunt; et *cum ab initio non nisi extra lectum respirare potuerint*, ante mortem coguntur ad *decubitus*; videlicet quia pericardium, una, aut etiam

gravitas *), palpitatio ⁴⁵⁾, vel motus, sive undulato-

sesqui altera liquoris libra turgidum diaphragmatis centro vim infert, neque aliud standi situm, qui sit minoris incommodi aegris, permittit, quam horizontalem, in quo pericardium, versus jugulum ascendens, diaphragma non amplius premit.“ Et VIEUSSENS testatur aegros commode super dorsum jacere. WESTRINGII aeger quoque poterat dorso incumbere, nunquam vero lateribus. TESTA vidit aegrum in latus sinistrum decubuisse (l. c. p. 290.). Aeger SIDERII ab initio morbi non potuerat supine jacere, ast versus finem, quod LANCISII opinionem confirmat, potius quam illam KREYSIGII, qui, decubitus ultimis vitae temporibus in dorsum concessum, a defectu sensus et incipiente paralysi derivat (l. c. 2. Th. p. 614.). Aegri mei (uno excepto, qui decubitus in dorsum eligebat) libentissime sedebant. Diversitates hae, respectu ad decubitus, maxime ex morbis cum hydropericardia complicatis pullulare videntur.

45) „Tussim quoque vel multam vel modicam adjunctam habet et fere siccam, sive cum sputis tantum salivalibus.“ ALBERTINI l. c.

*) Apud monacham ALBERTINI (l. c.) respiratio, sive staret, sive supine jaceret, sive in utrumque cubaret latus, aequae erat facilis. Pulsus, neque tensus, neque durus, neque vibrans; nec ullo prorsus modo inaequales, nullus in pulmonum regione dolor, tussis nulla, nulla in thorace palpitatio, aut magna pulsatio, occurrebant. At vero, *cor sibi, tamquam saxo ei imposito, gravari*, atque sub loquela, sub motu, undique constringi, coarctari aegra referebat.

46) BARRÈRE (l. c.). — Interdum palpitatio in hydropericardia deesse, observationibus innixus ostendit

latorius inter tertiam et quintam costam ⁴⁷⁾, sive vagus ⁴⁸⁾; pulsuum exilitas, inaequalitas, debilitas ⁴⁹⁾, syncope ⁵⁰⁾, praecedente sensu suffocationis

REINMANN (l. c.) et ipse MORGAGNI (Epist. XVI. 23.). DIEMERBROECKIUS in ullo pericardii hydropico, quem dissecuit, se ullam omnino cordis palpitationem observasse. Percepi illas sed obscuras unde pulchre CORVISART (l. c. p. 48.): „*En appliquant la main sur la région du coeur, on sent des battemens tumultueux obscurs.*“

47) Vide infra §. XXXIV. N. 4. (13) „*on diroit que l'organe ne fait sentir ses battemens qu'à travers un liquide, placé entre lui et les parois thoraciques.*“ CORVISART l. c. p. 48. Dico autem cum TESTA (l. c. p. 266.): „*Ich muß indessen gestehen, daß ich in unzähligen Fällen, wo mir diese Krankheit vorgekommen, nie so glücklich gewesen, jene schwappende Geschwulst zu sehen oder zu fühlen.*“

48) „*à tous ces signes, enfin, j'en ajouterai un qui s'est offert deux fois à mon observation, et me paroit mériter plus de confiance que les derniers; je veux parler des battemens du coeur qui se font sentir, tantôt à droite, tantôt à gauche, ou, pour m'exprimer plus clairement, dans différens points d'un cercle assez étendu.*“ CORVISART l. c. p. 50. — TESTA (l. c. p. 267.) confirmat CORVISARTII observationem, dicens: „*durch kein anders ausgezeichnetes Merkmal habe ich in munchen Fällen die Zöglinge meiner Schule zur Unterscheidung dieser Wassersammlung anführen können, und jedesmal hat sich durch die Leichenöffnung mein Urtheil bestätigt.*“

49) Varios, non semper eosdem hoc in morbo pulsus esse, saepius tamen parvos, debiles, frequentes obser-

tionis quasi instantis, inprimis sub motu ⁵¹⁾; palpebrarum, labiorum livor ⁵²⁾, extremitatum frigus ⁵³⁾,

vari, testatur MORCAGNI (Epist. XVI. 44.). ALBERTINUS inquit: „Pulsus itaque comparate molles, potius frequentes ac parvos (hydrocardia) sibi adjungere consuevit, ubi structura cordis, sive immodice flaccida evaserit, sive hic illic in suis fibris inceperit fracescere, sive restagnans in pericardio humor lentus, vel mere aqueus sit. Parvos vero, frequentiores adhuc, vibratos ac tensos, cum sapor ejus salinus et vellicans est. Exiles etiam, celeriores deficientesque, si tanta humoris copia in pericardio contineatur, quanta fere maxima in eo contineri potest. *At ea pulsus inaequalitate et intermittentia nunquam stipari solet, qua stipatur, dum cum eo complicantur aliqua vel plura ex antedictis vitia.*“

50) „Animi deliquium saepe (in hydrocardia) observatum fuisse; fateor scilicet ubi alterius morbi causae non defuerant. Non vero semper illud signum subest, ita ut pro characteristico haberi posset.“ MORCAGNI Epist. XVI. 45.

51) „Et quamvis a mediocri quocunque locali motu ingravescat cordis motus ad tremorem accedens, et una cum eo spirandi difficultas, sive potius *apnoea*, et ad sternum oppressio, cum sensu doloris et jactatione contingat; haec tamen in aegroto, ubi moveri desiit, et quieti se tradidit, si non omnino et maxima ex parte evanescent.“ ALBERTINI l. c.

52) VIEUSSENIUS (l. c.) pro signo hujus morbi proposuit *palpebrarum* labiorumque colorem ad plumbeum vergentem: sed hoc signum, inquit MORCAGNI (Epist. XVI. 46.) potest et in aliis morbis esse; neque in monacha ALBERTINI fuit.

frigus ⁵³), tristitia ⁵⁴), contabescencia, urina pauca rubra cum sedimento lateritio, oedema crurum ⁵⁵) et faciei ⁵⁶).

2. In femina ex hydropericardia *solitaria*, Autopsia
visceribus omnibus sanis, demortua, detegebatur ^{cadave-}
pericardium adeo distentum, ut pulmones coope-
raret, serumque ad libram unam repertum est ^{rum} ⁵⁷).
Similes observationes alii collegerunt ⁵⁸). In Mo-
nachae cadavere praeter pericardii, a novem
unciis aquae in eodem contentae, tumorem et
cordis superficiei erosionem, nil morborum reper-
tum fuit ⁵⁹). Aperto cadavere viri (cui temo cur-
rus agitati in pectus irruerat), pericardium ple-
num tantae molis fuit, ut utramque thoracis
cameram, ad jugulum fere usque, expleret, pul-
monibus, in tanti sacci ambitu compressis, nec
tamen

53) HAEN (l. c.) asserit aegrum nunquam in sex postre-
mis vitae septimanis incaluisse.

54) VIEUSSENS l. c.

55) HAENII aeger crura habuit oedematosa ac si crepa-
rent (l. c.). Item SCHAEFFERI (HUFELAND's *Journal*.
30. B. 2. St. p. 103.) et plurimi proprii aegri.

56) „Das ist aber merkwürdig, was ich mit Wahrheit
betheuren kann, daß ich mich kaum zweier Fälle erin-
nere, wo bei Wasseransammlungen in der Brusthöhle
und im Herzbeutel nicht Aufgedunsenheit im Ant-
litz vorgekommen war.“ TESTA l. c. p. 282.

57) SIDERN l. c.

58) VIEUSSENS l. c. VALSALVA apud MORGAGNI (Epist.
XVI. 31.). FR. HOFFMANN l. c. MAZZI, HAGER II. cc.

59) ALBERTINI l. c.

Frank Prax. II. 2. 2.

M

tamen duris, nec vel minimum quidem cum pleura et diaphragmate connexis. *Nullus cavitatum pleurae hydrops.* Eductae fuerunt pericardio aquae turbidae, subviridis, quadraginta et octo unciae, dein aquae rubellae unciae viginti quatuor. Nullum cordis vitium detectum fuit ⁶⁰⁾. In nauta pulmones versus posteriora et latera compulsi, ac pleurae valde adcreti spectabantur. Supra diaphragma aliqua portio seri flavescentis fluctuabat; partes pectoris media et anteriores laterales a pericardio valde extenso et livescente replebantur, a quo aperto librae circiter quatuor aquae cruentae effluxerunt. Cordis superficies tota circumcirca villis magnis, longis latisque obducta et hirta fuit ⁶¹⁾. Similes casus, effluentibus e pericardio seri purulenti libris nonnullis, plus vice singula observavimus ⁶²⁾. Saepius adhuc nobis hydropericardia cum hydrope cavitatum pleurae juncta obvenit. Cum aliis vidimus pericardium hic seri continuisse a libra una ⁶³⁾, ad libras duas ⁶⁴⁾, tres ⁶⁵⁾ et quatuor ⁶⁶⁾. Seri cruenti quinque librae in pericardio repertae sunt ⁶⁷⁾.

Peri-

60) HAEN l. c.

61) SCHREIBER l. c.

62) Vide supra Cap. VII. §. XXIII. N. 2.

63) LIEUTAUD, KINGLAKE, AEPLI.

64) DIEMERBROECK, HAEN, BLANCKARD.

65) PEYER.

66) FABRICIUS HILDANUS, WESTRING, LIEUTAUD.

67) LIEUTAUD l. c.

Pericardium tali in casu tensus esset atque renitens ⁶⁸⁾ per se patet ⁶⁹⁾. Ex allatis aliisque observationibus apparet, liquidum, hydro-pericarditidem efficiens, pro re nata ⁷⁰⁾ esse limpium ⁷¹⁾, spumosum ⁷²⁾, ichorosum ⁷³⁾, purulentum ⁷⁴⁾, cruentum ⁷⁵⁾, flavescens ⁷⁶⁾, ex flavo

M 2

viri-

68) VALSALVA apud MORGAGNI Epist. XXXVIII. ROLLIN l. c.

69) Non intelligitur quo pacto BELL (*Zergliederung des menschlichen Körpers. 1. B. p. 190.*) hujusmodi tensionem pericardii negare potuerit.

70) In *variis morbis*, vario colore esse solet humor in pericardio collectus. Secundum LANCISIUM (l. c.) *flavus* est in ictericis. In homine ex pleuritide defuncto *viridescentem* observavit LANZONI; et in femina ex variolis demortua vidit idem, ut sanguinem *rubrum*. — In serva scorbutica, ab angina enecata, plenum erat pericardium liquore *coerulescente*. In presbytero hydropico *viridis* erat. (Ex schedis Patris mei).

71) MORGAGNI Epist. XVI. 6. TESTA l. c. p. 281. (Pericardium simile globo pellucido). ROLLIN, MAZZI ll. cc. RICHERAND (crystallinum conspexit corde translucente) l. c.

72) MORGAGNI Epist. XXXI. 2. (veluti aqua saponis). HUBER Observ. anat. p. 32. (cum floccis mucosis innatantibus).

73) FABR. HILDANUS Obs. Cent. I. Obs. 43.

74) MORGAGNI Epist. XX. 57.

75) Ibid. Epist. III. 2. 26. Ep. IV. 24. 26. Ep. XXI. 3. 19. 24. 29. Ep. XXVI. 35. Ep. XXVII. 12. Ep. XXX. 10. Ep. XXXI. 2. Ep. XXXVI. 25. Ep. XLIV. 3. Ep. XLV. 23. (Saepe saepius vidi).

viridescens ⁷⁷⁾, ex flavo-rubrum ⁷⁸⁾, rubellum ⁷⁹⁾, urinosum ⁸⁰⁾, fuscum ⁸¹⁾, spissum ⁸²⁾, lacteum ⁸³⁾. Quod de illius indole acri et rodente dicitur ⁸⁴⁾ dubiis adhuc subjectum est ⁸⁵⁾. Quamvis nonnullae observationum supra allatarum doceant posse hydropericardiam corde omnino sano locum habere, saepius tamen contrarium contingit. Visum enim est cor simul parvum ⁸⁶⁾, praemagnum ⁸⁷⁾ et durum ⁸⁸⁾, concretionibus polyposis

76) Ibid. Epist. VII. 11. Epist. VIII. 27. Epist. X. 7. Ep. XVII. 10. 21. Epist. XX. 10. Epist. XXI. 9. 30. 34. Ep. XXII. 22.

77) BARTHOLIN l. c. p. 252. MORGAGNI Epist. XVI. 30. Epist. XXI. 17. Ep. XXXVIII. 30. LIEUTAUD l. c. Obs. 632.

78) MORGAGNI Epist. XXI. 33.

79) ibid. Epist. XXI. 19. Epist. XXVII. 12.

80) ibid. Epist. XXVI. 33. Epist. LXIV. 5.

81) WESTRING l. c.

82) MORGAGNI Epist. XI. 11. Epist. XVI. 17. LIEUTAUD l. c. Obs. 627.

83) VIEUSSSENS l. c.

84) ALBERTINI l. c. PEYER l. c. Acta Havn. Vol. I. Obs. 89. — SYLVIVS Prax. med. Lib. I. Cap. XXVI. Sect. 26. — MORGAGNI Epist. II. 17. Ep. X. 13. Ep. XX. 53. Ep. XXI. 9. 24. 36. Ep. XXII. 24. Ep. XXIV. 34. Ep. XLII. 11. Ep. XLV. 23. — LIEUTAUD l. c. Obs. 612.

85) Erosiones cordis, effectus inflammationis, pro effectu seri acris pericardii habuisse videntur.

86) TESTA l. c. p. 277.

87) MORGAGNI Epist. XX. 35. Epist. XVI. 6. LIEU-

posis refertum⁸⁹⁾, pseudomembranis obductum⁹⁰⁾, erosum⁹¹⁾ visaque est aorta dilatata⁹²⁾. Testantur quoque observationes de hydropericardia cum pericardio incrassato⁹³⁾, deque collectione seri inter ipsas illius lamellas⁹⁴⁾. Et de corde incombustibili quaestio fuit⁹⁵⁾. Item de dilata-tione vasorum lymphaticorum⁹⁶⁾.

3. Causa communissima hydropericardiae, Causae. est pericarditis. Accedunt causae generales hydropis⁹⁷⁾ et praecipue hydropis cavitatum pleurae, mediastini et pulmonum⁹⁸⁾; atque in ec-
istos

TAUD l. c. Obs. 613. 620. — TESTA l. c. p. 278 et 228.

88) WESTRING l. c.

89) MORGAGNI Epist. XX. 11. 13. — LIEUTAUD Obs. 6. 20. 631. WESTRING l. c.

90) TESTA l. c. p. 280. 281.

91) Acta Hafniensia. Vol. I. Obs. 89.

92) TESTA l. c. p. 276.

93) LIEUTAUD Obs. 612. WESTRING l. c.

94) LIEUTAUD Obs. 628.

95) PLINIUS (L. XI. C. 71.) narrat, de opinione, ac si cor morbosum, illudque hominum veneno peremptorum, comburi haud possit. Celebrata est hoc sub respectu lis inter Romanos agitata, teste TACITO (Ann. L. II. C. 72. 73.) et SÜETONIO (vit. Calig. C. I.). Vido TESTA l. c. p. 263.

96) VALSALVA v. TESTA l. c. p. 269. et p. 277.

97) P. I. Vol. II. Cap. XLI. §. CLXIX.

98) Part. II. Vol. II. Sect. I. Cap. XI. §. LIV. 6. §. LV. 4. §. LVI. 5.

istos maxime graviditas ⁹⁹⁾, vitium congenitum ¹⁰⁰⁾, debilitas ¹⁾; scarlatina ²⁾, variolae ³⁾, cordis symphysis, polypi, lithiosis et dilatationes, aneurysmata aortae et morbis pulmonum ⁴⁾.

§. XXXIV.

D i a g n o s i s.

Monitum. 1. Cum in pericardio uniuscujusque cadaveris plus minus seri ⁵⁾, verisimiliter aut ultimis vitae aut primis mortis momentis, depositi ⁶⁾, inve-

⁹⁹⁾ TESTA l. c. p. 288.

¹⁰⁰⁾ *Medic. prakt. Beiträge von Dr. SCHENK in HUFELAND's Journal* 1813. April. 42.

1) Ex purgante quinquagesies alvum movente, et copioso potu, monacha ALBERTINI hydropericardiam acquisivit. Vidi eundem morbum in infantibus exhaustis.

2) Aliquoties vidi.

3) Creberrime observavi. Cfr. P. I. Vol. II. Cap. XIV. §. LXV. N. 5.

4) *Lettere del Signor SEVERIO MANETTI, sopra la malattia, morte e sezione di cadavere di ANT. COCCHI. Fir. 1759.*

5) „De tota cordis superficie et sacci id circumdantis, exsudat vapor, qui collectus aquam pericardii constituit, in foetu et jejuno homine pellucidam, decolorem et flavedine quadam tinctam. Impedit haec ne cor cum velamento concreseat, et ne ulla frictio mucronis in parietes sacci fiat.“ SINDERN l. c. —

6) „Fast scheint es, als könne sich selbst in den letzten Augenblicken des Lebens und selbst nach dem Tode noch Wasser in den innern Höhlen und so auch im Herz-

inveniat prae sentia hydropericardiae non est proclamanda, nisi aut collectio seri consuetos limites excedat 7), aut serum sit purulentum cruentumve.

2. Sym-

beutel anhäufen; denn man findet in vielen Sectionsberichten einer bedeutenden Wasseranhäufung im Herzbeutel Erwähnung gethan, wo nicht der geringste Verdacht der Gegenwart derselben während des Lebens da gewesen war.“ KREYSIG (Op. c. 2. Th. p. 433.). Et CORVISART (l. c. p. 56.): „Souvent j'ai fait remarquer dans mes leçons, que tel sujet qui, peu de jours avant la mort, ou même à l'instant de rendre le dernier soupir, avoit les extrémités gonflées et distendues par la sérosité, ne se trouvoit plus, quand on l'examinait quinze ou vingt heures après sa mort, dans un état d'intumescence aussi marqué sur les extrémités inférieures; quelque fois même on n'apercevoit plus qu'une légère infiltration de ces parties. Il se fait alors dans une espace de tems très court, et quoique le corps soit privé de vie, une sorte de revulsion, qui détermine, d'un côté, la disparition presque totale de l'infiltration des membres, et fait, que de l'autre part la poitrine et le péricarde se remplissent à mesure que le tissu cellulaire des extrémités se vide: on est alors très surpris, en ouvrant la poitrine, de trouver ses cavités, ainsi que celle du péricarde, plus ou moins remplies de liquide, lorsqu'on s'attendoit à les trouver tout à fait exemptes d'épanchement.“

7) „Si cependant l'observation prouve, que la quantité de six onces soit la plus considérable, qu'on ait trouvée dans le péricarde d'un grand nombre d'individus morts de suites de toute espèce de maladie, autre que celles que l'hydro-péricarde, ne suis-je pas en droit de con-

Varietas
sympto-
maticum.

2. *Symptomata* hydropericardiae; maxime ob id *varia* sunt, quod, is morbus ut plurimum vel cum aliis vitiis cordis, vel cum hydrope saccorum pleurae complicatus est.

Complica-
tio cum
aliis vitiis
cordis.

3. Dum *hydropericardia* cum aliis cordis vitiis *complicatur*, non solum ille hydrops, sed et haec vitia difficulter cognoscuntur: obfuscatur enim unus morbus alterum⁸⁾.

Hydrope-
ricardia
solitaria
et compli-
cata.

4. Suspiciamus, nisi *hydropericardiam solitariam*, saltem hydrothoracem generalem, in quo collectio liquidi morborum in pericardio potissimam scenam ludit, dum, morbo necdum ad extremum producto, angustiae respirandi difficultatem vi superant⁹⁾, dum pulsus cordis et arte-

clure que, lorsque cette sérosité excède six à sept onces, il excite une hydropisie de cette membrane; et même qu'une quantité moindre peut encore constituer une hydropisie consécutive?“ CORVISART Op. c. p. 46.

8) Pulchre inquit ALBERTINI (l. c.): „Hydropem pericardii ex praememoratis cordis et praecordiorum offensionibus saepe nasci dubitandum non est. Tum autem indicia illius vix ulla esse possunt, quia confunduntur ab indiciis eorum vitiorum modo plurium, modo paucorum, modo unius, modo alterius generis, quibuscum copulatur.“

9) Jam MOROAGNI docuit (Epist. XVI. 45.) *leviorem* in pericardii, quam in thoracis hydrope, *difficultatem* respirandi esse; quod et FR. HOFFMANN confirmavit (l. c.). Interim putarem et in hydropericardia difficultatem respirandi potius a compressione pulmonum, quam a circuitu sanguinis impedito, derivandam esse.

arteriarum jam ab initio morbi a norma deflectebat¹⁰⁾, dum toto thorace percusso illius latus sinistrum dumtaxat sonum obscurum edit idque aegro stante vel decumbente supine¹¹⁾, — dum sub concussione thoracis nulla fluctuatio percipitur¹²⁾ et aeger ipse sensum cordis in aquis natantis percipit¹³⁾, dum cordis motus vagus inno-

10) „... ferner stört die Brustwassersucht, von Anfang an, den Herz- und Pulsschlag nicht so wesentlich.“ KREYSIG l. c. 2. Th. p. 639.

11) „Quand on pratique la percussion de la poitrine soit que le malade reste à son séant soit qu'il se place horizontalement dans son lit, le son que rend cette cavité est obscur, et meme nul antérieurement et à gauche dans une étendue proportionnée à la dilatation que le liquide à fait éprouver au péricarde.“ CORVISART l. c. p. 48.

12) Non recordatur MORAGNI se legisse, fluctuationem sub concussione fuisse observatam (Epist. XVI. 46.). Caeterum praesens fluctuatio in thorace praesentiam quidem hydropis saccorum pleurae confirmaret, sed non vice versa, cum ipso in hoc malo raro talis fluctuatio percipiatur (P. II. Vol. II. Sect. I. Cap. XI. §. LIV. 7.).

13) Signum, quo SENAC (l. c. livr. IV. chap. 5. §. 356.) hydropericardiam a hydrothorace (hydrope saccorum pleurae) paulo magis posse distingui credit, est motus undulatorius, vel species fluctuationis sub ipso cordis motu inter tertiam, quartam et quintam costam. — Jam GALENUS (De locis affectis C. V.) scripsit „Palpitationem cordis aut per se evenire aut cum significatione quadam, quod in humore cor ipsum moveatur.“

innotescit ¹⁴⁾, dum oedema latus thoracis sinistrum exclusive occupat, dum hoc latus prominet ¹⁵⁾; — dumque morbi, exsudationibus in pericardio facile ansam porrigentes, praëgressi aut praesentes sunt ¹⁶⁾.

Distinctio
a symph.
cardiaca.

5. Cum inter morbos hydropericardiam gignentes pericarditis praecipuum locum occupet, haecque saepe et *symphysis cardiacam* producat, quaeritur quomodo hi morbi inter se distingui possint? — Si symphysis cardiaca cum extravasato copuletur ¹⁷⁾, talis distinctio fieri nequit; alias symptomata generalia hydropis (familiaria quoque collectioni morbosae fluidi cujusdam in sacco pericardii), et praegressa pericarditis *acuta* (utpote

— HERCULES SAXONIA „cor in aquis quasi natare“ edixit. — Interim REIMANNUS (l. c.) monuit paucos esse homines sensus tam exquisiti, ut motum undulatarium cordis indicare possint.

14) Vide supra §. XXXIII. N. 1. (47).

15) „Dans quelques cas, le côté gauche de la poitrine est plus élevé, plus arrondi, plus bombé que le droit.“ CORVISART l. c. p. 48.

16) „Ist eine deutlich erkannte Herzkrankheit vorhergegangen, so wird es, gegen die Behauptung der meisten Schriftsteller, gerade leichter seyn, diesen Uebergang zu erkennen, und man wird die Zufülle des organischen Herzbels leichter von denen der Herzbeutelwassersucht scheiden können, als wo letztere nicht aus jenen Fehlern entstanden ist.“ KREYSIG l. c. p. 638.

17) Cap. VIII. §. XXIX. N. 1.

(utpote adhaesionibus vix tempus concedens¹⁸⁾)
potius *hydropericardiae* suspicionem moverent.

6. Et morborum *ductus thoracici*, sympto- Distinct.
mata hydro-pericardiae nonnunquam aemulan- a morb.
tium²⁰⁾, memores esse juvabit. duct. tho-
racici.

7. *Hydropericardiae* autem et *hydatides* ad- Hydatides
numerari possunt, quae tum circa *pericardium*²¹⁾, cordis.
tum circa *cor*²²⁾, repertae fuere.

§. XXXV.

18) Ibid. §. XXX. N. 1 (66).

20) „ . . . eine Zerreiſſung der Saugadern fand
vermuthlich bei dem Kranken statt, der nach heftigen
und ungewohnten Leibesübungen, zuerst Beschwerden in
der linken Brust und dann das Gefühl bekam, als ob
etwas dort geboresen sey, und als ob eine Flüssigkeit
aus dem obern Theil der Brust herab tröpfelte. Dieses
letztere versichert WILLIS (Pharmac. ration. Par. II.
Sect. I. C. 5. p. 170.) habe man auch hören können.“
TESTA l. c. p. 269. — Addit SPRENGEL (in nota):
„Dies scheint eine Zerreiſſung des Brustgan-
ges oder des Stammes der Saugadern gewesen zu seyn,
wovon FR. HOFFMANN (de succi nutritii ex pectore
stillicidio. Hal. 1710.) und LENTIN (Beyträge z. aus-
übenden Arzneywissenschaft. 1. B. p. 312. 332.) Beispiele
erlebt haben.“

21) ROLFINK epitome cognoscendi corporis humani affe-
ctus. Jen. 1675. p. 16. — BONET Sepulchr. anat. L.
II. Sect. 8. Obs. 6. — Ejusdem Polyater s. Thesau-
rus medic. pract. T. II. L. 3. C. 24. — BARTHOLINUS
v. BONET l. c. L. III. Sect. 37. Obs. 3. §. 12. — COR-
DAEUS apud BONET l. c. Sect. 21. Obs. 21. §. 14. —
HEUERMANN Physiologie. Kopenh. 1751. 1. B. p. 202.

22) HEUERMANN l. c. — BONET Op. c. L. IV. Sect.

§. XXXV.

P r o g n o s i s. C u r a.

Prognosis. 1. Hydro-pericarditis *acuta* prognosin atram agnoscit. Hydropericarditis *chronica*, illam cum hydrope cavitatum pleurae ex vitiis cordis ²⁴⁾ communem habet.

Cura. 2. De *cura* hydrocardiae acutae jam diximus ²⁵⁾. Illa hydrocardiae chronicae, ex principiis adversus hydrothoracem in genere traditis ²⁶⁾, quoad fontem therapeuticum, repetenda est. Ex fonte chirurgico *perforationem pericardii* a RIO-

LANO

12. p. 563. — MORGAGNI (Epist. XXV. 15. ad apicem cordis). Cfr. Epist. III. 26. XXI. 4. — WEPFER in Miscell. Nat. Cur. Dec. III. A. 10. Obs. 121. p. 314. — DAVID PRICE in *Medico-chirurg. transact. published by the medical chirurgic. Society of London. T. XI. P. 2. A. 1821.* — TESTA l. c. p. 238. (Hydatis in ipsa cordis substantia apud puerum, adspectu sanissimum, et derepente demortuum. Aderat, simul symphysis cardiaca partialis).

24) P. II. Vol. II. Sect. I. C. XI. §. LIV. uxor professoris quondam chirurgiae in universitate Vilnensi BRIO-TET, constanter signa dilatationis cordis exhibebat, quibus repetitis vicibus illa hydropericardiae supervenere. Ter quaterve illam orci faucibus cripuimus infusione foliorum digitalis purpureae cum liquore terrae foliatae tartari et oxymelle scillae, cujus pharmaci ope urinae, prius paucissimae, ad libras plures, fluebant. Obit tandem jam vetula a. 1812. me absente, nullaque instituta cadaveris sectione!

25) Cap. VII. §. XXVII. 2.

26) P. II. Vol. II. Sect. I. C. XI. §. XLVII. N. 4.

LANO et a SENAC ²⁷⁾ propositam, a DESAULT ²⁸⁾ et LARREY ²⁹⁾ institutam, et a RICHERAND haud rejectam ³⁰⁾, tum ob incertudinem diagnoseos, tum ob facilem complicationem cum aliis morbis, tum ob incertam nobilissimi visceris sedem, nemini commendabimus.

CAPUT

27) Op. c. T. II. p. 365.: „On ne doit choisir, pour plonger un troiscard dans la poitrine; l'espace qui est entre la troisième et la quatrième côte du côté gauche. Il faudrait porter la pointe de cet instrument à deux pouces du sternum, le pousser obliquement vers l'origine du cartilage xyphoïde et le conduire le long des côtes, c'est à dire, qu'on doit s'en éloigner le moins qu'on le pourra. En marchant par cette voie, on ne blessera ni l'artère mammaire, ni le cœur, ni le poumon.“

28) Id est, DESAULT putabat se pericardium perforasse, sed re ipsa aperuit dumtaxat saccum, ex membrana quae marginem pulmonis sinistri cum pericardio jungebat, constitutum, et sero repletum. (Legitur haec memorabilis historia in operibus Chirurgicis DESAULTII et apud CORVISANT l. c. p. 57.).

29) Bulletin des sciences médicales 1810. T. 6. N. 37. p. 255.

30) „RICHERAND (l. c.) appuyé sur l'heureux succès d'une opération de cancer, où il enleva à la région du cœur les côtes et la pleure, propose dans l'hydropisie du péricarde de pratiquer une ouverture au devant du cœur, qui permettroit non seulement d'évacuer l'eau dans laquelle le cœur est plongé, mais encore de guerir radicalement la maladie en déterminant l'inflammation adhésive de surfaces, par des procédés analogues à ceux dont on fait usage pour la cure du hydrocèle.“

CAPUT X.

De polypo cordis.

§. XXXVI.

Definitio. Literatura.

Definitio. 1. **D**icitur *polypus cordis*, corpus membranaceum, fibrosum, nunc in ventriculis, nunc in auriculis hujus visceris (ut plurimum aliunde morbos), radices agens, rarissime libere fluctuans, aegrosque tot symptomatibus, quot ex intercepto plus minusve sanguinis circulo expectari possunt, mox continuo, mox periodice, agens, haudque raro inapinate jugulans ¹⁾.

Literatura. 2. De polypo cordis scripserunt: BAUHINI ²⁾, SEVERINUS ³⁾, WILLISIUS ⁴⁾, COUSIN ⁵⁾, BENIVIENI ⁶⁾, BLANCARD ⁷⁾, PANAROLUS ⁸⁾, SMETIUS ⁹⁾,

1) GERM. *Herzpolypen*.

2) *Theatrum anatomicum*. Francf. 1605. Tab. IX. fig. 1. 2.

3) *Lib. de nov. obs. absc.* p. 285.

4) *Pathol. cerebr.* C. 9.

5) *Nov. asthma. hist.* 2.

6) *De addit. morb. et curat. caus.* C. 35.

7) *Anat. pract. rat.* Amstel. 1688. Cent. I. Obs. 20. p. 51. Obs. 21. p. 53. Obs. 39. p. 90. Obs. 77. p. 160.

8) *Iatrologism. Pentecost.* I. Obs. 48.

TIUS⁹⁾, MANGET¹⁰⁾, HARDER¹¹⁾, KERKRING¹²⁾,
 BERGER¹³⁾, PECHLIN¹⁴⁾, LOWER¹⁵⁾, ALBINI¹⁶⁾,
 ROSSEN¹⁷⁾, STALPERTUS VAN DER WIEL¹⁸⁾, BAL-
 LONIUS¹⁹⁾, TULPIUS²⁰⁾, PISSINI²¹⁾, BARTHOLI-
 NUS²²⁾, SCHENK²³⁾, RIVERIUS²⁴⁾, MALPIGHI²⁵⁾,
 WEPFER²⁶⁾, BLASIUS²⁷⁾, BONETUS²⁸⁾, PEYER²⁹⁾,

ZOLLI-

- 9) *Miscell. med.* L. X. p. 523.
- 10) *Biblioth. anatom.* Genev. 1685. Vol. II.
- 11) *Apiarium observat.* Basil. 1687. p. 55.
- 12) *Specil. anatomicum.* Amst. 1670.
- 13) *Diss. de cordis polypis.* Vitemb. 1689.
- 14) *Observ. physico-med.* Lib. III. Hamb. 1691.
- 15) *De corde.* C. 2. p. 136. Amstel. 1669.
- 16) *Diss. de polypis.* Fref. 1695.
- 17) *Diss. de polypo cordis.* L. B. 1693.
- 18) *Obs. rar.* Cent. I. Obs. 38. p. 151.
- 19) *Epidem. et ephemerid.* Paris 1640 Lib. II.
- 20) *Observ. med.* Lib. I. Cap. 27. p. 51. Tab. II.
- 21) *Epistola de cordis polypo, ad cal. libri de diabete.* Mediol. 1654.
- 22) *Histor. anat. rarior.* Cent. III. histor. 17. T. II. p. 40. fig. 1. 2. 3.
- 23) *Observ. med. rarior.* Lib. II.
- 24) *Observ.* Cent. I. Obs. 82.
- 25) *De polypo cordis.* Opp. Lond. 1686. T. II. et *Tract. de viscerum structura.* Bonon. 1666.
- 26) *Observ. anatom. de apoplex.* Amstel. 1671. p. 124.
- 27) *Observ. med. rar.* Amstel. 1676. P. 5. Obs. I. p. 73. Tab. VIII. fig. 1. 2.
- 28) *Sepulchr. anat.* Lib. I. Cap. 1. Obs. 14. Lib. IV. Cap. 8. Obs. 14. Cap. 11. Obs. 5. 6. Lib. III. Cap. 21. Obs. 3. Lib. IV. Cap. 1. Obs. 13.
- 29) *Parerga et methodus hist. med. anat.*

ZOLLICOFER ³⁰⁾, SNELL ³¹⁾, CRUYSKERKEN ³²⁾,
 GOHL ³³⁾, HOMBERG ³⁴⁾, BONTIUS ³⁵⁾, RAMAZZINI ³⁶⁾,
 LANCISI ³⁷⁾, ALBERTI ³⁸⁾, LUDOLF ³⁹⁾,
 SCHACHER ⁴⁰⁾, GÜTZ ⁴¹⁾, GRATELOUP ⁴²⁾, MO-
 RAND ⁴³⁾, KNIPS-MACOPPE ⁴⁴⁾, BÖHMER ⁴⁵⁾, AN-
 DREAS PASTA ⁴⁶⁾, NEGRI ⁴⁷⁾, TEICHMAYER ⁴⁸⁾,

BOER-

- 30) Diss. de polypo cordis. Argent. 1685.
- 31) Diss. de polypo cordis. Giess. 1702.
- 32) Diss. de polypo cordis. L. B. 1705.
- 33) De cordis polypis ex neglectis haemorrhoidibus.
Berol. 1710.
- 34) *Mem. de l'acad. de sciences des Paris.* 1704. p. 159.
- 35) *Medicina Indorum.* Obs. 8. p. 86.
- 36) *Constit. Epid. A.* 1691. §. 21. *Opp. omn.* Genev.
1717. p. 171.
- 37) *Op. cit.*
- 38) *De polypo cordis.* Hal. 1724.
- 39) *De polypo cordis.* Erf. 1727.
- 40) *Programma de polypis.* Lips. 1721.
- 41) *De polyposis concretionibus variorum in pectore
morborum caussis.* Altd. 1726.
- 42) *Diss. de polypis cordis.* Argent. 1731.
- 43) *Mém. de l'acad. des sciences* 1732. p. 432.
- 44) *De aortae polypo.* Brix. 1731.
- 45) *Obs. anat. rarior.* Fasc. I. in *Praefat.* pag. XII. *Not.*
Et: *diss. de praecavenda polyporum generatione.* Hal.
1736. in *HALLERI Collect. disp. pract.* Vol. II.
p. 625.
- 46) *Epistolae duae, altera de motu sanguinis post mor-
tem, altera de cordis polypo in dubium revocato.*
Bergam. 1739.
- 47) *Theses de polypis praeccordiorum.* Ticini 1776.
- 48) *Instit. med.* Jenae 1741. P. II. Sect. 7. Cap. I.

BOERHAAVE ⁴⁹⁾, FR. HOFFMANN ⁵⁰⁾, LANGGUTH ⁵¹⁾,
 SENAC ⁵²⁾, HEISTER ⁵³⁾, HALLER ⁵⁴⁾, HUBER ⁵⁵⁾,
 VAUGHAN ⁵⁶⁾, CONSBRUCH ⁵⁷⁾, STÖRK ⁵⁸⁾, GÖTZ-
 KE ⁵⁹⁾, HOME ⁶⁰⁾, BADER ⁶¹⁾, LIEUTAUD ⁶²⁾, MOR-
 GAGNI ⁶³⁾, CHESTON ⁶⁴⁾, FANTONI ⁶⁵⁾, HEWSON ⁶⁶⁾,

SEL-

49) Op. c. p. 540.

50) System. med. ration. T. III. Sect. I. Cap. 7. §. 44.

51) Respon. S. G. EICKLER de polypo infantis rhachi-
 tici disputatio. Vitemb. 1744. in HALLERI collect.
 disp. ad hist. morb. fac. T. VI. p. 303.

52) Op. c. *Livr. 4. Chap. 10.*

53) *Med. chir. und anat. Wahrnehm. Rost. 1753. 2. B.*
 p. 62. 132. 296. 460. 871.

54) Elem. physiol. Vol. II. p. 16.

55) Observ. anat. Casell. 1760. p. 33.

56) Diss. de polypo cordis. Edinb. 1761.

57) In diss. fascie. Observat. med. Stutg. 1717.

58) Annus medicus I. p. 118. II. p. 236.

59) Casus medicus practicus de polypo cordis, cum ni-
 mia palpitazione cordis, Annot. pract. et animadv.
 anat. Spir. 1764.

60) *Med. facts and Experim.* p. 132.

61) Observ. medicae, incisionibus cadaver. anatomicis
 illustratae. Friburg. 1762. Obs. I. p. 196.

62) Hist. anat. med. T. II. p. 153.

63) De sed. et causis morborum. Epist. XXIV. 25. Epist.
 LII. 34.

64) *Pathol. inquiries and observ. in Surgery. Gloc. 1766.*
 Vers. Germ. Gothae 1780. edit. *Lond. medical Journ.*
 1785. p. 225. v. *Samml. auserl. Abhandl. f. pr. Aerzte:*
 9. B. p. 226.

65) Observ. anat. med.

Frank Prax. II. 2. 2.

N

SELLE ⁶⁷), HAEN ⁶⁸), STOLL ⁶⁹), BACH ⁷⁰), CLIFTON WINTRINGHAM ⁷¹), JOS. PASTA ⁷⁴), MAINCOURT ⁷⁵), BORSIERI ⁷⁶), KINGLAKE ⁷⁷), RICHTER ⁷⁸), DIETRICH ⁷⁹), WICHMANN ⁸⁰), TIEDEMANN ⁸¹), GÄRTNER ⁸²), WOOD ⁸³), THOMANN ⁸⁴),

HAR-

66) *Exper. inquiries. P. II. p. 192. v. Samml. auserl.*

Abhand. f. pr. Aerzte. 4. B. p. 250.

67) *Beyträge z. Arzneywissenschaft. 2. Th. p. 36.*

68) *Rat. med. P. II. Cap. 7. P. IX. Cap. 2.*

69) *Rat. med. Vol. I.*

70) In BALDINGER's *neues Magazin. 12. B. p. 455.*

71) *De morbis quibusdam Commentarii. Lond. 1782.*

v. Samml. auserl. Abh. f. pr. Aerzte. 8. B. p. 199. §. 11.

74) *De sanguine et sanguinis concretionibus per anathomen indagatis. Berg. 1786.*

75) *De sanguineis lymphaticisque male polypis dictis, concretionibus in corde. Par. 1789. v. HUFELAND der Franz. A. W. 1. B. p. 344.*

76) *Instit. med. pract. Mediol. 1789. Vol. IV. P. I.*

77) *The London medical Journal 1789. Vol. X. P. 4. p. 341. v. Samml. auserl. Abh. f. pr. Aerzte. 13. B. 3. St. p. 385.*

78) *Chir. Bibliothek. 6. B. p. 167.*

79) In *Archiv der pr. Heilkunde für Schlesien. 3. B. 2. St. p. 164.*

80) *Ideen zur Diagnostik. Hannov. 1797. 2. B. §. 81. p. 162. 188.*

81) *Diss. de polypis cordis. Marb. 1804.*

82) *Diss. de polypo cordis in specie infantum. Würceb. 1810.*

83) *The med. and surgical Journal. Vol. 10. p. 52.*

84) *Annales Instituti Clinici Würceburgensis. T. II. p. 99.*

HARLES ⁸⁵⁾, ŁUKOMSKI ⁸⁶⁾, NASSE ⁸⁷⁾, ROSOŁOWSKI ⁸⁸⁾, DEEGEN *) aliique ⁸⁹⁾, praeter auctores recentes de morbis cordis ⁹⁰⁾.

N 2

§. XXXVII.

- 85) *In den Zusätzen zu SCARPA's Werk über die Pulsadergeschwülste. Zürich 1808. et: HUFELAND's Journ. d. pr. Heilkunst. 6. B. p. 559.*
- 86) *De statu et conditione militum morbis cordis gignendis idonea. Vilnae 1815.*
- 87) *Zur Kenntniss der Herzpolypen in HORN's Archiv f. med. Erfahr. 1818. July, August p. 116.*
- 88) *Diss. de polypo cordis. Vilnae 1818.*
- *) *Diss. de polypo cordis. Hal. 1821.*
- 89) *In philosophical Transactions. Lond. 1688. Mens. Aug. N. 168. 1712. N. 335. — Miscell. Nat. Cur. Dec. I. A. I. Obs. 28. A. 2. Obs. 133. A. 4 et 5. Obs. 31. Dec. II. A. 3. Obs. 154. A. 6. Obs. 232. A. 10. Obs. 174. Dec. III. A. 1. Append. p. 118. A. 2. Obs. 16. 18. 178. 185. 189. A. 3. Obs. 24. 166. A. 9 et 10. Obs. 156. 161. — Ephem. Nat. Cur. Cent. I. Obs. 171. Cent. III et IV. Obs. 114. 142. Cent. V. Obs. 86. Cent. IX. Obs. 17. — Acta N. Cur. Vol. II. Obs. 90. Vol. IV. App. p. 113. Vol. V. Obs. 106. — Acta Helvetica Vol. II. p. 123. Acta erudit. Lips. a. 1713. p. 449. — Breslauer Samml. 1717. p. 307. 435. 1722. p. 389. 1723. p. 325. — Hist. de l'acad. des sciences 1750. — Journal de physique 1782. Decembr. — Nov. Acta N. Cur. T. I. p. 6. — HUFELAND's Journal. 1. B. 2. St. p. 162. — Med. Comment. by DUNCAN. Dec. II. Vol. 4. p. 401. v. Samml. auserl. Abhandl. f. pr. Aerzte. 13. B. p. 689. HORN's Archiv f. med. Erfahrung 1810. Janv. p. 28. 52. Journal général de méd. par SÉDILLOT. T. 36. p. 288. — Journal général de méd. par CORVISART 1812. Juin. p. 172.*

§. XXXVII.

*Symptomata. Autopsiae cadaverum.*Sympto-
mata.

1. Aegri, qui defuncti polypos cordis exhibebant, experiebantur, nunc continuo nunc per insultus: dolorem sub sterno ⁹¹⁾, et ad epigastrium ⁹²⁾, dyspnoeam ⁹³⁾, angustias summas ⁹⁴⁾, pulsationem ⁹⁵⁾ cordis, interdum cum peculiari rumore ⁹⁶⁾, eamque ad regionem epigastricam ^{*)}, quid quod ad umbilicum ^{**)} propagatam, alias nullam ^{***)}, pulsum parum frequentem ⁹⁷⁾, modo irregularem ⁹⁸⁾, exilem ⁹⁹⁾, modo regularem ¹⁰⁰⁾,
chor-

90) CORVISART l. c. p. 658. TESTA l. c. p. 299. BURNS l. c. p. 220.

91) MALPIGHI, CHESTON (initium morbi sub deambulatione, imprimis post pastum).

92) Ego (Acta mea Clinica) TESTA l. c.

93) FR. HOFFMANN l. c. KINGLAKE, ego (Acta mea Clinica) inspiratio expiratione longe facilior.

94) FR. HOFFMANN l. c. Deerat in aegro NASSEI l. c. p. 119.

95) FR. HOFFMANN, WICHMANN.

96) CHESTON (ac si aqua baculo percuteretur).

*) Acta mea Clinica, TESTA.

**) BONTIUS (Instar ictus foetus utero reclusi).

***) CHESTON (nec cordis palpitatio normalis percipi poterat).

97) In sexagesima horae parte 80. ictus (ŁUKOMSKI l. c.) 56. (Acta mea Clinica).

98) WICHMANN, ego (sub inspiratione v. Acta mea Clinica).

chordae instar metallicae tensum ¹⁾), saepissime variabilem ²⁾); vibrationem abnormem omnium arteriarum lateris sinistri ³⁾); jugularium dilatationem ⁴⁾ et oscillationem ⁵⁾); cepheam ⁶⁾), anginam ⁷⁾), dyphagiam ⁸⁾), tussin saepe cum sputis cruentis ⁹⁾), decubitus dumtaxat in dorsum, supine ¹⁰⁾), capite elevato ¹¹⁾), vel antrorsum flexo trunco ¹²⁾), prono corpore ¹³⁾) concessum; torpor

rem

99) FANTONI l. c. Obs. 19. p. 52. CHESTON — *Philosoph. Transact.* N. 481. p. 285. 1746.

100) Ego v. Diss. ŁUKOMSKI.

1) MALPIGHI l. c.

2) SENAC l. c.: „on voit par là que de tous les effets que produisent les polypes, il n'y a que l'inégalité variable de pouls qui puisse nous faire soupçonner qu'il y a dans le coeur des concrétions polypeuses.“ Pulsus tamen plane normalis fuit, in aegro TESTA l. c. p. 307. NASSE l. c. p. 119.

3) Non excepta arteria dorsali pedis.

4) MALPIGHI l. c.

5) HOMBERG.

6) HOMBERG (cum agrypnia), CHESTON.

7) KINGLAKE.

8) Ego (Acta Clinica) sub paroxysmo.

9) CHESTON (cum raucedine), WICHMANN (cum sputo rubello) ego (v. ŁUKOMSKI et act. m. Clinica) TESTA, BURNS (cum sputo sanguinis).

10) Acta mea Clinica.

11) VIEUSSSENS l. c. p. 107.

12) WICHMANN.

13) Ego in milite Vilnae sic a mense Novembris A. 1813. in Nosocomio Sti Ignatii usque ad 21. Januarii

rem brachii sinistri ¹⁴⁾, extremitatum frigus ¹⁵⁾, soporem ¹⁶⁾ et syncopem ¹⁷⁾.

Autopsiae
cadaverum.

2. Repertus est polypus, substantiae corneae, albae et in gyros collectae, parte superiore caput corpusque serpentis referens, inferiore vero bifida, et in plurimos postremo soboles divisa, sinistro cordis ventriculo adcretus ¹⁸⁾; — alter, qui radicibus suis inhaerens carneis cordis sinistri fibris, bifido trunco non minus arteriam aortam quam venosam penitus obturaverat ¹⁹⁾; — alter qui utrumque ventriculum et auriculam utramque occupabat, ramosque suos varie divisos in vasa pneumonica et arteriam aortam emittebat ²⁰⁾; — alter utrumque ventriculum cordis, magnitudinis bovini, adimplens ²¹⁾; — alter cavum ventriculi cordis dextri replens, in medio, foramine, per quod sanguis ad arteriam pulmo-

1816. diu noctuque decumbentem. (v. ROSKOWSKI l. c.).

14) MALPIGHI l. c.

15) LANCISI de morte subitanea. L, II. Obs. 4. Acta mea Clinica. CHESTON (cum levi oedemate).

16) TESTA l. c. p. 310.: „Andere, bei denen die Polypen die Höhlen des Herzens ausfüllten, starben schlummersüchtig.“

17) MALPIGHI, SENAC, KINGLAKE.

18) SEVERINUS l. c. similis fere apud WILLISIUM videre est.

19) TULPIUS l. c.

20) BARTHOLINUS l. c.

21) COUSIN l. c.

pulmonalem transiebat, instructus ²²⁾; — alter fibras cordis distendens ²³⁾; — alter, ramos in quatuor vasa magna emittens, corde simul praemagno, complanato, auricula dextra varicosâ et ventriculū magnitudine aemulante ²⁴⁾; — alter, ventriculū cordis dextrum, valdopere dilatatum, inhabitans, cum illius fasciculis contextus ²⁵⁾; — alter, atrium cordis dextrum detinens, ventriculo sinistro maxime dilatato, veluti cartilagineo, valvulisque semilunaribus denticulatis ²⁶⁾; — alter parietibus extenuatis, duplicis quam par est voluminis, adhaerens, in aortam ad longitudinem duorum pedum penetrans ²⁷⁾; — alter, superius ex trabibus ventriculi dextri emergens, circiter duas tertias partes hujus cavi adimplens, in venam cavam superiorem et inferiorem atque in arteriam pulmonalem intrans, auriculâ dextrâ simul dilatatâ, tenui, notisque inflammationis insignitâ ²⁸⁾; — alter, multiplex, fibrosus, adipe circumdatus, auriculae cordis dextrae et ventriculo adcretus, pericardio sero repleto, et trunco arteriae pulmonalis a concre-

tione

22) BOERHAAVE l. c.

23) BOERHAAVE l. c. p. 541.

24) FANTONI l. c. Obs. 8.

25) FANTONI l. c. Obs. 9.

26) VIEUSSENS l. c.

27) HOMBERG l. c.

28) CHESTON l. c.

tionem calculosa oblitterato ²⁹⁾; — alter, firmus, albus, orificium ventriculi sinistri occludens, in aortam penetrans, pericardio, fere cartilagineo, pulmonibusque adhaerente, corde praemagno et atrio illius dextro adeo amplo, ut secundum cor continere potuisset ³⁰⁾; — alter ex flavo albescens instar ligamenti, nidulans in ventriculo dextro cordis, cujus substantia erat admodum rubra, dura, cum atrio cordis anteriore et vena cava descendente dilatatis, orificio arteriae pulmonalis indurato, angusto et aorta punctis osseis notatâ ³¹⁾; — alter steatomati similis ³²⁾; — alter, instar polypi narium, sat conicus, in atrio dextro, dilatato, ortum ducens, et in ventriculum contiguum pendulus adeoque cum eo concretus, ut cor et magnam pulmonum partem, appensa, sustinere valeret ³³⁾; — alter, longitudinis pollicis, in ventriculo cordis sinistro septo firmiter adhaerens, in medio suo abscessum includens, arteriis coronariis ossificatis ³⁴⁾; — alter substantiae membranaceae, tenacis, longitudinis trium pollicum, unius vero pollicis latitudinis, apicem bipartitam offerens, in ventriculo cordis dextro

29) KINGLAKE l. c.

30) TESTA l. c. p. 304.

31) TESTA l. c. p. 308.

32) RIVERIUS l. c. Cfr. WICHMANN et BAILLIE (*Anat. des krankh. Baues* p. 13.).

33) BURNS l. c. p. 226.

34) BURNS l. c. p. 230.

dextro ita libere fluctuans, ut una extremitas ostio venoso, altera arterioso responderet, quin vel in corde vel circa illud, quod contra normam fuisset detectum sit³⁵); — alter instar gemmae rosae evolutae, filamentis tribus ventriculo dextro (cujus superficies interna nulla inflammationis indicia exhibebat) adhaerens, tubo intestinali simul carcinomato³⁶); — tandem alter in atrio cordis sinistro, albus, valde compactus, cum basi quinque lineas lata, in duplicem ramum fissus carneis tendineisque fasciculis ipsius cordis radicitus implantatus, in coni formam assurgens, quadruplici ramo ad ostia venarum pulmonalium tendens, adeo ut longitudine duos circiter pollices, maxima latitudine novem lineas adaequaret; cavum pericardii sex circiter uncias fluidi serosi flavescentis continebat; ipsum pericardium basi cordis multiplici nexu adhaerebat; viscus hoc caeterum sanum erat³⁷).

§. XXXVIII.

C a u s s a e.

1. Mares longe magis quam feminas polypo Praedispo-
nentes.
cordis

35) Ego in Act. Clin. l. c. (Arteria thyreoidea inferior originem suam nequaquam a carotide sed ab arteria innominata trahebat. Turgebat praeterea atro sanguine vena subclavia sinistra nec non jugularis ejusdem lateris).

36) Nasse l. c. p. 124.

37) Lukomski l. c. (in aegro de quo supra N. 1 (97)).

cordis (interdum veluti epidemico³⁸⁾) subjiciuntur³⁹⁾. Nulli aetati ille addictus est. Nexum habere videtur cum psora⁴⁰⁾, epilepsiâ⁴¹⁾, manîâ tum feroci⁴²⁾, tum fatua⁴³⁾, tum melancholica⁴⁴⁾, cum vitiis pulmonum⁴⁵⁾, hydrope⁴⁶⁾, calculo

38) Ait PISSINI: „Per autumnî praesentiam anni 1648. constitutionem adeo frequenter polypi isti in corde inventi sunt, ut ex *quindecim*, qui ex maligna febre interierunt, diligentissime hucusque dissectis, *duodecim* cordis polypo laborasse deprehenso sint.“

39) Inter septemdecim hujus morbi exempla numeravi duodecim mares et quinque feminas.

40) FANTONI l. c. Obs. 8.

41) VIEUSSSENS l. c. p. 107. — GREDINO *Sämmtliche Schriften*. 1. B. p. 350. (in octo epilepticis polypos adiposos in utraque auricula cordis detexit).

42) GREDING l. c. (in duodecim maniacorum furiose delirantium cadaveribus).

43) GREDING l. c. (in novem fatuis polypos in auricula dextra).

44) SILBERMANN praes. MECKEL Diss. de promovendis anatomiae pathologicae administrationibus. Hal. 1790. p. 8.

45) HOMBERG l. o.

46) BAUHINI (apud G. HORSTIUM Opp. T. I. p. 141) monet: „si dabitur hydropici vel plithisici, diligenter cordis ventriculos inspicias, aliquoties enim excrescentiam ramosam reperi per vasa in pulmones delatam.“ Idem observare licuit WEFFERO, qui feminam ascite et anasarca diu aegrotantem, tandemque fatis concedentem, aperuit invenitque cordis sinistrum ventriculum et aortam a contentis polypis in insignem

calculo bilioso ⁴⁷⁾, diarrhoea ⁴⁸⁾, haemorrhoidibus ⁴⁹⁾, et suppuratione mammae ⁵⁰⁾. Cavitas cordis dextra prae sinistra polyporum evolutioni favere videtur ⁵¹⁾.

2. Secuta est *evolutio* polypi cordis: ictum ^{Excitan-} super pectus ^{tes.} ⁵²⁾, lapsum in latus sinistrum ⁵³⁾, graves labores ⁵⁴⁾, cursum ac potum liquorum fermentatorum ⁵⁵⁾ et aquae frigidae aestuante corpore ⁵⁶⁾, nec non animi pathemata ⁵⁷⁾. Addunt lipothymias ⁵⁸⁾, forte magis effectum quam causam polypi.

3. Generatio polyporum cordis derivata est: Proxima. ex coagulo cruoris ⁵⁹⁾, ex crusta phlogistica sanguinis ⁶⁰⁾,

magnitudinem extensos (Diss. de apoplexia p. 200.).

Et SENAC l. c. p. 464.

47) CHESTON l. c.

48) TESTA l. c. p. 310.

49) Acta mea Clinica l. c. GOHL l. c.

50) KINGLAKE l. c.

51) HALLER de corp. humani fabr. T. III. p. 41. NASSE l. c. p. 132.

52) KINGLAKE l. c.

53) TESTA l. c. p. 304.

54) Ego v. ŁUKOMSKI diss.

55) Acta mea Clinica l. c.

56) NASSE l. c.

57) SENAC l. c. p. 461. TESTA l. c. p. 307.

58) SALIUS DIVERSUS de Syncope cardiaca. SENAC l. c. p. 464.

59) Veteres fere omnes. Adhuc BURSERIO caussa proxima polypi visa est esse motus sanguinis imminutio-

guinis ⁶⁰), ex succis lymphaticis et globulis sanguineis ⁶¹), ex depositione substantiae organicae ad parietes cavitatum cordis aliunde aegrotantis ⁶²), et ex lymphä coagulabili vi inflammationis

nem sive quietem. (Inst. Med. T. IV.): „lipothymia, inquit et multo magis syncope, inter primas causas remotas (polyporum) spectant.“ In iis animalibus, quae ob venenatum viperarum morsum interierunt, congelationes sanguineas esse inventas, testatur REDI (*Osservuzioni intorno alle vipere.* 1664. p. 59.).

60) MALPIGHI l. c. p. 66 — 74. (Credit crustam inflammatoriam esse matrem polyporum).

61) „... Nous pouvons déterminer qu'elle est la matière des polypes. Ceux qui sont blancs sont composés des sucs lymphatiques et des autres sucs blanchâtres qui se sont épaissis, ou plutôt qui se sont condensés, en se séparant des molécules rouges. Mais les polypes rouges sont un tissu ou un composé surtout de deux matières, sçavoir de la lymphe et des globules du sang.“ SENAC l. c. p. 447.

62) BURNS l. c. p. 221. „Im gesunden Zustande verweilet das Blut weder in dem Herzen noch in den Gefässen; es ist in beständiger Bewegung und kreist nach dem Zustande seiner Behälter mehr oder minder schnell. Niemals bleibt es im normalen Zustande mit den Wänden des Herzens so lange in Berührung, daß es durch die Einwirkung derselben verändert werden könnte. Wenn aber bei Krankheiten des Herzens eine Störung seiner Verrichtungen entsteht, so wird das Blut in den Höhlen dieses Organes länger, als sonst und als es sollte, zurückgehalten, und es erleidet dann durch seine Einwirkung auf das Herz und durch die Reaction des letzteren eine Veränderung, welcher zufolge sich aus ihm

nis exsudata ac in pseudomembranam conversa ⁶³⁾, quam ultimam opinionem et nos, analogiae inflammationum cavitatum narium, tracheae, intestinorum uteri, vesicae urinariae (quatenus etiam productiones polyposas largiri solent) innixi, amplectimur.

§. XXXIX.

D i a g n o s i s.

1. Debet vero iste *legitimus polypus cordis*, Distinctio.
probe a simplici coagulo fibrillae sanguinis (*polypus spurius*) distingui. Ille in vivo homine, nisi ut caussa primaria morbi, saltem ut memorabilis ejus effectus existit; hinc dumtaxat aut ultimae vitae momentis, aut brevi post mortem efformatur. Conciliatur sic famosissima lis circa quaestionem *utrum polypus cordis in homine vivente locum habeat, aut mortis sit productum*. Primam opinionem defenderunt MALPIGHI, MANGET, PECHLIN, PEYER, BOERHAAVE, HALLER, LANCISI, CHESTON, KINGLAKE, HAEN, SELLE,

ein neu organisirter Stoff an die Wände der Herzhöhle; worin diese Veränderung vorgeht, absetzt.“

63) CHESTON Samml. auserl. Abhandl. f. pr. Aerzte. 11.

B. p. 241. KREYSIG op. c. 2. Th. p. 396. TESTA l. c.

p. 306.: „Der Zusammenhang der ächten Polypen mit

den Entzündungen, aus denen sie entstehen, wird desto

deutlicher, je mehr wir an die Aehnlichkeit derselben mit

den widernatürlichen Häuten, sehr gewöhnlichen Folgen

der Entzündung, erinnert werden.“

SELLE, WICHMANN, MAINCOURT, THOMANN, aliique; alteram sustinerunt KERKRING, LIEUTAUD, ANDREAS et JOSEPHUS PASTA, BAILLIE et BICHAT. Sicuti vero distinctio polypi legitimi a spurio in theoria facilis est, ita difficilis in praxi. Neque id mirum; re enim ipsa pseudomembranae (polypi legitimi) ex fibrina sanguinis (origine polyporum spuriorum) generantur ⁶⁴). Praeterea in cadaveribus praesentia unius illam alterius non excludit. Nihilominus vix errabimus praesentiam *polypi legitimi* admittendo: 1° dum corpus polypiforme cordis auriculis aut ventriculis firmiter adhaeret ac in iis radices agit; aut 2° dum illud corpus, a basi sua revulsum, libere fluctuat, quin caeterum morborum quid, ex quo de aegroti angustiis aliter ratio reddi posset, in cadavere invenitur ⁶⁵); 3° dum corpus polypiforme adspectum organicum, colorem album seu flavum habet, firmum, cellulosum, adiposum, carnosum est, a parte rubra sanguinis non circumdatur, sed potius propriis vasis sanguiferis instruitur ⁶⁶); 4° dum morbus sub rerum

posi-

64) Pulchre ait VOIGTEL (*Handbuch der pathologischen Anatomie*. 1. B. p. 410.): „Die Entstehung beiderlei Arten der Polypen des Herzens und der Arterien und beider Stoff, ist gewiss einerley. Es ist gerinnbare Lymphe des Blutes.“

65) §. XXXVII. N. 2 (7).

66) Haec vasa a MALPIGHIO animadversa, a VALSALVA et a MORGAGNIO negata, ipse non vidi. Ait vero

positionibus, alias evolutioni polypi cordis faventibus, exortus est ⁶⁷⁾; et 5^o dum oppressio dolorifica sub sterno, motus abnormis cordis, suffocationis periculum sub determinata corporis positione, accessus dyspnoeae et angoris periodici, atque lipothymiae observantur.

2. Scias vero inter istiusmodi symptomata ^{Symptomatum incertitudo.} non solum nullum dari quod *pathognomonicum* dici posset, sed nequidem ea inveniri, quae simul sumta diagnosin polypi cordis, certam redderent. Omnes enim cordis et vasorum majorum morbi, qui sanguinis circulum intercipere ac hujus musculi motum impedire queunt, symptomata, illis polypi similia, gignere valent ⁶⁸⁾. Nec satis! etiamsi signa polypi cordis plus minus certa darentur, illa, a symptomatibus aliorum morborum, cum quibus polypus ille ut plurimum societatem inire solet ⁶⁹⁾, necessario obfuscari deberent.

3. Quodsi

(TESTA l. c. p. 301.): „*was mich betrifft, so bin ich vom Duseyn dieser Gefäße überzeugt, weil ich sie nicht allein in den widernatürlichen Häuten, die auch eine Folge der Entzündung sind, sondern auch in der Speckhaut des Blutes bemerkt habe.*“

67) §. XXXVIII. N. 1. 2.

68) „*Il ne sera donc pas facile de connaitre les polypes dans le corps vivant, parceque leurs effets sont les mêmes que ceux des obstacles qui s'opposent au cours du sang dans le coeur.*“ SENAC l. c. p. 470.

69) Ad illos morbos potissimum dilatationem ventriculorum cordis spectare ex tradita autopsia cadaverum

De sede
polypi.

3. Quodsi medicus suspicionem de praesentia polypi cordis patefaciat, nil impedit, quominus, praeunte SENAC ⁷⁰⁾, conjecturam ad ipsam peculiarem sedem polypi indicandam extendat. Nisi enim in loco indicato polypus inveniat, saltem alterius generis obstaculum ibi expectandum erit. Denunciant tale quid in *auricula aut ventriculo cordis lateris dextri* — signa indicantia difficultatem depletionis *venae cavae*, hinc, quoad *descendentem* illam, oscillatio jugularium dilatatarum, livor faciei, vertigo, — quoad *adscendentem*, tumor hypochondrii dextri, dolor abdominis, diarrhoea; et in genere absentia signorum congestionem circa pulmones indicantium. E contrario si obstaculum in *auricula aut ventriculo cordis lateris sinistri* haereat, expectanda sunt signa quae impedimentum depletionis *venarum pulmonalium* indicant, inter quae praeprimis dyspnoea, tussis, cum sputis cruentis. Debet quoque ex pauca in aortam perducto sanguine, pulsus esse exilis, nullus, unde lipothymiae expectandae sunt.

Vermes
cordis.

4. *Vermes* sic dicti *cordis*, formae teredinum ⁷²⁾,

apparet. Confirmatur praeterea a STEWART in *the Edinburgh medical and surgical Journal* 1817. N. 50. April. (Aeger dolorem hypochondrii sinistri ac si morbus lienis adesset, et dolorem scapulae lateris quoque sinistri experiebatur. Improviso mortuus est).

⁷⁰⁾ l. c. p. 472.

num ⁷²⁾, cimum ⁷³⁾, ascaridum ⁷⁴⁾, et serpentum ⁷⁵⁾ procul dubio nil aliud nisi polypi fuerunt. Ad hos quoque spectant *excrecentiae* nunc *verrucosae* ad superficiem internam ventriculi dextri cordis, — nunc *condylomaticae* et *spongiosae* ad superficiem cordis externam; nunc *sarcomatosae* ad orificium aortae ⁷⁶⁾. Reperiuntur praesertim in syphiliticis. Cum adeo parvae sint ut circulum sanguinis vix aut ne vix quidem impedire possint, peculiaris symptomata inde non expectamus.

§. XL.

72) BONETI sêpulchr. Anat. Lib. I. Sect. 18. Obs. 6. Lib. II. Sect. 11. Obs. 3. §. 1 et 2. Lib. IV. Sect. 1. Obs. 62. — SCHENK Observ. Med. Lib. II. p. 193. — BELOW Diss. de vermibus intestinalibus. Lugd. Bat. 1691. — Miscell. Nat. Cur. Cent. VIII. Obs. 1. — BOERHAAVE l. c. p. 497. — LIEUTAUD l. c. Lib. II. Sect. 2. Obs. 572 — 574. T. II. p. 176.

73) ZACUTUS LUSITANUS Prax. mirab. Lib. I. Cap. 139.

74) ANDR. SPIGELIUS de Lumbrico lato. Pat. 1618. Cap. 5. — BONET l. c. Lib. II. Cap. 7. Obs. 163. *Histoire de l'académie des sciences. A. 1700. Obs. 10.* — PALFIN Anat. du corps humain. Par. 1753. T. II. Chap. 3. — LE CLERC hist. natur. et med. latorum lumbric. Cap. 13.

75) ZACUTUS LUSITANUS l. c. L. I. C. 140. — MARC. AUREL. SEVERINUS de recond. abscessuum natura. Neapol. 1632. p. 281. — BONET l. c. Lib. II. Sect. 4. Obs. 6. §. 1. — RIOLANI Enchirid. anat. patholog. Paris. 1648. Lib. III. Cap. 8. — Acta Natur. Cur. T. VII. Obs. 14.

76) TESTA l. c. p. 314.

Frank Prax. II. 2. 2.

§. XL.

P r o g n o s i s. C u r a.

Prognosis. 1. Polypus cordis tum per se, tum ob morbos socios, artis nostrae imperium superat. Prognosis eo cautior instituenda, cum haud raro aegri morte improvisa mulcentur ⁷⁷). Verum et lenti interitus haud desiderantur exempla ⁷⁸).

2. Ad

⁷⁷) „ . . . les exemples de ces morts inopinées se présentent dans une infinité d'ouvrages. SEGERUS dit que les polypes entraînent après eux des catarrhes suffocatifs. HIPPOLITE BOSIUS a observé qu'une femme qui mourut subitement avait dans le ventricule gauche du coeur une concrétion graisseuse. Un homme selon le rapport de RUMLERUS mourut dans un instant: les ventricules étaient remplis d'une matière blanche et ténace. TULPIUS trouva dans le ventricule gauche d'un homme une concrétion pituiteuse attachée aux fibres du coeur, prolongée dans l'aorte et dans les artères du poulmon, elle étoit enveloppée d'une membrane. BARTHOLIN nous a laissé des exemples semblables; l'un est appuyé du témoignage de SIMON PAULI, l'autre est rapporté d'après l'observation d'un chirurgien. Enfin PORTHUS raconte qu'un Duc de Ferrare qui fut enlevé par une mort subite avait dans la cavité gauche du coeur une masse de graisse aussi grosse qu'une chandelle.“ SENAC l. c. p. 476.

⁷⁸) „ Mais il y en a qui périssent insensiblement. MANAGETA raconte qu'un homme mourut d'une mort lente; que la respiration fut interceptée peu à peu, sans aucune cause apparente; qu'on trouva dans les ventricules du coeur des polypes qui étoient placés près des

2. Ad praecavendam formationem polypi me- Cura.
thodus antiphlogistica, et inprimis venae sectio-
nes inserviunt. At vero polypo jam formato,
quid prodesse posset, incassum quaesivimus.
Ad illum solvendum proposita fuere plantae ma-
rinae interque eas *corallium*, et *muscus marinus*
lapideus, sive *corallina* ⁷⁹⁾, — item *aqua calcis*
et *sapo* ⁸⁰⁾. Vana conamina! Porro non agitur
solum de solvendo polypo, sed quoque de abi-
gendis morbis cum illo complicatis. Satis hinc
habemus, aliquod afferre levamen ⁸¹⁾.

O 2

CAPUT

valvules.“ SENAC l. c. p. 477. Aegri mei morte lenta
periere.

79) BERGEN l. c. §. 18. p. 36.

80) SENAC l. c. p. 480.

81) Scopum istum assequuntur, methodo infra indican-
da. Cap. XI. §. XLV.

CAPUT XI.

De lithiasi pericardiaca atque de angore pectoris.

§. XLI.

De sede speciali lithiasis pericardiaca.

- L. pericardii. 1. Detectum est *pericardium* osseum circa venam cavam superiorem ¹⁾. Exhibuit illud quoque lamellas osseas ²⁾. Alias notatum fuit punctis osseis tribus in locis ³⁾.
- L. universae substantiae cordis. 2. Visa est *substantia cordis* maxima ex parte ossea ⁴⁾. *Cordis* medium circumdabat concrescimen-

- 1) WALTER *Observat. Anat.* p. 63. *Anat. Museum.* 1. B. p. 149 et 297.
- 2) AURIVILLIUS in novis actis scientiarum Upsaliens. 1773. Vol. I. p. 101 (aderat simul symphysis).
- 3) WALTER *Anat. Museum.* 1. B. p. 148. N. 296. Cfr. SENAC l. c. p. 68. HALLER addenda ad *Elem. Physiol.* p. 128. — *Mémoires de SULLY Liv. IX.* p. 120.
- 4) *Histoire de l'acad. de Paris. Année 1726.* p. 24. — MICHAELIS *prakt. Bibl.* 1. B. p. 116. — MOHRENHEIM *Wienerische Beyträge.* 2. B. p. 112. — Cfr. *Ephem. N. Cur.* Dec. II. A. I. p. 326. — *Acta Nat. Cur.* Vol. IX. Obs. 85. p. 357. — HORET *Observ. med.* T. II. Lib. IV. Obs. 47. — KERKRING *Specileg. Anat.* Obs. 78. — ZACUTUS LUSITANUS *Prax. med.*

crementum osseum circulare ⁵⁾. Observabantur concrementa ossea ad cordis basin ⁶⁾, apicem ⁷⁾, superficiem ⁸⁾, nec non in illius substantia ⁹⁾. Haec erat materie terrea referta ¹⁰⁾ cumque lapide magnitudinis primae phalangis digiti minimi ¹¹⁾.

Facies

admirandae Lib. I. Cap. 161. — VAN DOEVEREN Spec. Observ. Anat. p. 71. — CRÜWELL Diss. de cordis et vasorum osteogenesi in viro quadragenario observata. Hal. 1775. — J. VAN HEERKEN de osteogenesi praeternaturali. Lugd. Bat. 1797. — HALLER Prael. ad BOERHAAVE Inst. Vol. 3. p. 501. Elem. Physiol. Vol. VIII. P. II. p. 78. De corporis humani fabrica Lib. IV. Sect. 3. p. 128. — Gemma Cyclo-
gnom. Lib. II. p. 75. — SCHENK Obs. med. Obs. 188. p. 357. — RIEDLIN lineae med. 1696. mens. Septemb. Obs. 28. p. 520. — LIEUTAUD Hist. Anat. med. Lib. II. Sect. 2. Obs. 556—563. T. II. p. 173.

5) HALLER de corporis humani fabrica Lib. IV. Sect. 3. §. I. p. 128.

6) SOEMMERRINO zu BAILLIE p. 26. Anmerk. 49.

7) *Abhandlungen der chirurg. medic. militair. Akademie in Wien.* 1. B. Tab. VII. p. 287. Cfr. BARTHOLINUS hist. anat. Cent. I. hist. 50. T. I. p. 77. BLANCARD anat. pract. rat. Cent. II. Obs. 43. p. 260. Obs. 56. p. 272.

8) MORGAGNI de sed. et caus. morb. Epist. XXVII. 16. BAILLIE *Engravings. Fasc. I. Tab. 5.*

9) CHESelden Osteograph. Tab. I. fig. 5.

10) BONET Sepulchr. Anat. T. I. p. 820. 825.

11) BLASIUS Obs. med. rat. Part. VI. Obs. 13. p. 81. Cfr. Part. VI. Obs. 5. p. 77. Similia exempla describunt SCHURIC Lithologia Cap. II. §. 22. p. 123. Cap. V. §. 10. p. 332. SALZMANN Diss. de ossificatione

Facies externa cordis globulis parvis lapideis notabatur ¹²⁾).

L. septi-
ventricu-
lorum.

3. Erat *septum ventriculorum cordis* omnino osseum ¹³⁾, a basi usque ad apicem lamina ossea denticulata insignitum ¹⁴⁾, cumque osse complanato pollicum quatuor et dimidio in medio substantiae suae ¹⁵⁾.

L. ventri-
culorum
et auricu-
larum.

4. Reperiebantur *ventriculi cordis* a concremento osseo latitudinis duorum pollicum obducti ¹⁶⁾, cum trabibus unius ventriculi osseis ¹⁷⁾,

praeternaturali. Argent. 1720. — Ephem. Nat. Cur. Dec. I. An. I. Obs. 44. Dec. II. A. I. Obs. 133. A. 5. Obs. 33. Dec. III. A. I. App. p. 103. A. 9 et 10. Obs. 89. — HÖRST Opp. T. II. p. 208. — KERKRING Spec. anat. Obs. 78. — SCHENK Obs. Lib. II. Obs. 197. — *Philosoph. Transact.* 1665. Jul. p. 65. MEIBOM Diss. de calculo renum. Helmst. 1679. §. 2. — MEEKREN Obs. med. chir. Cap. 35. — *The Lond. med. Journal* 1789. Vol. 10. p. 344. *Samml. auserl. Abh. f. pr. Aerzte.* 13. B. SWIETEN Comment. in BOERHAVII Aphorism. T. V. p. 218. — MECKEL *sur les maladies du coeur* l. c. — LIEUTAUD l. c. T. II. p. 174. HALLER de corporis humani fabrica. Lib. IV. Sect. 3. §. I. p. 128. Ejusd. *opusc. pathol.* p. 134.

12) MORGAGNI Epist. LXVIII. 12.

13) BOERHAAVE Prael. in instit. proprias. §. 478. — COLUMBIER de re anatom. Lib. XV. p. 489.

14) WATSON *medical communications.* Lond. 1774. Vol. I. p. 228. BLUMENBACH's *med. Biblioth.* 2. B. p. 328.

15) *Hist. de l'acad. des sciences* l. c.

16) BORDENAVE in *Samml. auserl. Abhandl. f. pr. Aerzte.* 1. B. 2. St. p. 64.

seis ¹⁷⁾, cum tribus lapidibus coloris aeruginosi ¹⁸⁾, ponderis unciarum duarum ¹⁹⁾. Observatus est *ventriculus cordis sinister* veluti massa calcarea obductus ²⁰⁾, cum osse ²¹⁾ in parte sua carnosa superiore ²²⁾, cum lapide longitudinis pollicis ²³⁾, auriculaque corpore partim osseo partim lapideo ²⁴⁾ insignita. Exhibebant *auricula* et *ventriculus cordis lateris dextri* lamellas osseas ²⁵⁾; hicque ad partem inferiorem saxeam duritiem ²⁶⁾.

5. Com-

17) Acta N. Cur. T. I. Obs. 170. RIOLANUS Anthropologia. L. III. C. 12. (in corde Reginae Matris MARIAE MEDICIS).

18) CARMUTII excussio brevis praecipui morbi, nempe palpitationis cordis Maximiliani secundi. — CRATO DE KRAFTHEIM consilia. Vol. III. p. 76 — 82. Vol. V. p. 56. — MERCURIALIS responsa et consultat. med. T. III. p. 270. Venet. 1620. — WIERUS de praestigiis daemonum. Libr. IV. C. 16. — POTINI Consilium pro Maximiliano Caesare palpitationibus laborante. Brixiae 1573.

19) BURNET Thesaur. Medicinae.

20) RENAULDIN *Journal de méd. continué par CORVISART*. Vol. IX. p. 255.

21) BARTHOLIN l. c. Cent. II. hist. 45. T. I. p. 243. (historia Summi Pontificis URBANI VIII.).

22) HAEN rat. med. III. Vol. P. VI. Cap. 4.

23) KULMUS Acta Erud. Lips. A. 1727.

24) CHAMBON DE MONTAUX *Merkwürdige Krankengeschichten und Leichenöffnungen*. Leipz. 1791. p. 340.

25) CRÜWELL l. c.

26) HALLER opusc. pathol. p. 135.

L. valvularum.

5. Communissima est *ossescentia valvularum* ²⁷⁾, tum illarum, quae spectant ad ostia venosa ²⁸⁾, tum illarum, quae ostiis arteriosis appositae sunt ²⁹⁾.

6. Nec

27) Ait ALLAN BURNS (l. c. p. 187.): „Die Klappen der Vorhöfe leiden seltner, als die Arterienklappen, und die der rechten Herzhälfte seltener, wie die der linken.“

28) BAILLIE (*Ueber d. krankhaften Bau* l. c. p. 21.) docet valvulas ad venas spectantes rarius osséas reddi; at verò contrarium docent observationes VIRUSSENS (l. c. p. 201.), BANG (*diarium Nosocomii Hafniensis* 1785. Jul.) et meae.

29) REIGER in Eph. N. Cur. Dec. I. A. 3. Obs. 282. p. 478. — LITTRE in *Mém. de l'acad. des sciences* 1713. — *Acta Lipsiensia* 1730. — *Abhändl. d. Schwed. Akad.* 27. B. p. 307. B. 29. p. 175. — *Med. Transact.* Vol. III. p. 12. — LIEUTAUD *Lib. II. Sect. II. Obs.* 577. T. II. p. 177. LANCISIUS de motu cordis. Opp. T. II. p. 250. — PEYER *Method. hist. anat. pathol.* p. 100. — COWPER *Myotomia.* Tab. XI. fig. 4. 6. — BAADER *Observ. med. incision. Cadav. illustrata.* Obs. XL. p. 190. — MORGAGNI *Epist.* VIII. 4. *Epist.* X. 19. *Ep.* XVII. 12. *Ep.* XXI. 15. *Ep.* XXIII. 8. *Ep.* XIX. 49. *Ep.* XXXVII. 30. *Ep.* XL. 23. *Ep.* XLVIII. *Ep.* XLII. 4. — SENAC op. c. T. II. p. 333. — RUYSCH *Observ. anat. chir.* Obs. XXI. VIEUSSENS op. c. p. 107. — THEMELN *Obererzgebürgisches Journal.* Freib. 1748. 2. St. p. 75. — HAEN *Rat. med.* Vol. 3. P. VII. Cap. 2. — HALLER *Elem. physiol.* T. I. p. 333. — STOLL *Rat. med.* Vol. I. — MECKEL *sur les maladies du coeur* l. c. — SANDIFORT *Observ. anat. pathol.* Lib. I. Cap. 4. p. 30. Cap. 2. p. 48. — MALA-

6. Nec rara admodum sunt *arteriae cor-^{L. arter.}
nariae osseae redditae* exempla ³⁰⁾. Adhaerebat <sup>coronaria-
rum.</sup>
illis etiam lapillus ³¹⁾.

7. Lithiasis cordis interdum *socia* habet <sup>Observa-
tio.</sup>
ossificationes arteriarum ³²⁾, venae cavae ³³⁾,
muscu-

CARNE *Discorso sulla litiasi delle valvule del cuore.*
Torino 1787. item *Giornale per servire di storia raggio-
nata della medicina di questo secolo. T. VI. p. 154.*
Vers. hab. in KÜHN und WEIGEL's *Ital. med. chir.*
Bibl. 1794. 2. B. 1. St. p. 182. SCHLEGEL *neue med.*
Literatur. 1. B. 1. St. p. 133. — LULLIER v. *Bibl.*
Britannique 1807. Mai. et *Abhandl. f. pr. Aerzte.* 24.
B. 3. St. p. 477. (caries valvularum mitralium ossi-
ficatarum). CH. LUCAE *Progr. de depositionibus cre-
taceis intra cordis valvularum arteriarumque substan-
tiam.* Marb. 1815. K. A. HERING *diss. de osteo-
genesi valvularum cordis praeternaturali.* Lips. 1819.
c. tabb. aen.

30) DRELINCOURT in BONETI *sepulchr. anat.* Lib. I.
§. 12. Add. Obs. 8. — THEBESIVS *disput. de circulo*
sanguinis in corde. §. 4. BIANCHI *Epist. de Monstris.*
— DEIDIER SENAC *Op. c. L. VI. Chap. VIII.* §. 10.
MORGAGNI *Ep. XXIV.* 17. — CRELL *resp. REINHOLD*
de arteria coronaria instar ossis indurata. Vitemb.
1740. in HALLERI *Coll. disp. ad morbor. hist. fac.*
Vol. II. N. 66. LIEUTAUD l. c. Lib. II. Sect. 2. Obs.
564. T. II. p. 174. alique infra. §. XLIV. N. 2 (19).
citandi.

31) BELLINI *de morbis pectoris.* Opp. Venet. 1708.
p. 618.

32) Cfr. Cap. XV.

33) CRÜWELL l. c.

musculorum pectoralium ³⁴⁾, cartilaginum costarum ³⁵⁾, calculos rennum ³⁶⁾, ne dicamus de aliis vitiiis pericardii et cordis.

§. XLII.

S y m p t o m a t a.

Genera-
tim,

1. Aegri, in quorum cadaveribus osteogenesis pericardii et cordis detecta est, interdum nil, quod talis vitii susceptionem moveret, patefecerunt ³⁷⁾.

34) Idem ibid.

35) CRÜWELL l. c. saepissime vidi.

36) A. 1810. in consilium vocatus sum pro Comite TYSZKIEWICZ, viro sexagenario, podagrae modo ad extremitates evolutae, modo pectori infensae, calculo rennum obnoxio, nunc oedemate crurum insigni et hydrothorace detento. Eo parum post demortuo, cadaver dissectum fuit. Quamvis haec dissectio duodecima post mortem hora susciperetur, corpus tamen jam vehementer foetebat. Epidermis a scroto et cruribus per simplicem attactum decidebat. Tegumenta pectoris adipis insigni copia referta erant. Costae tres inter se per musculos ossificatos intercostales cohaerebant. Cavitas dextra pleurae libram seri continebat. Pulmones erant concretionibus saxeis referti. Dexter diaphragmati adhaerebat. Cor ossificationes valvularum mitralium exhibebat. Arteriae coronariae osseae erant et ad diametrum trium pollicum dilatatae. Conspiciebatur aorta usque ad diaphragma dumtaxat ad partem posticam sana, sub diaphragmate vero omnino ossea. Arteriae iliacae itidem punctis osseis erant notatae. Ren uterque praesertim dexter calculis repletus. Substantia illorum friabilis.

runt ³⁷⁾. Maxima illorum pars laborabat cruciatibus veluti rheumaticis, artuum plantarumque pedum ³⁸⁾, cephalaeâ, dolore epigastrii ³⁹⁾, scapulae, sterni, imprimis regionis cordis (ab actu thoracis sinistri) aucto ⁴⁰⁾; tussi, oppensione pectoris, dyspnoeâ, sensu suffocationis, decubitu in latera impedito, vomitu, regurgitatione ciborum *), aphonîâ ⁴¹⁾, agrypniâ et lipothymiis. Cor quidem saepissime, at non semper ⁴²⁾, vehementer, crebro et irregulariter palpitabat. Pulsus erat modo vix perceptibilis, imprimis in carpo sinistro ⁴³⁾, modo parvus intermittens ⁴⁴⁾, modo regularis et plenus ⁴⁵⁾, saepe motui cordis haud respondens. Maxima aegrotorum pars praevio hydrope ascite, et oedemate pedum lente periit; nonnulli improvisè mortui sunt ⁴⁷⁾.

2. *Valvulis tricuspidalibus osseis* redditis ^{S. l. val-} observari solebat venarum jugularium et regionis ^{vularum.} epigastricae oscillatio, hypochondrii dextri tensio, cutis.

37) *Abhandl. d. K. K. Joseph. chir. Akad. 1. B. p. 239.*

38) RENAULDIN l. c.

39) CRÜWELL l. c.

40) RENAULDIN l. c.

*) CRÜWELL l. c.

41) Idem, ib.

42) BURNS l. c. p. 148. (nulla aderat palpitatio cordis).

43) MICHAELIS l. c.

44) Talem fere semper inveni.

45) RENAULDIN l. c.

47) CRÜWELL l. c.

cutis color ex rubro coeruleus pulsus haud multum irregularis, respiratio quiescente corpore vix laboriosa, cum proclivitate ad lipothymias ⁴⁸). — *Valvulis semilunariibus arteriae pulmonalis ossificatis*, plerumque occurrunt summa palpitatio cordis, sensus suffocationis alternatim cum lipothymiis ⁴⁹), plurima morbi coerulei symptomata ⁵⁰), et macilentia ⁵¹). *Valvulis mitralibus lithiasi correptis* *), animadvertuntur, respiratio summopere difficilis; palpitatio cordis (inprimis post motum); pulsus irregularis, frequentissimus, parvus ⁵²), durus ⁵³); decubitus nonnisi antrorsum flexo corpore concessus ⁵⁴); dolor lateris thoracis sinistri ⁵⁵), epistaxis et diarrhoea cruenta ⁵⁶);

haemo-

48) Sic et CORVISART l. c. p. 202. — et BURNS l. c. p. 33. — et KREYSIG l. c. 2. Th. p. 600. aliique (HORN Archiv f. med. Erfahr. 4. B. 1808. p. 296.) docent.

49) KINGLAKE in London medical Journal. 1789. Vol. IX. P. 4. p. 341. v. Abhandl. f. pr. Aerzte. 13. B. 3. St. p. 385. — KREYSIG l. c. p. 603.

50) Cap. VI. §. XVIII. N. 1.

51) BURNS l. c. p. 188.

*) Idem l. c. p. 30.

52) CORVISART l. c. p. 198.

53) WARREN New England medical Journal. Boston. 1812. N. 3.

54) HEBERDEN l. c. p. 56.

55) BANG Auszüge aus dem Tagebuche des Friedrichs-Hospitals in Kopenhagen, übers. v. JUGLER p. 84.

56) ABERNETHY Abhandl. der med. chir. Gesellschaft zu London. Uebers. v. OSANN p. 33.

haemoptoe ⁵⁷⁾ et tussis ⁵⁸⁾. — *Valvulis semilunilibus aortae ossescentibus* obveniunt dyspnoea, suffocationis periculum cum pulsu vix perceptibili ⁵⁹⁾, intermittente, forti, pleno, duro in carpo dextro; parvo, molli et vix perceptibili in sinistro ⁶⁰⁾, cum motu cordis non cohaerente ⁶¹⁾; palpitation cordis ⁶²⁾, crebrae lipothymiae ⁶³⁾, pneumonorrhagia ⁶⁶⁾, hydrops. Scias vero, oportet, haec symptomata non speciatim ad lithiasin valvularum spectare, sed generatim ex omnibus caussis proficisci, quae, ostia cordis angustando, ingressui sanguinis obstant ⁶⁷⁾.

3. Aegri, quorum cadavera *lithiasin arteriarum coronariarum* exhibuerunt quorumque histologiae potissimum sedulitati HEBERDENII ⁶⁸⁾, FOTHER-

THER-

57) FILTINO in HUFELAND's *Journal*. 16. B. 1. Hest. p. 154. HORN *Archiv f. med. Erfahr.* 1. B. 1812. p. 575.

58) LULLIER l. c.

59) BOERHAAVE l. c. p. 506.

60) CORVISART l. c. p. 243. (Angustata simul erat arteria subclavia sinistra).

61) BURNS l. c. p. 188.

62) SENAC l. c. p. 405.

63) KREYSIG l. c. p. 598 (ex PASTA).

66) CORVISART l. c.

67) Cfr. Cap. XII. §. LII.

68) *Medical Transactions published by the college of physicians in Lond.* 1778. Vol. II. p. 59. et Vol. III. p. 3. — Commentarii de morborum historia et curatione. Edit. cura SOEMMERRINO Fr. ad Viadr. 1804.

THERGILLII ⁶⁹⁾, PARRYI ⁷⁰⁾, WALLII ⁷¹⁾, PERCIVALI ⁷²⁾, RINGII ⁷³⁾, BLACKII ⁷⁴⁾, SLUISII ⁷⁵⁾, KREYSIGII ⁷⁶⁾, aliorumque ⁷⁷⁾ debemus, symptomatibus *anginae* seu *angoris pectoris* ⁷⁸⁾ excruciantibus.

69) *London medical Observ. and inquiries. Vol. V.*

70) *An inquiry into the symptoms and causes of the Syncope anginosa commonly called angina pectoris illustrated by dissections. Bath. 1799.*

71) *Arzneykundige Abhandl. von London. 3. B. p. 10.*

72) *Auserl. Abhandl. f. pr. Aerzte. 10. B. p. 708.*

73) *Medical and physical Journal of Edinburgh. 1807. N. 95.*

74) *Memoirs of the medical Society of London. Vol. IV. Art. 20.*

75) *Diss. de sternodynia syncopali. Groeningae 1802.*

76) in HORN's *Archiv f. med. Erfahrung. 3. B. 1. Heft. N. 4. et Op. c. 2. Th. p. 512.*

77) Vide infra §. XLIV. N. 2 (19).

78) A verbo *angere*. Hoc vocabulum igitur nil commune habet cum eo *anginae*, sub quo (saucium inflammatio vulgo intelligitur. Germani hoc sub respectu in errorem inciderunt, *angorem pectoris*, quem *Herzklemme* seu *Herzbeklemmung* vocare debuissent, nomine omnino incongruo, *Brustbräune* insigniendo. Eundem versionis modum Rossi secuti sunt, quibus *angor pectoris*. Трудная Жаба nominatur. *Synon.* *Cardiogmus cordis sinistri* (SAUVAGESII) *asthma convulsivum* (ELSNER), *diaphragmatic gout* (BUTTER) et *asthma arthriticum* (SCHMIDT), *Syncope anginosa* (PARRY), *asthma dolorificum* (DARWIN), *asthma spasmodico - arthriticum inconstans* (STOELLER), *Sternalgia* (BAUMES), *stenocardia* (BRELL).

ciabantur. En hujus morbi, nobis pluries visi, curriculum! Aegroti qui, exceptis passionibus arthriticis, paululum ante secunda adhuc fruebantur valetudine, sub deambulatione aut sub ascensu scalarum, imprimis post abusum vini aut post lautum pastum, derepente a sensu angoris sub sterno, suffocationem minitante, eosque ut gradum sistant, tergumque vento vertant, cogente, corripiuntur. Quae scena horae momentulum unum alterumve perdurat et a quiete corporis fugatur, relictâ quadam imbecillitate mortisque impressione. Redit nihilominus, sub congruo regimine diaetetico, pristina valetudo, donec elapso curriculo modo mensis, modo anni, sub rerum positionibus iis, quae primum paroxysmum excitaverant, similibus, eoque facilius si forte ira superaccedat ⁷⁹⁾, alter morbi insultus in conspectum venit, ut plurimum longior, fortior ac dolore sub sterno ⁸⁰⁾, praevio ardore in ea parte ⁸¹⁾ stipatus. Paroxysmus jam bis terve repetitus, sensim sensimque crebro et minima data occasione e. c. venando, equitando, curru vehendo, gressus in proprio cubiculo instituendo, corpo-

79) Aeger cujus historiam descripsi (*Pamiętników Towarzystwa Imperatorskiego Lekarskiego Wileńskiego. T. 2. Wilno 1821. p. 65.*) in secundum paroxysmum incidit, dum famuli sui caussa irascere^{tur}.

80) Modo in medio modo ad latera (BUTTER l. citando).

81) BUTTER. Nunquam observavi.

corporis positionem mutando, tussiendo, manducando, bibendo, alvum seu urinam deponendo ⁸²⁾, sermonem instituendo, bilem sibi commovendo, dormiendo, redire solet, idque aucta progrediendo vi et duratione, neque a corporis quiete compescendus. Annuntiatur paroxysmus interdum ab inquietudine vix verbis designanda, a pandiculationibus, ab oculorum obnubilatione et vertigine. Alias derepente is ingruit utroque in casu sequentibus insignitis symptomatibus, nempe: *livore faciei et brachiorum*, sudore frigido coopertarum, — *pulsu* utplurimum parum frequente ⁸³⁾, irregulari ⁸⁴⁾, nunc exili ⁸⁵⁾, tremulo, nunc vibrante, illi morientium simili ⁸⁷⁾, aliquando normali ⁸⁸⁾; — *pulsatione cordis* modo fortio-

82) In binis aegrotantibus vidi.

83) Circiter decem pulsationibus frequentior quam extra paroxysmum JURINE l. c. p. 60. 61.

84) FOTHERGILL l. c. SCHMIDT (l. c. p. 8.): „Pulsus valde turbatus, saepe contractus, parvus atque inaequalis nec raro intermittens tangitur, et aeger palpitationibus cordis angitur.“

85) WALL l. c.

87) Sic in tribus aegrotis observavi.

88) HEBERDEN l. c. Suspico cum PARRY (l. c. p. 58.) egregium illum medicum Londinensem sub ipso paroxysmo tangendi pulsum non habuisse opportunitatem, qua solum medici minorum urbium frui solent, utpote qui uno saltu ad aegrum in paroxysmum incidentem accersiri possint.

fortiore⁸⁹⁾, modo vix perceptibili; — *vibratione* carotidum, collo, veluti in parturientibus inflato; — *respiratione* interdum libera⁹⁰⁾, alias crebra⁹¹⁾, difficili⁹²⁾, oppressa⁹³⁾; — *dolore*,
primum

89) BUTTER l. c. Quomodo Cl. KREYSIG (l. c. p. 519.) scribere potuerit: „*niemals Herzklopfen*,“ mehercule non intelligo. Jam SENAC narrat (l. c.): „*un Recollet étoit sujet à des palpitations. Les artères coronaires ossifiées formoient des rameaux semblables à des branches de corail.*“ Quodsi et PARRY (l. c. p. 68.) palpitationem cordis inter symptomata angoris pectoris non adnuinerat, nonne forte hypothesis sua, quod hic morbus ad syncopen pertineat, atque in Syncope juxta CULLENIIUM „*motus cordis imminutus, vel aliquamdiu quiescens*“ sit, sibi partem vindicat?

90) HEBERDEN, KREYSIG et PARRY l. c. p. 62. ubi inquit: „*The two patients mentioned to me by Dr. FALCONER, as well as the greater number of those whom I have attended, were so far from being affected with any difficulty of inspiration (or of expiration as mentioned by Dr. BUTTER), that they frequently made deep inspirations, and retained their breath, not with reluctance, but with much pleasure.*“

91) Triginta octo vices, spatio sexagesimae horae partis.
JURINE l. c. p. 61.

92) Ut verbo aegri cujusdam mei utar: „*ac si respiratio per follem fabri ferrarii absolveretur.*“ et Dr. WALL ait: „*a violent dyspnoea, or rather a sense of suffocation.*“ Ipse PARRY inquit: „*That some examples of angina pectoris may be accompainied with dyspnoea; I do not deny.*“ Quod praeterea demonstrat dyspnoeam anginae pectoris interdum esse sociam; est

primum obtuso dein lancinante, ab inferiore parte sterni, vel a regione epigastrica orto, sese per mammam sinistram (raro per dextram ⁹⁴), ad brachium ejusdem lateris (praecipue eo in loco ubi musculus biceps inseritur ⁹⁵), nonnunquam ad cubitum, antibrachium, palmas manuum, digitorum apices, scapulas, crura ⁹⁶), aut per latera colli ad aurem alterutram vel utramque extendente; — *decubitu* dumtaxat antrorsum flexo thorace

magnitudo abnormis musculorum ad opus respiratorum concurrentium, quam in cadavere hominis macilentum ex angore pectoris defuncti inveni. (*Pamiętnik* I. c.)

93) Videtur HOME (*Life of HUNTER* p. 51.) id designare ubi ait: „*feel of oppression in breathing, although the action of breathing was attended with no real difficulty.*“ Item CULLEN (*Synopsis nosologiae methodicae* T. II. p. 223.) spirandi difficultas perpetua sine angustia (?) et potius cum repletionis et infarctus in pectore sensu.“

94) Non convenio cum WALL (l. c. p. 13.) ubi ait: „*that in most, if not all the persons whom he had attended in this disease, the pain under the sternum constantly extended itself on each side across the breast in the direction of the pectoral muscle, and affected one, or commonly both arms in the place where the muscle is inserted into the os sterni.*“

95) Interdum observante HEBERDEN l. c. Vol. III. p. 3. „*a pretty full pain in the left arm a little above the elbow, which perhaps in half a minute spreads across the left breast and produces a little faintness.*“

96) BUTTER l. citando.

thorace admotisque regioni epigastricae manibus, aut supine extenso corpore, concesso vel ita denegato, ut aeger statuae instar sedere aut stare debeat; — *deglutitione* deleta sensuque contractionis et suffocationis ad oesophagum; — et *animi deliquiis*. Perdurat talis paroxysmus interdum per nonnulla tantum momenta, saepissime a dimidia ad integram horam, nonnunquam ad plures dies ⁹⁷⁾. Finem illi imponere solent explosio flatuum, tussis cum sputis mucosis, relictis plerumque tempore libero, dolore circa cor, pulsu irregulari ⁹⁸⁾, quoad frequentiam tamen normali, fornicatione digitorum, debilitate, impetiginibus ⁹⁹⁾, donec tandem aegroti, post annorum curriculum, sub summis angustiis, fatum, jam diu optatum, subeant.

§. XLIII.

C a u s s a e.

1. Lithiasin cardiacam, pro *effectu inflam-* L. pericar-
mationis arthriticae, phosphatem calcis largien- diacae ge-
 tis, habemus ¹⁰⁰⁾. Accedit *vitium rhachiticum*, neralis.

P 2

alio

97) HEBERDEN l. c. §. 2.

98) FOTHERGILL l. c. et ego confirmatum habeo.

99) Velut herpetem ad abdomen (HORST in HUFELAND's Journal. 1815. 10. St. p. 99.) numquam vidi.

100) Eandem opinionem fovet P. RAYER in tractatu suo de ossificatione morbosa. v. archives générales de médecine. Mois Avril. et Magazin d. ausländischen Literatur d. gesammt. Heilkunde. 1823. p. 138. Et patho-

alio forte modo similem effectum praestans ¹⁾). Errant hinc, qui lithiasin cardiacam in aetate dumtaxat provecta locum habere autumant ²⁾).

2. Ex-

logia comparata ortum ossescentiae cordis post inflammationem, a cursu et terrore excitatum, confirmat. „Insigne hujus rei documentum est in osse de corde cervi, sive principio osseo magnae arteriae, quod in hoc animalium genere, et longaevisimo, et mobilissimo, post diuturnam fugam occiso, perpetuo reperitur. Fuerunt medici, qui in cervis hoc os quaesiverunt captivis, quos principes in vivariis suis aluerant; sed frustra fuerunt. Unice enim in iis animalibus reperitur, quae frequenti cursu corpus exercent.“ BOERHAAVE Praellect. in Instit. med. CCCCLXXVIII.

1) „Wenn ferner meine Vermuthung über den Einfluss der rhachitischen Anlage auf die Krankheiten des Herzens gegründet sind: so muß auch die größere Thätigkeit des Saugadersystems bei den Rhachitischen nicht übersehen werden, wovon die Weichheit, Dünne und Ungleichheit der Knochen entsteht. — Auch giebt es in den Häuten der großen Gefäßstämme und selbst an der Oberfläche des Herzens eine Menge Saugadern, die also um so eher in die Häute der Gefäße viel phosphorsauern Kalk absetzen, je eher sich durch die Entzündung dieser Häute eine Neigung zur Trennung der Bestandtheile des Bluts und zum Hervorstechen der gerinnbaren Lymphe erzeugt, welche reich an phosphorsaurem Kalk ist.“ TESTA l. c. p. 317. 319.

2) „Es sind übrigens die Fehler des Herzens, die sich mit Verknöcherung verbinden, bei weitem nicht immer an das hohe Alter gebunden; oft sind es jüngere

2. Excipi interea meretur *lithiasis arteria-* L. arter.
rum coronariam cordis, cujus exempla nonnisi coronar.
 in hominibus annum quadagesimum et quin-
 quagesimum aetatis excedentibus, obesis, collo
 brevi instructis et maxime quidem in maribus ³⁾,
 atque in arthriticis ⁴⁾, praeviis violentiis pectori
 illa-

Personen.“ TESTA l. c. p. 317. Cfr. KREYSIG Op.
 c. 2. Th. p. 598. RAYER l. c.

3) HEBERDEN l. c. PARRY l. c. p. 41. „*The disease
 generally attacks persons of the male sex; and of them,
 those who are inclined to corpulency.*“ Vidi tamen
 virum plane macilentum, legitimo angore pectoris
 laborantem.

4) ELSNER (l. c.) potissimum *arthritidem* ut causam an-
 goris pectoris designavit. Illius opinionem amplexi
 sunt SCHAEFFER, MACQUEEN, HASSE, KREYSIG,
 SCHMIDT, qui vere ait: „Saepissime morbum ma-
 gnus numerus variorum symptomatum antecedit, qui-
 bus evanescentibus morbus ipse ingruit; quae laud
 luculenter causam suam saepe produnt, et maximam
 partem ab *arthritide anomala* deduci possunt. Inter
 praecipua horum symptomatum numerari possunt
 varia ventriculi incommoda, vitia virium et partium
 digestionis inservientium, opasmi varii generis, con-
 vulsiones, dolores colici et cardialgici, dolores in
 artibus vagi et ipsi insultus podagrici. Omnia ista
 symptomata plerumque, ingruente anginae pectoris in-
 sultu, vel plane evanescent, vel magna tamen ex
 parte, tum numero, tum vehementia minuuntur.“ —
 WICHMANN (l. c.) negat *arthritidem* sibi partem in
 angore pectoris vindicare, asserens, quod mirum
 foret, suos aegros tali morbo laborantes non fuisse
 arthriticos.

illatis ⁵⁾, abusu potus liquorum fermentatorum ⁶⁾ et animi pathematibus ⁷⁾, inveniri solent. Quae caussae cum pericarditidem excitare valeant ⁸⁾ verisimile est et lithiasin arteriarum coronariorum praevio processui inflammatorio ortum debere ⁹⁾.

§. XLIV.

Diagnosis. Prognosis.

D. generatim.

1. Cum lithiasis cardiaca symptomata dumtaxat obstaculum sanguinis circuitui oppositum, neutiquam vero istiusmodi obstaculi naturam designent ^{*)}; praesentia illius solummodo arguenda est, dum revera caussae ossescentiae cordis faventes ^{**)} praegressae sunt.

D. angor. pectoris.

2. Certior quodammodo est ea diagnoseos pars, quae *ossescentiam arteriarum coronariorum cordis*

5) CRÜWELL l. c. BLACKALL l. citanda.

6) AURIVILLIUS l. c.

7) CORVIGART et meae observationes.

8) Cap. VII. §. XXIV. N. 2.

9) Haecque est simul opinio Cl. PARRY ubi ait (l. c. p. 136.) „— one can have little doubt that the same operation, which changed the state of the arterial coats (lymphæ coagulabilis ut in croup extravasata), produced the extravasation incrusting their sides.“ Nec aliter sentiunt KREYSIG l. c. 2. Th. p. 55. TESTA Op. c. p. 340.

^{*)} §. XLII. N. 2.

^{**)} §. XLIII.

cordis respicit. Detexit nempe PARRY¹⁰⁾, praecunte E. JENNERO¹¹⁾, quod morbus (forte a SENECA¹²⁾, CAELIO AURELIANO¹³⁾, MÉZERAY¹⁴⁾, certissime vero a MORGAGNIO¹⁵⁾, FRIDERICO HOFFMANNO¹⁶⁾, ROUGNON¹⁷⁾ observatus atque a HEBERDENIO sub nomine *angoris pectoris* descriptus) qui componitur ex *paroxysmis* et *liberis*

10) l. c.

11) „*And it was suggested by Dr. JENNER, that the angina pectoris arose from some morbid change in the structure of the heart, which change was probably ossification, or some similar disease, of the coronary arteries.*“ PARRY l. c. p. 3.

12) Opp. Lips. 1605. p. 474. Epist. LIV. (Loqui potius videtur de asthmate quo ipse laborabat, quam de angina pectoris. Hujus tamen morbi praesentia arguitur a ZECCHINELLI: *sopra una malattia di SENECA il filosofo. V. Nuovi Saggi della Cesareo-Regia Accademia di scienze lettere ed arti di Padova. T. I. 1817.*

13) Chronic. Lib. II. Cap. I. p. 36.: „*Erasistrates memorat paralyseos genus et paradoxon appellat, quo ambulantes repente sistuntur, ut ambulare non possint, tum rursum ambulare sinuntur.*“

14) *Abrégé chronologique de l'histoire de France. Année 1599.*

15) De sed. et caussis morb. Lib. II. Epist. XXIV. 31.

16) Opp. T. III. „*Homines animi corporisque viribus deficiunt absque convulsionibus aut tremoris apparentia, immobiles jacent, respiratio et pulsus intercipitur, artus refrigescunt et collabuntur, facies est hippocratica; et copiosus sudor ad tactum frigidus circa tempora erumpere deprehenditur.*“

17) *Lettre adressée à Mr. LORRY Besancon 1768.*

ris intervallis, quorum *illi*, dolore sub sterno, saepe ad brachium sinistrum extenso, anxietate praecordiorum summa, pulsuque irregulari, *haec* vero impotentia motus, inprimis adversus ventum, insiguntur, — ex *lithiasi arteriarum coronariarum cordis* vel saltem ex *illarum conditione cartilaginosa* proficiscitur. Quodsi, praeter allatos¹⁸⁾, non omnes, qui de angore pectoris scripserunt auctores¹⁹⁾, hac in re convenient, pluri-

18) §. XLII. N. 3 (68 — 77).

19) SMYTH *medizinische Commentarien v. Edinburgh* — HAMILTON *ib.* — HILL v. KÜHN *phys. med. Journ.* 1801. p. 784. — MALCOLM MACQUEEN in *London med. Journal. Vol. V.* p. 162. et *Abhandl. f. pr. Aerzte.* 10. B. p. 145. — HOUPER *Memoirs of the medic. Society of London. Vol. V. N. 18.* — HAYGARTH *med. transactions. Vol. III. N. 3.* — MACBRIDE *Medical Observations and inquiry. Vol. VI.* — ELSNER *Abh. über d. Brustbräune. Königsb.* 1778. — GRÜNER *Specilegium de angina pectoris.* Hal. 1800. HESSE *specimen de angina pectoris.* Hal. 1800. — BERGER in *Abhandl. d. Schwedisch. Akad. der Wissenschaft.* 1. B. p. 64. — TODE de inflammationibus chronicis pectoris. Havniae 1788. — HARTMANN *Diss. de angina pectoris.* Fr. 1791. — BUTTER *a treatise on the disease commonly called angina pectoris.* Lond. 1791. — SCHMIDT *Diss. de angina pectoris* 1793. — CRAWFORD *Diss. de angina pect.* Edinb. 1795. — WICHMANN *Ideen zur Diagnostik.* Hannov. 1797. 2. Th. p. 131. — SCHAEFFER *Diss. de augina pectoris vulgo sic dicta.* Goett. 1781. — DUNCAN *Annals of Medicine.* 1796. *Vol. I.* p. 199. — CLARKE *Diss. de syn-*

plurimique morbum ex caussis longe aliis repellant, culpa istiusmodi opinionum discrepantiae in erroribus diagnoseos quaerenda est.

3. Posset enim *angor pectoris* confundi cum *Facilis*
incubo, asthmate, polypo cordis, dilatatione *confusio.*
cavitatum cordis, angustatione ostiorum cordis,
morbis

cope angente. Edinb. 1802. — STÖLLER in HUFELAND'S *Journal*. 17. B. 2. St. p. 115. — WOLFF ib. 18. B. 1. St. p. 15. — RITTER ib. 20. B. 3. St. p. 117. — SCHENK ib. p. 103. — JAHN ib. 23. B. 3. St. p. 137. — JÓZEF FRANK v. *Dziennik Wileński* 1805. N. 5. et loco citato. — DESPORTES *Traité de l'angine de poitrine, qu'on a presque toujours confondue avec l'asthme et les maladies du cœur.* — BRERA *della Stenocardia malattia volgarmente conosciuta sotto il nome di angina pectoris.* Verona 1810. — CHRZCZONOWICZ *Diss. de angore pectoris.* Vilnae 1812. — MILLOT *sur l'angine de la poitrine.* Paris 1812. — WARREN in the *New England Journal of medicine and Surgery*. Vol. I. 1812. — BLACKALL *Observations on the nature and cure of dropsies; to which is added an appendix containing several cases of angina pectoris, with dissections.* Lond. 1813. — ZECCHINELLI *sulla angina dell petto, e sulle morti repentine.* Padova 1814. Vol. I. — JURINE *Mémoire sur l'angine de poitrine, qui a remporté le prix au concours ouvert sur ce sujet par la société de méd. de Paris.* 1815. — JOS. LAUFFER *Diss. de asthmate convulsivo ejusque ab angina pectoris differentia.* Vratisl. 1816. — ANT. FR. OLLENROTH *Diss. de angina pectoris.* Berol. 1822. — K. GL. SCHRAMM *Diss. de angina pectoris.* Lips. 1822. c. tab. aen.

morbis hepatis et lienis aliisque affectionibus cordis spasmodicis, aneurysmate arcus aortae et animi deliquio.

D. ab incubo. 4. Angunt quidem *incubus* et *angor pectoris*, at vero:

Incubus.

- a. Dormientem hominem adgreditur.
- b. Aeger visiones terrificas patitur.
- c. Decubitus undique concessus.
- d. Dolor nullibi.

Angor pectoris.

- a. Vigilantem hominem adgreditur.
- b. Aeger nullam hallucinationem patitur.
- c. Decubitus non undique concessus.
- d. Dolor sub sterno.

D. ab asthma. 5. *Asthma* et *angor pectoris* periodice recurrunt atque thoracis angustia stipantur, at vero:

Asthma.

- a. Noctu ut plurimum invadit.
- b. Aeger potestatem habet surgendi aëremque liberum quaerendi.
- c. Respiratio cum sibilo strepente absolvitur.
- d. Dolor nullibi.
- e. Subjicitur atmosphaerae imperio.

Angor pectoris.

- a. Morbus, saltem incipiens, plerumque interdum invadit.
- b. Aeger coactus est stare, et afflatum aëris evitare.
- c. Respiratio interdum dumtaxat gemebunda.
- d. Dolor constans.
- e. Non subjicitur atmosphaerae imperio ²⁰⁾.

6. *Poly-*

20) PARRY (l. c. p. 45.) inquit: „*They have been by*

6. *Polypus cordis*, quidquid dicat WICH-^a Distinctio
MANN ²¹⁾, vix aut ne vix quidem ab *angore pe-* cordis.
ctoris distingui potest. Sequens hinc tabula dum-
taxat pro calculo probabilitatis usu veniet.

<i>Polypus cordis.</i>	<i>Angor pectoris.</i>
a. Nulli aetati parcet.	a. Circa annum 40. in- vadere solet.
b. Aegrotum ab ipso morbi initio <i>continuo</i> detinere potest.	b. Morbus ab initio con- stanter est <i>periodi-</i> <i>cus</i> .
c. Pulmonem vehemen- ter in consensum tra- hit ²²⁾ .	c. Pulmonis laesio mi- nus evidens.
d. Dolores vagi.	d. Dolores ad {determi- natos locos obveni- unt.

7. Cum vero lithiasis praeter arterias coro-^{Frequen-}
narias cordis haud raro et alias hujus visceris ^{tes com-}
^{plicatio-}
partes ^{nes.}

*some thought to occur most frequently in the extremes
of hot and cold weather; but in many instances there
has been no perceptible difference in this
respect."*

21) l. c. (Vix WICHMANNO condonare possum, quod
me relate ad istos morbos plus vice simplici in erro-
rem duxerit).

22) Ait sat vere WICHMANN (l. c. p. 214.): „In der
Brustbräune ist selten die Angst oder Suffocation so hef-
tig, dass man im Respiriren eine grosse Veränderung
bemerkte, die vom natürlichen Zustande abweiche.“

partes detineat ²³⁾ cumque hae ossescentiae saepe cum aliis cordis vitiis societatem ineant ²⁴⁾, facile intelligitur, cur lithiasis arteriarum coronariarum detegi possit (quod et nos observavimus ²⁵⁾), quin

23) §. XLI. N. 7. Et casus a WALLIO narratus l. c.

24) Cum *dilatatione cordis* (MORGAGNI Epist. XXVI. 31. WALL *med. trans.* Vol. III. p. 17. — BLACK *med. mem.* Vol. IV. p. 268. — PARRY l. c. p. 23. 31. et Ego v. *Pamiętników* l. c.) — cum *corde minimo* (HOME's *Life of HUNTER* p. 63.) — cum *flacciditate et pallore cordis* (HOME l. c. — JOHNSTONE *Med. mem.* Vol. I. p. 380. — BLACK l. c. p. 269.) — cum *nimia adipis circa cor collectione* (WALL l. c. p. 16. 17. — FOTHERGILL *med. Obs. and inqu.* Vol. V. p. 239. — PARRY l. c. p. 12. 23. 31.) — cum *pericardio incrasato* (HOME l. c. p. 62.) — cum *valvulis osseis* (WALL l. c. p. 17. — HOME l. c. p. 63. — PARRY l. c. p. 32.); cum *arcus aortae dilatatione aut lithiasi* (MORGAGNI Epist. XXVI. 31. — WALL l. c. p. 18. — HOME l. c. p. 63. — BLACK l. c. p. 269. — PARRY p. 23. 32.) — cum *hydrothorace* (WALL l. c. p. 16. — FOTHERGILL l. c. p. 239. — PARRY l. c. p. 11.) — cum *hydrocardia* (WALL l. c. p. 17.), cum *paralysi* (JURINE l. c.) cum *dilatatione auriculae dextrae cordis* (JURINE).

25) §. XLII. N. 1 (36). Et morbi historia viri, de Austria summopere bene meriti, confirmat genuina angoris pectoris symptomata non oriri ubi, praeter ossificationem arteriarum, aliae partes cordis et aortae lithiasi laborant. „Vidi egregium Consiliarium aulicum BIRKENSTOCK (annos 73. natum) in ultimo ejus morbo, jam a quinque mensibus durante. Quondam multum a doloribus arthriticis vexabatur, ac ante

quin symptomata, quae simplici angori pectoris propria sunt, praegraessa fuerint²⁶⁾.

8. Angoris enim pectoris *legitima sympto-* Origo an-
mata tunc solum expectamus, dum cor, ob goris pe-
 lithia- ctoris.

plurimos annos gravem pectoris morbum perpressus erat. Ab eo tempore tussis cum sputis suspectis relicta est. Eu dolores arthritici inopinate disparuerunt, accedente simul dyspnoea, urina paucâ, turbidâ redditâ. Saepe insultus suffocationis, praesertim noctu, experiebatur, antequam adhuc pedes tumuerint. Accessit tumor erysipelatosus brachii sinistri, valde dolens, qui tandem per suppurationem terminabatur, quin aeger inde levamen accepisset. Pulsus erat sano vix frequentior, non intermittens, plenus extra suffocationis insultum, sub illo, parvus contractusque. Caput liberum, memoria excellens. Digitalis et squilla sine omni successu exhibita fuere. Aeger serius et diurno tempore suffocationi semper proximus, mortem haud reformidabat. Obiit die 30. 8bris 1809. placide praevio dormiendi desiderio. Sectio cadaveris, a Dr. STAUDENHEIM instituta, exhibuit, ossificationem cartilagium costarum, seri plures libras in cavitatibus pleurae, pulmones passim cum membrana illa concretos, tuberculis osseis refertos, totam arteriam coronariam osseam, aortam ab origine usque ad exitum e cavo pectoris ad superficiem suam internam materia calcarea obductam, extus punctis osseis notatam. Et cordis valvulae lithiasi correptae erant“ (Ex schedis Patris mei).

26) HEWSON in *Abhandl. f. pr. Aerzte.* 4. B. — ERDMANN in HORN's *Archiv f. med. Erfahrung.* 9. B. 1. Hest. 1806. p. 95. — LENTIN *Beiträge zur pr. Heilkunde.* 3. B. p. 113. — KREYSIG l. c. p. 540.

lithiasin arteriarum coronariarum (aut conditionem illorum analogam) necessariam sanguinis copiam accipere nequit ideoque, ut quivis musculus nutrimento debito orbatus, languet ²⁷⁾, veluti paresi laborat ²⁸⁾, atque ad officium suum absolvendum (inprimis si superveniant causae majorem energiam exposcentes, quales sunt corporis motus, animi pathemata, repletio ventriculi) impar evadit. *Est igitur nobis angor pectoris effectus congestionis cruoris circa cor* ²⁹⁾, *ex labefactatione hujus visceris, orta a defectu nutritionis, ob arteriarum coronariarum, per praeviam inflammationem aut metastasin arthriticam* ³⁰⁾, *ossescientiam.* Congestione cruoris circa cor contingente, mirum non est quod etiam nervi cardiaci et phrenici ³¹⁾ in consensum trahuntur ³²⁾.

27) Memoratu digna sunt verba FR. HOFFMANNI (l. c.). „Est itaque syncope motus cordis ad tempus sufflaminatio — ab impedito vel minus sufficiente liquidi spirituosius per nervos et sanguinis probe temperati per vasa coronaria in musculosam cordis substantiam influxu dependens.“

28) JAHN l. c.

29) Congestio cruoris circa cor et per compressionem carotidum excitari potest, non sine sensu anxietatis gradui compressionis respondente. PARRY l. c. p. 123. 124.

30) Hi sunt limites inter quos arthritidem in producendo angore pectoris scenam ludere existimo.

31) BUTTER anginam pectoris ex causa arthritica directe ad diaphragma conjecta repetiit indeque nomen dia-

huntur ³²). Sic opinio illorum, qui angorem pectoris vel ex spasmō ³³), vel ex affectione nervorum pulmonalium et cardiacorum ³⁴) explicarunt, quodammodo cum illa, quam amplexi sumus, conciliatur. Porro, cum torpor cordis atque illius effectus (congestio scilicet sanguinis circa hoc viscus, et angustiae inde productae), praeter lithiasin arteriarum coronariarum ex aliis quoque caussis, e. c. adipe ³⁵), ex vitio haemorrhoidali,

phragmatic gout proposuit. Diaphragma in angore pectoris magnam scenam ludere et DARWIN (Zoonomia. T. IV. p. 42.) autumat.

32) PULCHRE DESPORTES (l. c.) de consensu nervorum nostro in morbo rationem reddit.

33) HEBERDEN l. c. p. 64. MACBRIDE *Introduction méthodique à la théorie et à la pratique de la médecine.* T. 2. p. 432.

34) JURINE l. c. p. 74. „ *En allant ainsi par voie d'exclusion à la recherche du siège de cette douleur: il ne nous reste plus pour le placer que les plexus nerveux de la poitrine, et c'est là en effet qu'il existe, je pense, véritablement: la manière dont se manifeste, se propage et se termine cette sensation angoissante, ses longs intervalles, l'influence qu'ont sur elle les passions de l'ame et le sommeil, ses effets sympathiques sur les extrémités supérieures, la mâchoire etc., tout concourt à mettre dans la plus grande évidence sa nature essentiellement nerveuse, et à prouver qu'elle est purement spasmodique.*“

35) FOTHERGILL (l. c. p. 246.) *adipem* in pericardio, mediastino et omento collectum, pro causa proxima angoris pectoris habebat. Cfr. BLACK in *medico-chi-*

rhoidali, ex affectione nervorum cardiacorum (ob morbum aut cerebri, aut medullae spinalis, aut plexus coeliacum), ex obstructione lienis et hepatis expectari debeant; libenter concedimus ex sola atque transitoria apparitione symptomatum angoris pectoris, ad lithiasin arteriarum coronariorum tuto concludi haud posse. Enimvero talis diagnosi institui haud debet, nisi paroxysmi angoris pectoris *stabiliter* obveniant, nisi quae aliae causae palpabiles, ex quibus morbum repetere liceret, desiderantur. Ad quod si attendisset egregius BRERA ³⁶⁾, *stenocardiam* suam, neque ab invalescente cordis pressione per hepar plus justo auctum durumque, atque in pectoris cavum elatum, derivasset, neque declarasset veram anginae pectoris causam penitus alienam esse a substantia fabricationeque cordis.

Prognosis.

9. Lithiasis pericardiaca ut plurimum hydro-pi cavitatum pleurae ³⁷⁾ et pericardii ³⁸⁾ ansam porri-

rurg. transact. published by the med. and chirurg. Soc. of Lond. Vol. 7. P. I. 1816.

36) l. c. „... e che se questo viscere essenzialissimo perde a poco a poco della normale sua energia, ed esterna i fenomeni tutti dell' angina pectoris, ciò solo avviene, in quanto che angustiato ne' suoi movimenti per effetto d'un vizio organico innerente ai visceri vicini, e in particolare al fegato, cade in fine in uno stato di vera paralisi, allorchè affatto sopra di esso si effettui una straordinaria, grave e permanente pressione.“

37) P. II. Vol. II. Sect. I. C. XI. §. LIV. N. 6.

38) Cap. IX. §. XXXIII. N. 3.

porrigit; qui hydrops, quamvis reiteratis vicibus debellari plerumque possit ³⁹⁾, attamen ocyus serius vitae tristissime finem imponit. Lithiasis arteriarum coronariarum prae brevi alia, mortis improvisae est caussa ⁴⁰⁾. Caeterum ea longae-
vitati non semper obstat ⁴¹⁾ et nonnunquam aliis morbis *), aut casui fortuito ⁴³⁾ tempus, aegrum e medio auferendi, concedit. Praeterea in prognosi angoris pectoris instituenda, semper *incertitudinis diagnoseos* memores esse juvabit. Ob
hanc

39) P. II. Vol. II. Sect. I. C. XI. §. LIV. N. 8.

40) HEBERDEN l. c.

41) HEBERDEN l. c. (Viginti annos durasse observavit).
Dux militum, Rossicus, Comes a BENNIGSEN A. 1804. sexaginta et ultra annos numerans, jam tunc mihi potissima signa angoris pectoris obtulit. Attamen cum morbi paroxysmi raro obvenirent, cum indicia arthritidis defuerint, cumque crisis per epistaxin contingeret, morbum potius pro effectu vitii haemorrhoidalis habere, ac prognosin haud omnino atro carbone notare, malui. Ac re quidem vera, vir mihi in aeternum colendus et hodieum adhuc vivit.

*) PARRY l. c. p. 46. „At length, after the disease has recurred more or less frequently, sometimes during a space of many years, which admit of the patient's death from a variety of other causes, a more violent attack, puts a sudden period to his existence.“

43) e. c. lapsu. v. MILES MARTY in the London medical and physic. Journal by FOTHERGILL Vol. 46. 1821s Novembr.

hanc solam causam nonnunquam curam non sine aliqua successus spe, inchoare licet.

§. XLV.

C u r a.

Genera-
tim.

1. Indicationes in cura lithiasis pericardiacae et speciatim angoris pectoris sunt: 1° congestionem cruoris circa cor impediendi debellandique, 2° energiam cordis nervorum et ventriculi excitandi et 3° periculum hydropis avertendi. Studemus satisfacere indicationi primae — per regimen diaeteticum, per evacuationes sanguinis, per eccoprotica et carminativa perque derivantia; secundae — per sic dicta cardiaca, nervina et stomachica; et tertiae per diuretica.

Regimen
diaeteticum.

2. Victus simplex esto ex vegetabilibus haud flatulentis et ex carnibus albis, uterque facilis digestionis, mixtus⁴⁴⁾. Aeger quavis vice parum et saepius, e. c. ter de die⁴⁵⁾, at non ingruente nocte comedat. Optimus potus aqua. Si consuetudo id absolute exposcat, cyathus vini non recusant.

44) FOTHERGILL et PARRY (l. c. p. 150.) generatim dietam vegetabilem suadent; ast vidi homines esui carniū aduetos male inde habuisse. Quare sapienter JURINE l. c. p. 140.: „Le régime devrait consister en une nourriture fort simple, mais autant animale que végétale, afin de ne pas trop affaiblir les forces,“

45) JURINE l. c.

recusandus 46). Cerevisia nocet 47). Fugiaturs ascensus scalarum et eligatur habitatio plana, dummodo non humida. Aër rusticanus omni alio anteponendus. Morbo adhuc recente, motus passivus, leniter equitando, curru vehendo, commendandus. Contra quivis motus activus et nisus evitandus 48), quod potissimum de brachii sinistri motu valet 49). Cum sedendo aorta incurvetur et arteriae femorales comprimantur indeque sanguis circa cor accumuletur, corporis

Q 2 ista

46) JURINE indistincte vinum pro prandio concedit, quod ex sua de morbo hypothesis pullulare videtur.

47) „... it may be prudent for the patient to abstain from liquors abounding with carbonic acid, such as bottled beer, cyder, perry etc. — PARRY l. c. p. 151.

48) „on all occasions, walking up hill, up stairs, or against the wind, quick or long continued walking, even on plain ground, loud talking, violent laughter and every strong effort, should as much as possible be avoided.“ PARRY l. c. p. 156.

49) Non tantum in angore pectoris, sed et in aliis morbis chronicis cordis et vasorum sanguiferorum hoc praeceptum valet. Vidi enim ex nimio brachii sinistri motu aegrotos magnum detrimentum accepisse. Libenter hinc ad opinionem accederem, brachium dextrum potius quam sinistrum in usum deduci, ne cordi et vasis sanguiferis majoribus molestia inferatur; quae est hypothesis jactata a ZECCHINELLI (*discorso sull' uso della mano destra a preferenza della sinistra. Padova 1815.*). Cfr. *Bibliothèque universelle. T. II. Juillet 1816. p. 213. et ODIER in Journ. de Gèneve 1796. 5. décembre. Lettres sur les gauchers.*

ista positio non nimis diu protrahenda. Ob eandem rationem vestes et fasciae arctae evitandae sunt. Ne vero aeger frigus suscipiat curandum. Praesertim extremitates inferiores ab illo humido tueri debet. Verum et calor nimius, detrimentum affert. Magnum periculum ira ⁵⁰⁾ et venus ⁵¹⁾ portendunt. Consolatio in lectione librorum ⁵²⁾, et maxime in religione ⁵³⁾ quaerenda. Aliunde aegri, quovis in paroxysmo cum mortis angustiis familiaritatem contrahendo, malorum terminum potius exoptant quam timent.

Evacuatio-
nes san-
guinis.

3. *Venae sectiones parvae* ⁵⁴⁾, aegro supine decumbente, ex jugulari ⁵⁵⁾, mediana, saphe-
na ⁵⁶⁾

50) „Dr. FOTHERGILL's last patient, opened afterwards by Mr. HUNTER, died in a „violent transport of anger“ *Med. Observ. and inquiry. Vol. V. p. 254. And the last paroxysm Mr. HUNTER himself was owing to the same cause.*“

51) Cfr. Cap. XIII. §. LIV. N. 2. (68).

52) JURINE l. c. p. 139. Nota. „*Un de mes malades a remarqué, que la lecture d'un ouvrage, qui captivoit son attention, lui permettoit, de marcher beaucoup plus longtemps sans éprouver de malaise, que lorsqu'il étoit livré à ses propres réflexions.*“

53) „... the patient must minister to himself; and in this country in which we have reason to thank Providence that there is still some genuine religion, it may be hoped that the sufferer will not be at a loss for sources from which to derive forbearance and consolation.“

PARRY l. c. p. 158.

54) Ad uncias tres, quatuor (PARRY l. c. p. 154.).

55) BURNS l. c. p. 108.

na ⁵⁶⁾ institutae, levamen, imprimis vigente paroxysmo, eo certius afferunt ⁵⁷⁾, quo recentior morbus, quo floridior habitus. Sola pulsuum humilis conditio illas non contraindicat ⁵⁸⁾. Quodsi venae sectiones a virium reali defectu contraindicerentur, *hirudines* circa cordis regionem, aut *cucurbitulae scarificantes*, supplent. Aegro haemorrhoidario *hirudines* ad anum. Simul *nitrum* cum reliquo regimine antiphlogistico ⁵⁹⁾. Si aeger sub paroxysmo deglutire possit, *haustus aquae frigidae* seu *glacialis saccharatae*, levamen affert.

4. Ne saburrae et flatus, intestina distendendo, congestionem cruoris circa cor excitent, ^{Eccoprotica et Carminativa.} alvus libera tenenda. Si aegrotus *electuarium leuitivum*, *oleum ricini* et *salia media* ob ventriculi imbecillitatem perferre nequeat, ad drastica in minima dosi, ad *aloen* ⁶¹⁾ scilicet, *colocythidem*, *scaunonium*, tempore a paroxysmo

56) Si suspicio vitii haemorrhoidalis lateret.

57) Dr. WALL asserit „that his patient was always better for a day or two after of bleeding.“

58) „The extreme weakness of the pulse, and coldness of the skin certainly do not contraindicate bleeding.“
PARRY l. c. p. 162.

59) ODIER methodum antiphlogisticum consue commendat, quousque vires non deficiunt. (*Bibliothèque Britannique Vol. 23. p. 50.*).

61) PARRY (l. c. p. 151.) jam laudat.

xysmo libero adhibenda ⁶²⁾, confugere solemus. *Carminativis* sub ipso paroxysmo locus est. Mitissima eligimus, e. c. (praeter *clysteres* ex seminibus *cumini*) *infusum florum chamomillae, herbae menthae crispae, seminum anethi foeniculi, anisi*; alii *aquam menthae piperitae cum oleo essentiali anisi* ⁶³⁾, *vinum, aetherem, ammoniam, camphoram* etc. ⁶⁴⁾ propinant, de quorum pharmacorum usu infra ⁶⁵⁾.

Derivan-
tia.

5. Ut sub paroxysmo sanguis magis ac magis a corde revellatur atque ad extremitates inferiores determinetur, illis *cucurbitulas siccas, sinapismos* applicamus, non neglectis *pediluviiis acrioribus et frictionibus cum pannis laneis*. Ad arcendas posteriores arthritidis circa cor strages, *fonticuli* ad superficiem internam crurum ⁶⁶⁾, brachiorum, vel potius inter costas prope cor ipsum ⁶⁷⁾, inserviunt. Placet aliis irritamentum sterno ope lotionum ⁶⁸⁾ inferre; anteponendum tamen

62) Cap. XVII. §. LXXII. N. 5. (51).

63) Ad cochlear majus cum guttis duabus. THOMAS *modern practice of physic*. 3. edit. London 1809.

64) HEBERDEN, FOTHERGILL, BLACK.

65) N. 6.

66) WICHMANN l. c. p. 162. SMITH l. c. p. 99.

67) Sic conspicuum levamen unus aegrorum meorum obtinuit.

68) GODWIN in *Annales de littérature médic. étrangère* par KUIJKENS. Vol. IV. p. 286. R. Tartari emetici drachm. unam. Spiritus vini camphorati unciam se-

tamen foret *emplastrum ex tartaro emetico* ⁶⁹⁾. Caeterum cavendum ne tali pacto majorem ad partem affectam sanguinis affluxum promoveamus, quod et a *vesicatorio* ⁷⁰⁾ pectori appposito timendum foret. Ulcerum artificialium virtus antiarthritica, ope *guajaci* ⁷¹⁾ et *antimonii* ⁷²⁾, de quo infra ⁷³⁾, sustineri posset. Ipsae *aquae thermales* adhibitae fuere ⁷⁴⁾, tutius sane quam balneum frigidum ⁷⁵⁾.

6. Quamvis pharmaca sic dicta *cardiaca* et *nervina* in angore pectoris multum detrimenti attulerint ⁷⁶⁾, et certe non indiscriminatim adhiberi

mis. Aquae fervidae libram unam. Misce. D. S. pro frictione sterni pluries de die reiteranda.

69) KRIEDELSTEIN in HUFELAND'S *Journal*. 19. B. 4. St. p. 131. R. Tartari emetici drachm. semis. Opii drachm. unam. f. pulvis et cum saliva unguentum. Inflicetur locus maxime dolens ter de die ad magnitudinem duorum pisorum, donec pustulae oriantur.

70) BLACKALL l. c. (Auctoritate Dr. PARRY).

71) BERGIUS in *Abhandl. f. pr. Aerzte*. 10. B. p. 708. — ELSNER l. c. p. 83. (Sine fructu usurpavi).

72) WICHMANN l. c. p. 162. (Tinctura antimonialis THEDENI).

73) N. 7.

74) e. c. BATH v. FOTHERGILL l. c. p. 243. PARRY l. c. p. 159.

75) BUTTER l. c. p. 28.

76) e. c. in ipso HUNTERO v. HOME l. c. et BURNS l. c. p. 171.

hiberi possint 77); attamen ab illis plus vice simplicis vigente paroxysmo conspicuum levamen, saltem pro tempore, observavimus. Spectant huc *asa foetida* 78), *Moschus* 79), *camphora* 80), *radix valerianae officinalis* 81) et inprimis *aether sulphuricus*, *tinctura castorei*, et *opium* 82), quo ultimo, hora somni porrecto, multae laudes, sed non ab omnibus 83), tribuuntur 84). Securior sane usus *pulveris Doveri* est 85) opium enim qualicumque demum corrigente indigere videtur conubio 86); quod etiam de aliis *narcoticis*, hic commendatis, de extracto *hyoscyami* 87) videlicet,

lactu-

77) PARRY l. c. p. 163. 164. BURNS l. c. KREXSIG l. c. p. 776. 777.

78) JOHNSTONE l. c. p. 580. ELFER in HUFELAND'S *Journal* 1813. Nov. et Decemb. p. 137. Sub paroxysmo simul exhibebatur. R. Liquoris ammoniae anisati drachm. tres. Laudani liquidi Sydenhami drachm. unam et semis. M. D. S. guttas duodecim omni dimidio horae cum infuso menthae piperitae.

79) ELSNER l. c. p. 83. SCHAEFFER l. c.

80) SCHAEFFER l. c.

81) JURINE l. c. p. 142. (Carissimum hoc illi pharmacum ter quaterve de die ad drachmam porrigit).

82) Acta mea Clinica. A. 4. 5. 6. p. 77.

83) HOME *life of* HUNTER.

84) HEBERDEN, SCHAEFFER.

85) JURINE l. c.

86) Opii quartam grani partem cum grano uno sulphatis zinci et pulvere aromatico exhibet. LEE PERKINS v. *Mém. de la soc. de méd. de Londres*. 3. Vol. p. 580.

87) ELSNER l. c. BURNS l. c. p. 174.

lactucae virosae ⁸⁸⁾ valet. *Aqua laurocerasi* aut *amygdalarum amararum*, sola exhiberi potest ⁸⁹⁾.

7. Quammaxime enim studendum, ne ven-Stomachi, triculi vires dejiciantur; quod malum si urgeret, ^{ca.} *amara*, inprimis *decoctum* aut *extractum gentianae luteae*, *menyanthes trifoliatae*, *quassiae amarae*, *columbo* ⁹⁰⁾ praescribenda forent. Ipsa *emetica* proposita fuere ⁹¹⁾, nimis audacter sane, nisi in minimis dosibus ⁹²⁾. Si nimiae sensibilitatis ventriculi suspicio haberetur, *oxyda metallica*, e. c. *zinzi* ⁹³⁾ aut *cuprum ammoniacale* ⁹⁴⁾, *cinnabarum* ⁹⁵⁾, tentari possent; nunquam autem *arsenicum* ⁹⁵⁾.

8. Pe-

88) Acta mea Clinica l. c.

89) *Journal général de méd. de chirurg. et pharmacie*. T. 43. Janv. 1812. p. 31. Levamen saltem ab initio afferre solent, ac prudenter adhibitae neque ventriculo neque aliis partibus detrimentum afferunt.

90) BURNS l. c. p. 174.

91) PERCIVAL *medical comment*. Vol. 3. p. 181.

92) Stimulus specificus ventriculo illatus non solum pulmonum sed et cordis energiam attollit. Cujus phaenomeni facile ratio, per par vagum nervorum, redditur. Utut sit, suspicor ipsam virtutem *antimonii*, in angore pectoris, potius illius in stomachum actioni, quam vi antiarthriticaetribuendam esse.

93) JURINE l. c. p. 142.

94) JURINE l. c.

95) FOTHERGILL l. c. p. 343.

96) ALEXANDER in *Edinburgh medic. Comment.* 1790. Pharmacopoea castrensis Ruthena p. 6.

Diuretica. 8. Periculum hydropis avertimus continuam sollicitudinem secretionis urinae habendo, illamque, quo primum languet, auxiliis alibi indicatis⁹⁷⁾ excitandi. Hic et foliis *digitalis purpureae* locus est, alias, ob timorem posse inde vires cordis adhuc magis frangi, in morbo, de quo agitur, vix praescribendis.

Acidum phosphoricum, aqua calca-
gazeo oxygenio. 9. *Acidum phosphoricum* scopo lithiasin arteriarum coronariarum et cartilaginum intercostalium destruendi et formationi ulteriori ossescentiae occurrendi, propositum fuit⁹⁸⁾. Tentavimus cum aliis⁹⁹⁾ incassum, attamen sine damno. Cur *aqua calcis* commendata fuerit¹⁰⁰⁾ non intelligimus. Saltem hypothese de natura angoris pectoris jactatae magis consona est propositio *aërem gaz oxygenio excellentem*¹⁾, vel purum hoc gaz sub paroxysmo²⁾ inspirandi.

Monitum. 10. Aegro jam mortis imaginem referente, de possibili asphyxia cogitandum. Valerent tunc prae-

97) P. II. Vol. II. Sect. I. C. XI. §. LVII. 4.

98) BAUMES in *Annal. de la société de méd. pratique de Montpellier*. T. 12. (Praescribit a drachmis duabus ad unciam cum syrupo et aqua nychthemeri spatio).

99) JURINE l. c. p. 143.

100) SMITH l. c. p. 99. (Adhibebat simul cum spiritu juniperi et vino antimoniato HUXHAM!).

1) JURINE l. c. p. 143.

2) Levamen attulisse refert REID in *Transact. of the association of Physicians in Ireland*. Dublin 1817. Vol. I.

praecepta alibi tradenda³⁾; speciatim illa, corpori positionem erectam conciliandi⁴⁾, frontem aqua frigida lavandi⁵⁾, ammoniam causticam naribus

3) Cap. XXI. §. XCIII. N. 2.

4) KREYSIG op. c. 2. Th. p. 779.

5) BURNS l. c. p. 169. Comes BENNIGSEN, dum prodroma paroxysmi sui persentiebat, illico corpus aqua frigida irrorabat, sicque illius evolutionem saepe impedire potuerat. — Inter schedas Patris mei sequentem historiam inveni. — Auctor epistolae verisimiliter medicus, mihi non est notus. „P. S. — Itineris usque in crastinam diem dilatione ntor, ut unicam practicam observationem Tibi forte non ingratam literis meis addere possim. Angina pectoris per viginti jam annos laborans, quae vix unquam ante prandium me invadebat, sed vespertino tempore et semper in hyeme ambulanti detinebat, ut post 5. aut 6. minuta gressum sistere deberem; ante hunc tandem post superatam febrem perniciosam, arthritici effectus sequebantur et me per octo menses ambulandi incapacem in lecto detinebant, per quod tempus antiqua mea pectoris affectio adeo increvit, ut ad animi deliquium usque perveniret; plerumque noctu hora undecima cum calore me paroxysmus invadebat per dimidiam circiter horam durans, in hoc molestissimo statu unicum et nunquam fallax auxilium mihi fuit aqua frigida externe capiti applicata, quamquam solum linteorum hac imbutorum ope dissiparetur paroxysmus, longe citius tamen hic evanescebat, quando manus sinistrae tunc dolentis vola et explicatis digitis a vertice capitis manus sinistra madefacta per frontem, oculos et tempora deorsum versus ducebatur, et identidem aquae frigidae immergebatur, quae negativa

naribus admovendi 6), aërem in pulmones introducendi ictumque *electricum* per pectus dirigendi 7).

CAPUT XII.

De cordis volumine et capacitate auctis et imminutis.

§. XLVI.

De volumine cordis aucto, speciatim per incrassationem substantiae muscularis.

Exempla. 1. **E**xempla cordis volumine aucti (saepe sub nomine *aneurysmatis*) descripta inveniuntur apud PACCHIONI ¹⁾, BARTHOLINI ²⁾, FANTONI ³⁾,
BLAN-

sive calmans per magnetismum methodus est, ante cujus inventionem ad agonis conditionem appropinquabam.“

6) Idem ib.

7) Idem ib. — REEDER *a practical treatise on the inflammatory, organic and sympathetic diseases of the heart.* Lond. 1821.

1) Opp. p. 211. 214.

2) Hist. anat. med. Cent. I. hist. 45. T. I. p. 72. Cent. II. hist. 66. T. I. p. 291.

3) Observationes anatomicae med. 7. 19. 22. 29. 34.

BLANCARD ⁴⁾, HALLER ⁵⁾, MORGAGNI ⁶⁾, HAEN ⁷⁾,
 BAADER ⁸⁾, HEISINGER ⁹⁾, STOERK ¹⁰⁾, VIEUS-
 SENS ¹¹⁾, MICHAELIS ¹²⁾, SANDIFORT ¹³⁾, LIEU-
 TAUD ¹⁴⁾, LANCISI ¹⁵⁾, MATANI ¹⁶⁾, LAUTH ¹⁷⁾,
 WILDBERG ¹⁸⁾, FERRIAR ¹⁹⁾, aliosque ²⁰⁾ infra
 recensendos.

2. Vo-

- 4) Anatomia practica rationalis. Cent. I. Obs. 7. p. 13.
 Obs. 8. p. 16.
- 5) Opp. anat. minor. p. 299.
- 6) De sed. et caus. morb. Epist. XVII. 8. 10. 23. 25. Ep.
 XVIII. 14. Ep. XXI. 34. Ep. XXIII. 6. Ep. XXV. 2.
 Ep. XXVII. 12. Ep. XXXVIII. 12. Ep. XLII. 34. Ep.
 XLV. 23. Ep. XLIV. 19. Ep. LIII. 9. Ep. LVI. 7. 17.
 Ep. LXX. 10.
- 7) Rat. med. 2. Vol. 4. Par. C. 2—5. C. 6.
- 8) Obs. med. p. 21.
- 9) Diss. sistens historiam hydropis pectoris cum aneu-
 rysmate cordis. Vien. 1770.
- 10) Annus medicus II. p. 158 et 171.
- 11) *Traité sur la structure du coeur.* p. 103. 109.
- 12) Diss. aneurysmatum cordis disqu. anat. med. ob-
 servatione illustrata. Halae 1785.
- 13) Obs. anat. pathol. Lib I. Cap. I. p. 27.
- 14) Hist. anat. med. Lib. II. Sect. Obs. 405—447. Obs.
 601—606. T. II. p. 129. 186.
- 15) De motu cordis et aneurysmatibus. P. II. Cap. 5.
 p. 281.
- 16) De aneurysmaticis praecordiorum morbis. Francof.
 1766.
- 17) Scriptorum latinorum de aneurysmatibus collectio.
 cum XV. iconibus. Arg. 1785.
- 18) In *Abhandl. der physik. mediz. Societät zu Erlangen.*
 1. B. N. 16.

Distinctio. 2. Volumen cordis auctum non semper sociam agnoscit *cavitatum capacitatem auctam*. Immo visa sunt corda magna cum capacitate cavitatum imminuta ²¹⁾. Ex quo intelligitur cordis *volumen auctum* ²²⁾, quatenus respicit incrassationem substantiae muscularis, a *capacitate aucta*, quatenus respicit diametrum ventriculorum et auricularum, distinguendum esse.

Symptomata in-
crassationis sub-
stantiae
cordis.

3. Morbi, post quos *simplex incrassatio substantiae cordis* detecta est, exhibuerunt: pulsum debilem, interdum tremulum, vix perceptibilem, alias frequentem et tensum, motum cordis irregularem, animi deliquia, angustias summas et dyspnoeam ²²⁾.

4. An-

19) *Von der Dilatation des Herzens, in seinen neuen Bemerkungen über Wassersucht, Wahnsinn. A. d. Engl. Leipz. 1793. 8. Kap. p. 74.*

20) *Miscell. Nat. Cur. Dec. I. A. 1. Obs. 7. — Dec. I. A. 4. Obs. 41. — Dec. II. A. 5. Obs. 64. in Act. N. Cur. Vol. VIII. Obs. 3. — Mem. de l'acad. des scienc. de Paris 1713. p. 158. — Journal de méd. T. XII T. XIII. p. 410. — Philosoph. Transact. Vol. LII. p. 344.*

21) BURNS l. c. p. 45: „Zuweilen erscheint das Herz dem äußern Ansehen nach sehr groß, aber seine Höhlen sind sehr klein.“ — „Ich habe ein Herz gesehen, das mehrere Pfunde wog, dessen Höhlen aber nicht größer waren wie gewöhnlich.“ Cfr. J. BELL in *Abh. f. pr. Aerzte.* 17. B. p. 517.

22) Hypertrophia cordis. LAENNECII l. c. p. 258.

22) J. BELL l. c. BURNS l. c. p. 46.: „Die Vergrößer-

4. Antecesserunt illos morbos crapula ²³⁾, Causae potus liquorum fermentatorum ²⁴⁾, et animi pa ^{incras-} ^{tionis sub-} ^{stantiae} ^{cordis.} ²⁵⁾).

5. Causae isthaec, inflammationem cordis, Diagnosis cum exsudatione lymphae coagulabilis inter fibras ^{incras-} ^{tionis sub-} ^{stantiae} ^{cordis.} illius musculares gignunt. Talis status ad in- ^{durationem} ²⁶⁾ spectat; debetque ab incrassatione ipsius substantia cordis (quatenus illa pullulat ex primitivâ formâ, ex vitae genere *) ex conge-
stione

rung des Herzens durch Vermehrung der Substanz verursacht eine traurige Krankheit, bei der nur wenig Erleichterung möglich ist, welche die Kraft des Körpers erschöpft, und die des Geistes niederbeugt, die jede Freude in ihrer Quelle stört und den Kranken mit dem unaufhörlichen Gefühl seines augenblicklichen Todes ängstiget.“

23) MATANI l. c.

24) LANCISIUS von den verschiedenen plötzlichen Todesarten. 2. B. p. 130. — BOERHAAVE l. c. (*Abhandl. f. pr. Aerzte.* 9. B. p. 498.).

25) In proprio aegrotō.

26) P. I. Vol. I. Appendix. §. LXXVIII. N. 4.

*) VOIGTEL *Handb. d. pathol. Anatomie.* 1. Th. p. 392.

„Die widernatürliche Größe des Herzens ist entweder ein Fehler der ersten Bildung, oder Folge der Lebensart, und die Personen, bei welchen man diese fund, waren übrigens gesund, ohne hervorstechende Zeichen einer solchen Widernatürlichkeit.“ CORVISART

l. c. p. 63.: „Nous avons bien, que son volume du coeur, varie selon l'age, le sexe, le tempérament, le genre de vie etc.“

stione sanguinis in vasis coronariis ²⁷⁾), probe distingui. Ibi enim cordis torpor ²⁸⁾ (ut allata symptomata docent) expectandus, hic vero illius vigor. Ut in definienda incrassatione cordis norma habeatur ponderis normalis hujus visceris memores esse juvabit ^{**}). Incrassatio morbosa substantiae cordis nunc *in toto viscere*, nunc *in una tantum ejus parte*, locum obtinet, quod in aegro ope stethoscopii sui dignoscere se posse contendit LAENNEC ²⁹⁾.

6. In-

27) PORTAL l. c. infra citando.

28) KREISIG l. c. 2. Th. p. 321.: „Aus allem diesen folgt, daß die Herzsubstanz scheinbar eine Vermehrung in normaler Substanz gewonnen haben könne; indeß eigentlich ein Zustand von Metamorphose gegenwärtig ist, der jede Idee von vermehrter Energie ausschließt.“
Egregius Vir sic CORVISARTI l. c. p. 64. opinionem aggreditur, utpote qui docuit, volumen substantiae cordis auctum, quoque vim auctam gignere. Cujus opinionis falsitatem demonstrant quoque PORTAL (*Mémoires sur la nature et le traitement des plusieurs maladies*. Vol. 4. Paris 1819.).

**) HALLER opuscula physiologica. T. II. p. 130. (Decem unciarum).

29) l. ci p. 260.: „La contraction du ventricule gauche, explorée entre les cartilages des cinquième et sixième côtes sternales, donne une impulsion très forte et un bruit plus sourd que dans l'état naturel; elle est d'autant plus prolongée que l'hypertrophie est plus considérable. La contraction de l'oreillette est très brève, peu sonore, et par là même à peine sensible dans les cas extrêmes. Les battemens du coeur ne s'entendent

6. Incrassationi legitimae fibrarum cordis, Cura in-
 auxilia, quae adversus nimiam cordis energiam ^{crassatio-}
 commendaturi sumus ^{nis sub-} ^{stantiae} ^{cordis:} ³⁰⁾, opponenda sunt. Quid
 contra *indurationem substantiae cordis* ex in-
 flammatione agendum sit, ignoramus. Commen-
 dantur *) verno tempore succi herbarum resol-
 ventium, aestate serum lactis, autumno esus
 uvarum, ac, nisi peculiares obstant contrain-
 dicationes, usus aquae Carolinensis, Selteranae,
 non neglectis diaeta simplici, fonticulis et em-
 plastris resolventibus circa cordis regionem.

§. XLVII.

*De volumine cordis imminuto, speciatim ab extenua-
 tione substantiae muscularis.*

1. *Exempla cordis voluminis imminuti leguntur* ^{Exempla.}
 apud KERKRING ³¹⁾, RIOLANUM ³²⁾, VAN DER
 WIEL ³³⁾, BONET ³⁴⁾, MORGAGNI ³⁵⁾, LIEU-
 TAUD ³⁶⁾,

que dans une petite étendue.“ p. 263.: „Duns l’hyper-
 trophie du ventricule droit le coeur donne une im-
 pulsion plus forte sous la partie inférieure du sternum
 qu’entre les cartilages des cinquièmes et septièmes côtes
 et le contraire a lieu, comme nous l’avons vu dans les
 affections du gâuche.“

30) §. LI. N. 2.

*) KREYSIG l. c. 2. Th. p. 735 — 740.

31) Specil. anat. p. 43. (cor magnitudinis recens nati in
 puero novem annorum).

32) Anthropographia L. III. G. 12.

33) Cent. I. Obs. 37.

34) Sepulchr. Lib. IV. Sect. 12. Obs. 7.

FRANK PRAX. II. 2. c.

R

TAUD ³⁵⁾, STOERK ³⁷⁾, CHAVASSE ³⁸⁾, BLANCARD ³⁹⁾, BRERA ⁴⁰⁾, TESTA ⁴¹⁾, ALLAN BURNS ⁴²⁾, PORTAL ⁴³⁾, HODGSON ⁴⁴⁾, LAENNEC ⁴⁵⁾ aliosque ⁴⁶⁾.

Distinctio. 2. Et cordis volumen imminutum non semper capacitatem cavitatum imminutam sociam habeat. Saepissime enim illud originem debet *extenuationi substantiae muscularis*. GALENUS jam dixerat, quod in tabe cor exsiccatur et colliquescit ⁴⁷⁾, quam observationem confirmarunt SALIUS DIVERSUS ⁴⁸⁾, ZACUTUS LUSITANUS ⁴⁹⁾,

SPIE-

35) Epist. LXX. 5. Cfr. Ep. XVII. 12. Ep. XXX. 10. — Ep. L. 4.

36) Hist. anat. med. Lib. II. Obs. 448. 449. 453.

37) Ann. med. II. p. 231. (cor magnitudinis ovi gallinaei in femina).

38) *London medical Journal* 1786. p. 409. v. *Samml. ausserles. Abh. f. pr. Aerzte*. 11. B. p. 695. (In viro sexaginta quatuor annorum cor minus quam in recens nato).

39) Collect. med. phys. Cent. I. N. 33.

40) Rapporto degl' anni 1809—1810.

41) Op. c. p. 385.

42) Op. c. p. 125.

43) *Cours d'anatomie médicale*. Tom. V. p. 88.

44) Op. c. p. 61.

45) Op. c. p. 291.

46) *Mém. de l'académie des sciences de Paris*. 1712. — Miscell. Nat. Cur. Dec. III. A. 4.

47) De marasmo p. 376. Cfr. de locis adfectis Lib. V. p. 296.

48) De curat. partio. Cap. 7.

SPIELENBERG ⁵⁰⁾, VESTI ⁵¹⁾, et propria experientia ⁵²⁾.

3. *Symptomata* extenuationis substantiae cor- Sympt. ex-
dis sunt, interdum macies ⁵³⁾, saepe vomitus ⁵⁴⁾, nis sub-
dolores lancinantes pectoris ⁵⁵⁾, palpitatione cor-
dis ⁵⁶⁾, vertigo ⁵⁷⁾, lipothymiae pulsus parvus, stantiae
durus, frequens ⁵⁸⁾ cum reliquis symptomatibus cordis.
febrilibus ⁵⁹⁾. Inter haec, in senibus, inprimis
sitin inexplebilem et *linguae ariditatem* illius-
que, si dicere liceat, extenuationem (veram condi-
tionis cordis imaginem) observavimus ⁶⁰⁾.

R 2

4. Praxis.

49) Praxis admiranda. Lib. II. Obs. 137.

50) BONET Sepulchr. Lib. II. p. 740.

51) Dissert. qua haecica cardiaca publico examini submittitur. Erf. 1697.

52) Vide infra. N. 4 (60).

53) SALIUS DIVERSUS l. c.

54) MORGAGNI Epist. XXX. 10. TESTA l. c.

55) MORGAGNI l. c.

56) CHAVASSE l. c. HODGSON l. c.

57) HODGSON l. c.

58) KERKRIING l. c.

59) ZACUTUS LUSITANUS l. c.

60) Nosocomium generale Vindobonense, quamvis *civilem* sit, nihilominus milites quoque veteranos, custodiae Aulae Imperatoriae addictos, in peculiaribus cubicula, *Hispanica* dicta, accipit. Hujusmodi cubiculorum inter alia medicus primarius fueram. Peculiari propter id opportunitate, *morbos senum* observandi fruebar. Inter hos haud raro obveniebat summus languor, cum pulsu parvo, duritie non destituito, proclivitate ad lipothymias, sensu angustiae circa cor,

Autopsiae
cadave-
rum.

4. Praeter extenuationem substantiae, corda, de quibus agitur, exhibebant flacciditatem ⁶¹⁾, conditionem friabilem ⁶²⁾, venas coronarias varicosas ⁶³⁾ et concrementum osseum magnitudinis amygdalae ⁶⁴⁾. Reperiebatur praeterea ossescencia in centro diaphragmatis ⁶⁵⁾. Sunt qui de corde a calore febrili consumto narrant ⁶⁶⁾.

5. Cor-
siti inexplibili et lingua ita arida, ut radulae similis evaderet, ac loquelam, antequam os non humectaretur, plane impediret. Urina erat pauca, cum pellicula iridis colores referente, foetidaque. Cutis siccissima. Interdum tussicula cum nonnullis striis sanguineis accedebat. Circa tertiam morbi hebdomadem pulsu intermittente diffluentique reddito, sopor superveniebat, interitum, ut crediderim, ex *marasmo senili*, annuntians. Sectis nonnullis cadaveribus, nil inveni praeterquam quod cor parvum, veluti corrugatum et pericardium ferme sine liquore consueto. Tanto morbo leve saepe refrigerium occasionem dederat.

61) TESTA l. c.

62) HUNTER in casu a JOHNSTON (*Memoirs of the medical Society of London. Vol. I. p. 380.*) pro angore pectoris habito, *cor adeo friabile* invenit, ut minima adhibita vi id digito perforaret. ARENSIDE (*Leske auserlesene Abhandl. aus d. philosoph. Transact. 5. Th. N. 60.*) locum cordis veluti in gelatinam conversum detexit. Cfr. Cap. XIII. §. LIV. N. 2 (74).

63) MORGAGNI l. c. (in bajulo).

64) SPIELENBERGER l. c.

65) MORGAGNI Ep. LXX. 5. Cfr. HÖRNIGK in HAL-
LERI dissert. pract. T. VI. p. 344.

66) TELESIIUS de rer. natur. L. V. C. 28. Apud SCHENK

5. Cordis extenuationem producere videntur **CAUSSAE**. jejunium ⁶⁷⁾, animi pathemata ⁶⁸⁾, motus nimius ⁶⁹⁾, frigus ⁷⁰⁾; num *carditidem* excitando? Sic verisimile est ⁷¹⁾. Interea et deletus influxus nervosus aut ob affectiones graves cerebri, aut ob tumores nervos vagos comprimentes ⁷²⁾, praetervideri haud debet. Ex illa saltem causa conversio substantiae cordis in materiem lardaceam, cerebriformem observata fuit ⁷³⁾.

6. Cae-

Obs. Lib. II. p. 272. Verisimiliter casus hic illi quem ipse observavi atque descripsi (v. supra Cap. VII. §. XXIII. N. 2 (82)), similis est.

67) J. ANTON VAN DER LINDEN Select. med. IX. p. 261. (Aeger ob ulcera oesophagi nutrimenta sumere haud potuit; cor erat exsiccatum).

68) Vulgus Romae jam animi pathemata vehementia pro causa exsiccationis cordis habuisse, ex PLAUTO (Mercat. Act. I. Scena 2. v. 200.) elucet.

69) MORGAGNI Epist. LX. 8. (cordis apex dextrorsum vergebat).

70) v. supra.

71) TESTA l. c. p. 387.: „Ich glaube nicht mit Unrecht zur Erklärung des Schwindens des Herzens eine langwierige Entzündung annehmen zu können.

72) Cap. XIII. §. LIV. N. 2 (82).

73) Cfr. CORVISART l. c. p. 182. (*sur la dégénération graisseuse du tissu musculaire du coeur*) ac antecessores illius HALLER et VICQ-D'AZYR (*Oeuvres T. 5. édit. de Mr. MOREAU*). Praeprimis vero observationes DUNCANII (*The Edinburgh medical and surgical Journal 1816.*) et CHEYNEI (*The Dublin hospital reports and communications in medecine and surgery Vol. 2.*

Diagnosis. 6. Caeterum, cur et sine inflammatione cor, aliorum musculorum instar, in *marasium* incidere non posset, haud intelligimus. Ne vero cor sanguine vacuum, ut in plurimis aut repentine ⁷⁴⁾, aut phthisi pulmonali ⁷⁵⁾ peremptis, delegitur, pro extenuato habeatur, ad volumen cordis imminutum concludere vix licet, nisi simul pericardium ⁷⁶⁾ et vasa majora id vitii genus cum corde participant. Tandem, non ignorandum posse cordis volumen, a causis illud extrinsece comprimantibus, e. c. a sero in pericardio incluso, et a tumoribus, imminui.

7. In

1818.) memorabiles sunt quatenus de degeneratione substantiae muscularis cordis in adipem post apoplexias testantur. Cfr. K. F. E. BARTIKY diss. observ. singularis in fungi medullaris in corde. Praef. est K. H. DZONDI. Hal. 1821. c. tab. lithogr.

74) BURNS l. c.: „In den Leichen solcher Personen, die der Tod in ihrer vollen Kraft überrascht hat, finden wir das Herz, seinem äusseren Ansehen nach, oft sehr zusammengezogen; diese Erscheinung rührt jedoch in der Regel blos von dem blutleeren Zustande seiner Höhlen her.“

75) PORTAL l. c.

76) BURNS l. c. p. 126.: „Wo das Herz klein gefunden wird, da untersuche man die Beschaffenheit des Herzbeutels sorgfältig, denn wenn dieser gegen das in ihm enthaltene Herz grösser als gewöhnlich ist, so dürfen wir ohne Bedenken annehmen, das Herz erscheine blos deshalb kleiner, weil seine Höhlen blutleer und seine Fasern zusammengezogen sind.“

7. In illa dumtaxat extenuationis substantiae ^{Prognosis.} cordis specie, quae a statu inflammatorio ortum trahit, morbo nature cognito, sanitatis spei scintilla apparet.

8. Atque hîc methodus antiphlogistica, cale- ^{Cura.} facientibus remediis, quae saepe ab aetate pro- vecta aegrorum nec non a virium jactura indicari videntur anteponenda foret. Pharmaca enim cardiaca, in illa tantum atrophiae cordis specie, quae inflammationis ideam excludit, locum habere possunt, nisi jam nutrientia lenia, e. c. lac, juscula carnea et viperarum, aquae chalybeatae, aër rusticanus, motus passivus, ad metam con- ducant.

§. XLVIII.

De capacitate cavitatum cordis aucta cum incrassatione substantiae.

1. *Singularum cavitatum cordis aucta capa-* ^{Visceris} *citas, cum incrassatione substantiae muscularis,* ^{universi.} raro observatur. Vidimus ⁷⁸⁾ illam videruntque ^{MARCHETTI} ⁷⁹⁾, ^{LAURENTIUS} ⁸⁰⁾, ^{LANCISIUS} ⁸¹⁾,

MOR-

78) RIEL Diss. de dilatatione cordis. Vilnae 1819. (Volumen quadruplum. Longitudo a basi ad apicem pollices 7. — latitudo 6, — crassities parietum $3\frac{1}{2}$. Sex libras materiei pro injectione inservientes capiebat. Mirum hoc praeparatum conservatur in Musaeo pathol. C. Univ. Vilnensis.

79) Observat. chirurg. Obs. 49. (Triplo cor magnitudinem normalem excedebat).

MORGAGNI ⁸²⁾, FORTANI ⁸³⁾, OGLE ⁸⁴⁾, CORVISANT ⁸⁵⁾, TESTA ⁸⁶⁾, PORTAL ⁸⁷⁾ et KREYSIG ⁸⁸⁾. Aegroti patiebantur pectoris oppressionem et anxietatem ⁸⁹⁾; respirationem difficilem, imprimis sub corporis motu et post pastum ⁹⁰⁾; tussin et sputum cruentum ⁹¹⁾; livorem et oedema faciei;
cordis

80) Hist. anat. Lib. IX. Quaest. 18. (Cor totum fere cavum pectoris occupabat. Quivis ventriculus circa quatuor libras cruoris continebat. Ostium aortae circumferentiam brachii adaequabat).

81) LIEUTAUD l. c. Obs. 414. p. 136. (Cor triplo majus, ponderis sesquitertiae librae).

82) Epist. LXIV. 5.

83) Rariores observationes medico-pract. Dec. I. p. 75. Sen. 1769.

84) *Memoirs of the medical Society of London. Vol. I.*

85) l. c. p. 70. Obs. 12. (Volumen cordis duplex).

86) l. c. p. 364. (cum symphysis cardiaca et hydropo cruento pericardii) p. 366. (maximum cor quod unquam viderat).

87) *Abhandlung über die Aneurysmen des Herzens, bei denen die Wände dieses Organes statt dünner geworden zu seyn, ihre natürliche Dicke behalten haben, oder noch dicker geworden sind. A. d. Fr. übersetzt. v. HUFELAND's Journal d. pr. Heilkunde 1819. Octob. p. 52. Habetur et versio Italica auctore PLACIDO PORTAL Napoli 1819.*

88) l. c. 3. Th. p. 84—89. (circumferentia baseos pollicum rhenanorum $13\frac{1}{2}$ — longitudo pollicum 6.),

89) RIEL l. c.

90) Idem, ib.

91) FORTANI, CORVISANT, RIEL l. c.

cordis vehementem palpitationem ⁹²⁾, auditu percipiendam, tactuique ita obviam ut manum cordis regioni imponendo, contractio alternans, prius atriorum, dein vero ventriculorum distinguere potuerit ⁹³⁾; pulsationem epigastrii et hypochondrii dextri *); pulsum fortem, plenum, regularem et frequentem ⁹⁴⁾, alias parvum, debilem, irregularem, creberrimum et vix numerandum ⁹⁵⁾, decubitum supinum impeditum ⁹⁶⁾, atque lipothymias ⁹⁷⁾. Cordis regio lege artis percussa sonum obscurum edebat ⁹⁸⁾. Praegressi orant, nisus ⁹⁹⁾, terror ¹⁰⁰⁾, morbi cutanei **)

(psora,

92) CORVISART l. c.

93) RIEL l. c. p. 9. Initium historiae morbi quo haec aegra laborat, supra descriptum est. Cap. VII. §. XXIV N. 2 (48).

*) RIEL l. c.

94) CORVISART l. c.

95) RIEL l. c.

96) RIEL l. c.

97) MORGAGNI Lib. II. Epist. XVII. 21. Epist. XVIII. 2. Epist. XXIV. 13. Ep. XXV. 2. SENAC T. II. p. 396. 434. 452. 470. 501.

98) CORVISART, RIEL.

99) CORVISART l. c. p. 70.

100) Cap. VII. §. XXIV. N. 2 (48). Simile quodammodo exemplum in viro vidi in flumine sancto (*święta rzeczka*) prope *Wiśkomierz* mense Januario a. 1814. submerso ac salvato quidem, verum relictis singulis dilatationis cordis symptomatibus.

**) MORGAGNI, SENAC, CORVISART, TESTA, KREYSIG l. c. 2. Th. p. 353.

(psora, herpes), syphilis et abusus mercurii ¹⁾, scrophulae et rhachitis ²⁾, scorbutus et chlorosis ³⁾, nec non arthritis ⁴⁾. Causae istiusmodi cum sint eae ipsae quae pericarditidem gignant ⁵⁾, capacitatem cavitatum cordis auctam cum incrassatione substantiae muscularis a praegressa inflammatione repetimus.

Ventriculi
sinistri.

2. Haud rara est *capacitas aucta ventriculi sinistri cordis cum incrassatione substantiae muscularis*. Exempla narrantur a SWIETEN ⁶⁾, WALTER ⁷⁾, BAILLIE ⁸⁾, VOIGTEL ⁹⁾, et CORVISART ¹⁰⁾ colligimusque propria. Simul reperiuntur valvulae mitrales ossificatae ¹¹⁾, condylomatibus notatae ¹²⁾ et orificium aortae angustatum ¹³⁾.

1) ALBERTINI, KREYSIG l. c.

2) TESTA l. c.

3) FERRIAR, PORTAL, KREYSIG l. c.

4) „eben so endlich die Gicht, deren großen Einfluss auf Erweiterungen des Herzens schon PITCAIRNE aus Erfahrung kannte.“ KREYSIG l. c. p. 353.

5) Cap. VII. §. XXIV.

6) Comment. in BOERHAAVII Aphor. T. I. p. 292. (Volumen triplum illo ventriculi dextri).

7) In Mém. de l'acad. R. de Berlin 1785. Tab. IV. fig. I.

8) Engraving. Fasc. I. Tab. 3.

9) Handbuch der patholog. Anatomie. 1. B. p. 387. (Volumen duplex illo ventriculi dextri).

10) l. c. p. 74.

11) VOIGTEL l. c.

12) CORVISART l. c.

tum¹³⁾. Aegri vero exhibebant tussin habitualement, pulsationem cordis, angustiam, lipothymias, pulsusque sat fortes, frequentes, motui cordis respondentes¹⁴⁾. Praegressae erant febres intermittentes, animi pathemata ingrata, vigiliae, labores immodici¹⁵⁾.

3. *Capacitas aucta ventriculi cordis dextri* ^{Ventriculi dextri.} *cum incrassatione substantiae muscularis rarior* ^{dextri.} *est*¹⁶⁾. Describitur casus a CORVISARTIO¹⁷⁾. Aegrotus triginta octo annorum erat robustus, plethoricus, irascibilis, ac sub irae accessu, ad suicidium pronus. Laborabat palpitatione cordis sub minimo motu excitata. Facies erat tumidula, rubra; respiratio valde difficilis, pulsus fortis, plenus, frequens, vibrans et irregularis.

4. *Dilatationum auricularum, cordis volu-* ^{Auricularum.} *men. aemulantium, descripsit BALLONIUS*¹⁸⁾ *plurimaque exempla propria suppeditat observatio.* CORVISART de eodem malo cum *incrassatione substantiae auricularum* et angustatione aperturae, communicationem auriculam inter et ventriculū cordis sinistri efficientis, rationem reddit. Praegressa erat difficultas spirandi, cum sensu suffocationis

13) Ego.

14) Excepto eo casu ubi orificium ventriculi aut venosum aut arteriosum angustatum est.

15) CORVISART l. c. p. 74.

16) Idem l. c. p. 82.

17) l. c.

18) Epid. Et Ephemer. L. 6. p. 145.

cationis et pulsatione cordis sub gressu velociore, decubitus impeditus in latus sinistrum, pulsus inprimis in brachio dextro, contractus, parvus, frequens, debilis. Regio cordis nihilominus pulsationes fortes exhibebat, ac lege artis percussa, minime sonum edebat. Hydrops vitae finem imposuit. Gravissima animi pathemata ¹⁹⁾ morbo ansam dederunt.

§. XLIX.

De capacitate cavitatum cordis aucta cum extenuatione substantiae.

Visceris
universi.

1. *Capacitas cavitatum cordis aucta cum extenuatione substantiae universi visceris communissima est; inprimis juncta vitiis aortae illius scilicet angustationi ²⁰⁾, dilatationi ²¹⁾ et lithiasi ²²⁾. Cor, instar vesicae urinariae retentione lotii laborantis, mechanice hinc dilatari videtur ²³⁾. Ac re quidem vera, semper id cruore obrutum*

19) „des violens chagrins causés (dans le commencement de la revolution) par le massacre d'une partie de sa famille, et par la perte de sa fortune.“ CORVISART l. c. p. 85.

20) MORGAGNI Epist. XVIII. 6. CORVISART l. c. p. 96. 100.

21) MORGAGNI Epist. XVII. 10. 23. 25. Ep. XVIII. 28.

22) MORGAGNI Epist. XVIII. 2. VERDRIES Miscell. N. Cur. Cent. VI. Obs. 51. ZWINGER Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 18.

23) Ex capite XVI. §. LXV. N. 1. intelligitur, talem

obrutum invenitur. Aegri qui sic patiuntur, pulsationem cordis late extensam, respirationem brevem sonoram, tussin frequentem, cum sputis cruentis, loquelam difficilem, pulsum debilem, parvum, frequentem et irregularem, vibrationem carotidum crurumque oedema habent.

2. *Dilatatio ventriculi sinistri cordis cum* ^{Ventriculi} *extenuatione substantiae* describitur a CORVISAR-^{sinistri.} TIO ²⁴). Cordis volumen enorme erat, consistentia flaccida, color fibrarum pallidus, parietes ventriculi sinistri, qui reliquas cavitates amplitudine superabat, extenuati, orificium aortae punctis osseis notatum. Aeger post gravia animi pathemata in stuporem, tussin, palpitationem cordis et vesaniae paroxysmum inciderat. Genae illi erant lividae, respiratio sonora, brevis, intersecta, motus cordis debilis, extensus, frequens, et pulsus intermittens.

3. *Dilatatio ventriculi dextri cordis cum* ^{Ventricu-} *exte-* ^{lus dexter.}

cordis dilatationem *aneurysma cordis verum* nuncupari posse. *Aneurysma cordis spurium* illud foret, si lacerata aut erosa quodam in loco membrana interna et substantia musculari hujus visceris, membrana illius externa a sanguine in illum irruente, promineret, sacsumque cum ventriculo alterutro cordis communicantem constitueret. Talis casus describitur a CORVISARTIO (l. c. p. 272. Obs. 42.) et PUERARIO (Observ. select. additae thesauro med. pract. BURNETI L. III. Sect. 68. p. 345.). Cfr. KREYSIG l. c. 2. Th. p. 379. 24) l. c. p. 103. Obs. 20.

extenuatione substantiae, ut rara, binis observationibus describitur²⁵). Aegrorum unus senex, tussi chronica laborabat, supervenientibus, post gestationem gravis ponderis, dyspnoea, dolore acuto thoracis sinistri, decubitu supino denegato, pulsu frequente, molli, passim irregulari, venis cutaneis cruore turgidis, pulsatione cordis et somniis terrificis. Praeter affectionem ventriculi cordis dextri lithiasis arteriarum coronariarum et angustatio ostii aortae reperiebantur. Aeger alter, senex quoque, post peripneumoniam retinuit sensum suffocationis cum decubitu supino denegato. Labia illi erant livida, pulsus parvus, frequens, profundus et irregularis. Sub tussi rejiciebat sputa viscosa sanguine atro tincta. Loco palpitationis sensum tumultus circa cor experiebatur. Cordis abnormis magnitudo unice dilatationi ventriculi dextri debebatur. Pulmones erant duri.

Auricula
dextra.

4. Communissima omnium est *dilatatio auriculae cordis dextrae simul cum extenuatione substantiae*²⁶). Ne illam praepostere pro peculiari morbo habeamus! in omni enim moriente potest esse effectus difficultatis, quam sanguis, per venas cavas adductus, in circulo suo per pulmo-

25) CORVISART l. c. p. 105. Obs. 21. 22.

26) KERKING Specil. Anat. Obs. 16. p. 39. — CHEMIN in *Journal de méd.* 1760. Avril. T. 12. — LIEUTAUD op. c. Lib. II. Sect. II. Obs. 405. a. 415. 601. 603. 605. 605. p. 131. 137. 186.

pulmones experitur. Gignere quoque possunt dilatationem de qua agitur, angustatio arteriae pulmonalis, infarctus pulmonum, vitia auriculae et ventriculi sinistri cordis, et maxime àneurysmata aortae. Dilatationem auriculae dextrae cordis cum extenuatione substantiae, comitabatur, in femina, livor labiorum, dolor thoracis sinistri, tumultus et palpitatio circa cor, respiratio difficilis, decubitus in latus sinistrum denegatus, et hydrops ²⁷⁾).

5. *Dilatatio auriculae sinistrae cordis cum* ^{Auricula sinistra.} *extenuatione substantiae* haud frequens est ²⁸⁾. Aeger hoc morbo laborans (praegressis obnubilatione, palpitatione cordis et dyspnoea), faciem lividam, pulsumque mollem frequentem et irregularem exhibuit. Ultimis vitae momentis, miser, manus cordis regioni admovebat, illamque unguibus lacerabat ²⁹⁾).

§. L.

27) CORVISART l. c. p. 112. Obs. 23.

28) CORVISART l. c. p. 119. Exemplum legitur apud LIEUTAUD l. c. Obs. 606. p. 188. et Obs. 407. p. 133.

29) Hoc symptoma nuper in puella quatuor annorum, sub curriculo scarlatinae, observavi. Aderant praeterea: summa inquietudo, pulsatio cordis, pulsus frequentissimus et durus, flatusque involuntarius, quia symptomata constanter hora sexta vespertina inguebant, horamque unam alteramve saeviebant. Infans ante nonnullos menses a puero socio, qui ludendo ursum simulabat, vehementer terrefactus fuit. Hirundines regioni cordi admotae et emulsio ex seminibus hyoscyami, tam grave malum miraculi instar debella-

§. L.

*Monita circa diagnosin dilatationis cordis.*Genera-
tim.

1. Ex observationibus collectis ³⁰⁾ elucet, capacitatem auctam cavitationum cordis, sociis tum incrassatione, tum extenuatione substantiae, eadem prorsus symptomata agnoscere et ab iisdem plane noxis excitari. Conatus hinc, illa vitia cordis ad lectos aegrorum a se invicem distinguendi, vanus est. Signa etenim quae alias *incrassationem* et *extenuationem* substantiae cordis quodammodo indicare valent ³¹⁾, praesente simul illius visceris dilatatione, diluuntur. Nec facultas concessa est, dilatationes *cordis sinistri* a dilatationibus *cordis dextri* secure distinguendi. Asserunt ³²⁾ quidem morbos *cordis dextri* magis *respirationis negotium*, et, illas *cordis sinistri* magis *circuitum sanguinis*, perturbare, — atque ibi plus *systema venosum* (inprimis venas jugulares), hic vero plus *systema arteriosum* (maxime arterias carotides) pati; — at verò assertiones huiusmodi nequiquam ab experientia confirmantur: neque id mirum, dum perpendimus nexum intimum inter cor dextrum et sinistrum, et complica-

runt; scarlatina dein curriculum suum placide absolvente.

30) §. XLVIII. XLIX.

31) §. XLVI, XLVII.

32) SENAC l. c. *Livr. IV. Chap. 8. 9.* — CORVISART l.

c. p. 145. — KREYSIG l. c. 2. Th. p. 65.

plicationes vitiorum quibus subjiciuntur³³). Quae cum ita sint, satius erit praesentiam dilatationis cordis *generatim* statuere³⁴).

2. Sunt autem *signa generalia dilatationis* S. generalis dilatationis cordis. varia pro vario morbi stadio. *Morbo incipiente* observantur facies praeter consuetudinem rubens calensque, animus irritabilis, cita defatigatio³⁵), obnubilatio, motus cordis inconsuetus, pulsus durus,

33) Eaedem sane causae (e. c. inflammatio) quae in una cordis parte incrassationem aut dilatationem producere possunt, in altera extenuationem et angustiam gignere valent. Immo, angustata una cordis parte, altera, quae illi cruorem transmittere deberet, utpote ab hoc fluido (in fluxu suo impedito), distensa, necessario dilatari oportet. Combinationes, quae ex complicatione variorum vitiorum cordis oriri possunt, instar illarum literarum alphabeti, in infinitum multiplicare licet. Plurimas describere conatus est Cl. KREYSIG (l. c. 2. Th. p. 349 — 359.); num cum scientiae lucro? Certe cum lectoris taedio.

34) Dico cum TESTA (l. c. p. 382.): „Man sieht aus allem diesem, daß ich zwar im Stande zu seyn glaube, die Krankheiten des Herzens im Allgemeinen, aus bestimmten Merkmalen zu erkennen; aber daß ich mir nicht anmaße, die besondere Natur und den Ausgang dieser Fehler in jedem vorkommenden Falle zu beurtheilen.“ Similia jam dudum ALBERTINI factus est. Vide supra Cap. IV. §. XII. N. 2 (98).

35) Ait TESTA (l. c. p. 374.): „Auch glaube ich bemerkt zu haben, daß das unvermuthete Schwinden der Kräfte vielmehr zu den Fehlern der hintern als der vordern Herzhöhlen gehört.“

durus, vibrans ³⁶⁾ aut debilis et irregularis, respiratio sub minimo motu anhelosa, tussis habitualis cum sputis veluti per vomendi suffocativos conatus rejectis ³⁷⁾, saepe cruentis, ciborum desiderium auctum, ructusque. Aegri saepe de doloribus veluti rheumaticis membrorum conquerruntur ³⁸⁾. *Morbus proventus* exhibet genarum et labiorum livorem, anxietatem, corporis emaciationem, somnum expergefactionibus repentinis perturbatum, cordis pulsationem in ampliori superficie, non solum tactui, visui sed interdum et auditui obviam, carotidum vibrationem, jugularium turgorem ³⁹⁾, narium, pulmonum, ani haemor-

36) Pulsum magnum *non intermittentem* pro indicio dilatationis cordis habebat ALBERTINI (l. c.). Vidit autem manus sinistrae pulsum valde intermittentem TESTA (l. c. p. 374.).

37) Huic symptomati in morbis chronicis cordis detegendis multum tribuo. Tussis haec cum vomitu matutinis potissimum horis comparet, aegros per quartam horae partem et ultra detinet, lachrymasque illis elicit.

38) Cfr. HUFELAND's *Journal*. 32. B. 4. St. p. 95. — VILLESARVOYE in *Fränkisch. Samml.* 2. B. 11. St. p. 310. — TESTA l. c. p. 382. — Pater meus quondam Viennae pro comite K . . . g in consilium vocatus fuit. Magni artuum cruciatus ex nulla evidenti causa orti, illi suspicionem latentis dilatationis cordis excitarunt, quam propius aegri examen et sectio cadaveris confirmarunt.

39) *Pulsationem jugularium* GALENO jam in capitis do-

haemorrhagias ⁴⁰⁾, decubitus supinum denegatum, suffocationis insultus inprimis sub motu et post partum, lipothymias ⁴¹⁾, urinam rubram, paucam, sedimento roseo instructam. Aegri saepe de faucium constrictione conqueruntur. *Morbus ultimum stadium* attingens, praeter augmentum signorum allatorum (excepta pulsatione cordis interdum evanescente) oedema, hydrocardiam et hydrothoracem exhibet.

3. Visae sunt dilatationes cordis, in hominibus *ad aspectu sanis* ⁴²⁾. Porro dilatio cordis ^{Facilis error.}

S 2

confusa

lore observatam (comment. in libr. prorrh. III. p. 200.) ad signa dilatationis cordis revocarunt LANCIUS aliique. Quin immo de *pulsatione venarum* brachii ut signo ejusdem morbi loquuntur HOMBERG (*Mémoires de l'acad. de Paris a. 1704. p. 159.*) et ZULIANI (TESTA l. c. p. 371.). Talem pulsationem venarum non admittit TESTA (l. c. p. 373.) illamque a tremore aut subsultibus musculorum propinquorum (p. 374.) derivat.

40) FORLANI (l. c. p. 77.) nexum haemorrhagiae cum dilatatione cordis pulchre patefecit. Cfr. KRETSIG l. c. 1. Th. p. 380.

41) LOWER et ALBERTINI lipothymias potissimum in dilatatione cordis dextri observarunt. Rite observat TESTA (l. c. p. 374.) quoque in dilatatione cordis sinistri lipothymias obvenire, ac interdum in illa cordis dextri deesse.

42) Exempla dilatationum enormium cordis in hominibus *ad aspectu sanis* et fortuito mortuis, narrantur a VESALIO (de corporis humani fabrica Lib. I. Cap. 5.) a HARVERO (exercit. de circulo sanguinis ad RIOLAN.)

confusa fuit, cum *symphysis cardiaca* ⁴³⁾, cum *angore pectoris* ⁴⁴⁾, cum *aneurysmate aortae* et cum *morbis vitia organica cordis et arteriarum simulantibus* ⁴⁵⁾. Ad quos errores evitandos refert maxime *caussarum morbi* rationem habere. Constat etenim *dilatationes cordis* potissimum obvenire in hominibus ex familiis morbis cordis obnoxiiis descendentibus, athleticis, annosis, arthriticis, post violentias pectori illatas nisusque magnos, post graves curas et fortia animi pathemata.

§. LI.

a LANCISIO (de aneurysm. prop. 53. p. 82.) a FANTONIO (resp. et cur. p. 59.) a DETHARDINGO (Eph. Nat. Cur. Dec. III. A. 5. 6. Obs. 71. p. 149.) a TESTA (l. c. p. 28 et 368.).

43) Dilatationis cordis omnia signa aderant in aegrotto LOWERI (De corde Cap. 2. p. 106.) attamen nonnisi symphysis cardiaca detecta est. Hanc saepe cum dilatatione cordis simul excitare monui. Cap. VIII. §. XXIX. N. 1. (39).

44) Fatetur TESTA (l. c. p. 371.): „Die Leiche eines unsrer Kranken, der in diesen Tagen starb, nachdem er an allen Zufällen der Brustbräune gelitten und bei dem ich gewiß Verknöcherungen im Herzen vermuthete, zeigte statt jener Verknöcherungen eine ungeheure Ausdehnung des rechten Herzhohrs.“ Puto confusionem istiusmodi morborum incipientium, haud facile locum habere posse, propterea quod insultus periodici angoris pectoris in dilatatione cordis desiderantur.

45) Cap. XVII. §. LXXI.

§. LI.

Monita circa prognosin et curam dilatationis cordis.

1. Dilatatio cordis longaevitati non semper ^{Prognosis.} obstat ⁴⁶⁾. Multi hydrope pereunt. Mors impro-
visa debetur aut cordis paralysi ⁴⁷⁾, aut illius
rupturae ^{*)}. Maxime vero timenda est pericar-
ditis accessoria ⁴⁸⁾, quae nisi cognita riteque
curata, aegrum, morborum acutorum more, e
medio tollit ⁴⁹⁾.

2. Quod periculum ope regiminis diaetetici ^{Cura.}
congrui ⁵⁰⁾, setacei ⁵¹⁾, fonticuli ⁵²⁾ anteverendi,
prima

46) SENAC l. c. *Livr. IV. Chap. 8. p. 11.* inquit: „on
peut vivre longtems, quoique le volume du coeur soit
fort grossie. St. Philippe de Neri n'est mort qu'à 80.
ans. Cfr. ALBERTINI et TESTA (l. c. p. 383.). A.
1806. judaeum octodecim annorum curavi qui omnia
signa dilatationis cordis summae exhibuit. Dereliquit
Vilnam a. 1807. de illius propinqua morte non dubi-
taveram. Rediit vero cum iisdem symptomatibus,
magis tamen macilentus a. 1815. iterum abiturus.

47) KREYSIG l. c. 2. *Th. p. 288.*

*) Cap. XIII. §. LIV.

48) Cap. IX. §. XXXIII. N. 3.

49) FERRIAR l. c. KREYSIG l. c. 1. *Th. p. 191.*

50) Cap. XI. §. XLV. N. 2.

51) Prosequitur BURNS (l. c. p. 66.): „Ich kenne kein
Mittel, dafs diesen Zweck (die Abwendung der Herz-
entzündung) besser erreichte, als ein auf die Stelle, wo
das Herz liegt, gelegtes Haarseil.“

52) Mulcrum lucri inde obtinui.

prima est indicatio ⁵³⁾. Apparentibus signis congestionis ad cor, illico ad parvam *venae sectionem* ⁵⁴⁾, aegro supine decumbente ⁵⁵⁾, ad *hirudines* circa partem affectam aut ad anum, nec non ad *eccoprotica* aliaque *derivantia* recurrendum. *Cucurbitulas scarificantes* ob impetuosam nimis revulsionem, quam operantur, nunquam adhibere ausi sumus. *Hydropis* periculum, *diureticis* ⁵⁶⁾, inprimis, *foliis digitalis purpureae* praepeditur, quod pharmacum etiam tumultum cordis et systematis arteriosi temperare valet. Eundem effectum *nitras potassae*, et, nisi tussis obstet, haustus *aquae frigidae*, quin immo ipsa *glacies condita* et *embrocatio* super pectus, praestant. Interdum symptomata per exhibitionem prudentem *sacchari saturni* leniuntur. *Narcoticorum* usum *lipothymiae* contraindican^t ⁵⁷⁾.

Alias

53) Pulchre ait BURNS (l. c. p. 65.): „*Wegen der grofsen Neigung der Herzerweiterung zum Uebergang in chronische Entzündung muß der Arzt alles Mögliche thun, um den Eintritt dieses neuen Uebels zu verhüten, das mit seltenen Ausnahmen den Kranken in sehr wenigen Tagen den Tod bringt.*“

54) SENAC (l. c.) ait: „*L'expérience confirme l'utilité que la raison nous découvre dans la saignée; les palpitations s'affoiblissent quand la masse du sang est diminuée, les malades respirent plus aisément.*“ CORVISART l. c. p. 155.

55) CLUTTERBUCK in the medico-chirurgical Journal. Vol. III. 1817. p. 482.

56) P. II. Vol. II. Sect. I. Cap. XI. §. LVII. 4.

Alias et illa et *amara* et *stomachica*, periclitante in ultimo morbi statio vita, usurpari possunt ⁵⁸).

§. LII.

De capacitate cavitatum cordis imminuta, speciatim de angustatione ostiorum.

1. Praeter capacitatem cavitatum cordis imminutam, ob polypum ⁵⁹), ob incrassationem parietum ⁶⁰), ob tumores in mediastino, circa pericardium, super aortam et arteriam pulmonalem ⁶¹); peculiari nostra attentione dignae sunt angustationes ostiorum communicationem inter cor et venas atque arterias efficientium. Hujusmodi angustationes originem trahunt ex vitiis aut membranae internae cordis, aut limborum orificia venosa circumdantium aut valvularum.

2. Membrana cordis superficiem internam investiens angustationi orificiorum ansam porrigit ^{Angust. ex vicio membranae internae cordis.}

57) SENAC l. c.

58) Cap. XI. §. XLV. N. 7.

59) Cap. X. §. XXXVII. 2.

60) Cap. XII. §. XLVI.

61) „Un homme, dit GARNERUS, étoit tourmenté par des palpitations, qui devinrent encore plus violents à mesure qu'il avançoit en âge; le principe de ce battement étoit une excroissance qui pesoit une once; elle étoit placée entre l'aorte et l'artère pulmonaire.“ SENAC op. c. Livr. 4. Chap. 8. p. 406. — Cfr. STENZELL diss. de steatomatibus in principio aortae subortis. Vitemb. 1723.

git si illa incrassatur. Incrassatur autem dum praevia inflammatione vel lymp̄ha coagulabilis⁶²⁾, vel concrementa lapidea⁶³⁾, in textum illius celulosum deponuntur.

Ang. ex
vicio lim-
borum.

3. *Limbi ostia venosa circumdantes* illa ostia angustant ac fere occludunt⁶⁴⁾, dum indurantur et tument, indeque fibras tendineas musculorum papillarum breviores reddunt.

Angusta-
tio ex vi-
tiis valvu-
larum.

4. *Valvulae*, ostia cordis occludere possunt, dum aut lithiasi⁶⁵⁾ aut nodulis et excrescentiis⁶⁶⁾ notantur. Excrescentiae hujusmodi interdum magnitudinem nucis avellanae attingunt⁶⁷⁾. Forma illarum lucera, oblonga, corrugata⁶⁸⁾

est;

62) KREYSIG l. c. 2. Th. p. 306.

63) SCHENK in HORN's *Archiv f. med. Erfahrung.* 1820. Novembr. Decembr. p. 582. (ostium venosum ventriculi sinistri angustatum).

64) CORVISART l. c. p. 195.: „J'ai observé plusieurs fois ce rétrécissement parvenu à un point tel, qu'on pouvoit s'étonner que le filet de sang auquel donnoit passage l'espèce de fente qui tenoit lieu d'orifice, fut suffisante à une circulation capable d'entretenir une vie languissante.“

65) Cap. XI. §. XLII. N. 2.

66) MORGAGNI Epist. XI. 11. Ep. LXIV. 8. Ep. XXIX. Ep. XL. 23. Ep. LXIV. 2. — LANCISIUS von d. verschiedenen plötzlichen Todesarten. 2. B. p. 121. — SANDIFORT Obs. anat. pathol. L. I. C. I. p. 31. Tab. III. fig. 4. L. III. C. I. p. 41. — CORVISART l. c. p. 217.

67) FORLANI l. c. p. 70. SOEMMERRING apud BAILLIE p. 21.

68) KREYSIG l. c. 2. Th. p. 360.

est; origo interdum syphilitica ⁶⁹⁾. Concretio valvularum inter se ⁷⁰⁾ effectum praeviae inflammationis sistit.

5. *Symptomata* angustationem ostiorum cor- Sympto-
dis *in genere* indicantia sunt: accessus periodici, ^{mata ge-}
reptini, suffocationis, stipati pulsatione cordis ^{neralia.}
magna, cum ictibus arteriarum saepe parvis,
intermittentibus, minime cohaerente. Praeterea
manus medici regioni cordis applicita sensum
sibili ⁷¹⁾ percipere solet. Nec dolores pectoris,
tussis, haemorrhagiae et lipothymiae decesse so-
lent. Quae symptomata, intervalla eo liberiora
concedunt, quominus constans est vis impedi-
menti ⁷²⁾. Cujus sedes specialis, per signa alibi ad-
umbrata ⁷³⁾, divinare studeat indefessus scrutator.

6. Sym-

69) „Est-il plus difficile de croire qu'il peut se former des végétations vénériennes sur les valvules du coeur, que sur la peau aussi fine du gland, de l'intérieur du prépuce etc. — dont les apparences et le tissu connu ont d'ailleurs beaucoup d'analogie?“

70) KREYSIG l. c. 2. Th. p. 360.

71) GALL. bruissement. GERM. Schwirrende Bewegung.

72) „... p. e. les végétations, les excroissances que l'on observe sur les valvules ventriculaires et sygmoïdes, dont la présence ne se manifeste que par intervalles, lorsque ces corps, presque toujours flottans dans la cavité du ventricule ou du vaisseau, se présentent tantôt plus, tantôt moins, et plus ou moins inégalement à l'orifice au bord duquel leur base est fixée.“ CORVISART l. c. p. 228.

73) C. XI. §. XLII. 2. Adde opinionem HODGSON (l. c.

Diagnosis. 6. Symptomata *angustationis ostiorum cordis* magnam similitudinem cum illis *angoris pectoris* alunt. Cordis pulsatio maxima et perceptio sibili ab applicata ad thoracem sinistram manu, illam angustationem ab isto morbo quodammodo distinguere valent.

Prognosis. 7. Aegri angustatione ostiorum laborantes, quamvis continuo in periculo mortis versentur, attamen vitam miseram diu protrahere possunt, quod imprimis de senibus, quiete viventibus phlegmaticisque valet.

Cura. 8. Ad mortis periculum, quousque licet, praepediendum, regulas jam traditas ⁷⁴⁾ sequi debemus.

CAPUT

p. 55.) angustationem ostii venosi ventriculi sinistri concomitari pulsum cordis dicrotum.

74) Cap. XI. §. XLV. imprimis N. 3. et N. 10.

CAPUT XIII.

De dislocatione, prolapsu et ruptura cordis.

§. LIII.

De dislocatione et prolapsu cordis.

1. **D**e situ praeternaturali cordis *conge-*Distinctio.
nito jam monuimus ¹⁾; hinc de eodem vitio, *mor-*
borum acquisite effectum, quaestio erit ²⁾).

2. Visum enim est *cor propulsum in thora-* Exempla.
cis latus dextrum a ventriculo, ob vulnus dia-
 phragmatis, in pectus migrante ³⁾, a vomica
 pulmonum ⁴⁾, ab empyemate ⁵⁾, ab hydrope sac-
 cato ⁵⁾,

1) Cap. V. §. XV. N. 2. (10 — 16).

*) Doleo me accipere haud potuisse binas de hoc argu-
 mento, dissertationes, videlicet illam Jos. I. H. ZED-
 LERI de situ cordis abnormi c. historia morbi hac
 spectante. Vratisl. 1817. et alteram K. WEESE de cor-
 dis ectopia. Berol. 1818. c. tab. aen.

2) SENNERT Practica Lib. II. C. 15. Lugd. Batav. 1650.
 p. 703.

3) SENAC Op. c. *Livr. IV. Chap. 9. §. 7. p. 439.* —
 SCHMIDT in HUFELAND's *Journal*. 25. B. 2. St. p. 189.

4) SOEEMMERRING de morbis vasorum lymphaticorum
 p. 139.

cato ⁵⁾, ab aneurysmate aortae ⁶⁾, a sacco cruore repleto ⁷⁾ et frequentissime a steatomatibus ⁸⁾. Haud raro steatomata in mediastino anteriore locata pulmones et *cor retrorsum* premunt ⁹⁾. Alias pulmones cum pericardio concreti, tumorem efficiebant, in *abdomen propulsum* ¹⁰⁾. Maxime vero memorabilis est *prolapsus* ¹¹⁾ seu *hernia cordis*, verbo hujus visceris descensus, quod fit, ut cor non solum diaphragmati (a quo interdum

5) LARREY *medizinische chirurgische Denkwürdigkeiten*. Leipz. 1812. p. 825. — Cfr. AMELUNG in HUFELAND'S *Journ.* 1816. Nov. p. 15.

6) WERDERMANN in MURSIGNA *Neues Journal f. die Chirurgie*. 1. B. 2. St. p. 188.

7) PLENCIZ *acta et observ. medica*. Prag. 1783. p. 162.

8) BOERHAAVE v. rariorum morborum historiae BALDINGER. Francf. 1771. — JAMINSON in *Edinburger Versuchen und Bemerkungen*. 3. B. p. 488. — CORDEN in *Memoirs of the medical Society of London*. Vol. 6. p. 122. — HORN *Neues Archiv f. med. Erfahr.* 3. B. 1. Hft. N. 30. — KREYSIG l. c. 2. Th. p. 866. — MAIR in HUFELAND'S *Journal*. 19. B. 1. St. p. 111. — MECKEL de condit. cordis abnorm. p. 6.

9) BONET *sepulchr.* Lib. II. Sect. 2. Obs. 4. — CORDEN *Memoirs of the medical Society of London*. Vol. 6. p. 172. et *Samml. auserl. Abhandl. f. pr. Aerzte*. 23. B. 3. St. p. 323. — KREYSIG l. c. 2. Th. p. 855.

10) SANDIFORT *Obs. anat. pathol.* p. 6. — HAEN *ratio med.* Vol. I. p. 109.

11) LANCISI de aneurysmatibus. Lib. II. propos. 52. p. 81. et de mortibus subitaneis p. 136.

terdum involvitur¹³⁾) incumbat, sed illud quoque deprimat¹⁴⁾, regionem epigastricam occupet. Huic vitio ansam porrigunt aneurysma aortae¹⁵⁾, cordis praemagni pondus¹⁶⁾, relaxatio vasorum majorum¹⁷⁾, hepar volumine auctum sociâ hernia scrotali dextra¹⁸⁾ et paresis diaphragmatis, effectus, aut praeviae apoplexiae, aut tumorum nervum phrenicum comprimantium¹⁹⁾.

3. Aegrorum *dislocatione cordis* laboran-^{Sympto-}
tium unus, laborabat anxietate, inspiratione^{mata.}
difficili *), periculo suffocationis, tum sub
motu, tum sub decubitu supino, tussi brevi,
frecuen-

13) ZULIANI de quibusdam cordis affectibus. Obs. 2. 3.

4. Cfr. LEIDENFORST Opuscul. Vol. I. p. 3. SENAC.
T. I. p. 178.

14) MORGAGNI Epist. XV. 55. Ep. XVII. 28. — RUXSCH
Advers. anat. Dec. I. — RAMEL in *Journal de médec.*
T. XLIX. p. 423.

15) MORGAGNI Epist. XVII. 25.

16) LANCISI l. l.

17) LANCISIUS de aneurysmate L. II. prop. 52. p. 81.

18) Aliquoties de morbo cordis suspicabar, cum tamen
in cadavere nil nisi hepar magnum et hernia scrotalis
detecta fuerit. Hepar eo magis diaphragma et cum eo
pericardium deorsum trahere debet, quo magis fulcro
intestinorum caret.

19) TESTA l. c. p. 191. (Suspiciatur hoc in casu simul
adesse perceptionem *lapsus costarum*, de qua MOR-
GAGNI (Ep. XXVI. 21. Ep. XLV. 25.) narrat.

*) Exspiratio facilis erat.

frequenti, clangosa, loquela impedita, doloribus pectoris, abdominis, dorsi, pulsu irregulari, rara levique pulsatione cordis, sensuque fluctuationis corpus antè flectendo ²⁰⁾, — alter experiebatur dolores in regione cordis, inter scapulas, difficultatem deglutiendi atque vomitum ²¹⁾; — alter quidem non experiebatur dyspnoeam, sed sensum ebullitionis in ventriculo ²²⁾; — alter fame laborabat, verum cibi vix assumpti graves molestias excitabant ²³⁾; — alter conquerebatur de dyspnoea sub ascensu scalarum, deque pulsatione in regione ventriculi, aderantque praeterea corporis emaciatio, tussis atque pulsatio, inter sextam et septimam costam *lateris dextri*, tactui non minus quam visui obvia ²⁴⁾; — alter, omnium celeberrimus ²⁵⁾, patiebatur dolorem fixum sub mamma sinistra, cruciatus vagos pectoris et scapularum, atque tussin, decubitus undique impeditus erat concessa dumtaxat corporis antè flexione, cubitis genubus infixis. Pulsus a norma non deflectebant. In *prolapsu* seu *hernia cordis*, praeter plurima ex allatis symptomatibus, observatur absentia pulsationis

in.

20) SANDIFORT l. c.

21) SAMINSON l. c.

22) ZULIANI l. c.

23) TESTA l. c. p. 187.

24) MAI l. c.

25) Marchio de St. AUBAN. v. BOERHAAVE et KREXSIO l. c.

in latere sinistro thoracis illiusque praesentia in regione epigastrica.

4. De dislocatione cordis, in sectionibus *Diagnosis*. pathologicis non praepostere judicandum est; positio enim hujus visceris plurimis mutationibus per ipsam cadaveris positionem subjicitur ²⁶). Nec sano in homine cor eundem semper occupat locum, attollitur enim sub inspiratione et descendit sub expiratione ²⁷). Vigente morbo, symptomata dislocationis cordis, a symptomatibus morborum, qui dislocationem producant, distinguenda forent. Cave praesertim ne pulsatio in thorace dextro aut in regione epigastrica obvia, utpote aneurysmati aortae familiaris ²⁸), te in errorem ducat.

5. Nisi morbus, qui dislocationi cordis ansam *Prognosis*. porrexit, curam admittat, ars nihil valet. Attulerunt aliquot levamen parvae *veinae sectiones* (dum aegroti debilitas non obstabat), *fonticuli* et *setacei* circa cordis regionem, *fomentationes* super pectus et *clysteres* ²⁹)!

§. LIV.

26) LEIDENFROST l. c. PASTA de cordis pelypo. §. XXII. p. 72. — TESTA l. c. p. 177. — KREYSIG l. c. 2. Th. p. 72.

27) ALEXANDER BENEDETTI anat. Lib. III. C. 12.

28) Cap. XVI. §. LXII. N. 3. (84).

29) BOERHAAVE l. c. (Comes St. AUDAN sic levamen accipiebat).

§. LIV.

De ruptura cordis.

Exempla. 1. *Exempla rupturae cordis*, quorum unum cum vidimus ³¹⁾, describuntur a HARVEY ³²⁾, SALZMANN ³³⁾, MORAND ³⁴⁾, MORGAGNI ³⁵⁾, MUMSEN ³⁶⁾, LUDWIG ³⁷⁾, FINE ³⁸⁾, MURRAY ³⁹⁾, JOHNSTON ⁴⁰⁾, HAZON ⁴¹⁾, LANGLADE ⁴²⁾, FLEURY ⁴³⁾, RENAULDIN ⁴⁴⁾, OLAI ⁴⁵⁾, PENADA ⁴⁶⁾, ERDMANN ⁴⁷⁾,

31) Vide infra. §. LIV. (82).

32) Exercit. III. de circulo sanguinis. Sect. I. p. 63.

33) Diss. de subitanea morte a sanguine in pericardium effuso. Argent. 1731.

34) *Mémoire de l'acad. des sciences* 1732.

35) De sed. et caus. morb. Ep. XXVII. 1. 2. 5. 8. Ep. LXIV. 15.

36) Diss. de corde rupto. Lips. 1764.

37) Prim. lin. anatom. pathol. Lips. 1785.

38) *Recueil des actes de la société de santé à Lyon. T. II* p. 200. v. Samml. auserl. Abhandl. f. pr. Aezzte. 21. B. 4. St.

39) Diss. de ruptura cordis. Upsal. 1785.

40) *Med. Bemerkungen und Untersuchungen. 2. B.* p. 103.

41) *Journal de méd. T. IX* p. 316.

42) *Journal de med. T. LXXXVIII.* p. 199.

43) *Bulletin de la soc. de méd. p. 131.* Append. ad *Journal de med. continué. Vol. X.*

44) CORVISART *Journal de méd. continué. Vol. XI.* p. 264. v. HARTLES N. *Journal der ausland. med. Literatur. 7. B. 1. St.* p. 196.

45) *Memoria di una morte repentina cagionata della rottura del cuore. Firenze* 1803.

46) *Saggi di Padova. T. 3.*

MANN ⁴⁷⁾, FELDHAN ⁴⁸⁾, FIORATI ⁴⁹⁾, PORTAL ⁵⁰⁾, NICHOLS ⁵¹⁾, CULLERIER ⁵²⁾, HOREAU ⁵³⁾, ZIMMERMANN ⁵⁴⁾, ANGUISCOLA ⁵⁵⁾, CORVISART ⁵⁶⁾, ROSTAN ⁵⁷⁾, BRERA ⁵⁸⁾, POHL ⁵⁹⁾, METZGER ⁶⁰⁾, SCHAEFFER ⁶¹⁾, TESTA ⁶²⁾, KREYSIG ⁶³⁾, ASHBURNER ^{*}), aliisque ⁶⁴⁾.

2. Caus-

- 47) HORN's *Archiv*. 3. B. 1. St. p. 91.
 48) SCHMUCKER's *vermischte Schriften*. 3. B. p. 279.
 49) *Saggi scientifici di Padova*. T. 3.
 50) *Mémoires de l'acad. des sciences de Paris 1784*. v. Samml. auserl. Abhandl. f. pr. Aerzte. 12. B. p. 705. Et *Mémoires sur la nature et le traitement de plusieurs maladies du coeur*. T. 2. N. 1.
 51) *Philosoph. Trunsact. Vol. LII. P. I.* p. 265. v. LESKE uuserl. Abhandl. 5. B. p. 173.
 52) *Journal de med. continué. Vol. XII.* p. 168.
 53) *Archiv der pr. Heilk. f. Schlesien*. 3. B. 4. St. N. 3.
 54) *Von der Erfahrung*. 2. B. p. 449.
 55) *Giornule della società medica di Parma*. T. 3.
 56) l. c. p. 258.
 57) *Journal général de méd. Françoise et étrangère 1820*. Juillet p. 99.
 58) *Di una straordinaria rottura di cuore. Verona 1808*.
 59) *De ruptura cordis*. Lips. 1808.
 60) *System der gerichtlichen Arzneywissenschaft*. p. 136.
 61) HUFELAND's *Journal d. pr. Heilk.* 1811. Aug. p. 11.
 62) *Op. c.* p. 391.
 63) *Op. c.* 2. Th. p. 443.
 *) *London med. and physical Journal*. 1822. Decembr.
 64) *Act. Nat. Cur.* Vol. VI. Obs. 39. — *Eph. Nat. Cur.* Dec. III. A. 3. Obs. 82. A. 9 et 10. Obs. 164. *Sammlung*. 1725. Mai p. 569. — *Fränkische Samml.* 2. B. Frank Prax. II. 2. 2.

CAUSSAE.

2. *Caussis* rupturae cordis adscribendae sunt: vitium congenitum ⁶⁵), violentiae externae ⁶⁶), nisus ⁶⁷), imprimis sub coitu ⁶⁸), rixae ⁶⁹), animi pathemata gravia ⁷⁰), compressio arteriae pulmonalis

p. 310. *Histoire de l'académie de Paris.* 1770. p. 51. —
Neue Edinb. Versuche. 3. B. p. 257.

65) In puerorum cadaveribus, nec non in catulis ac vervecibus, aliquando spectavit corda LANCISIUS in altera auricularum, vel (ut frequentius) sinistro in ventriculo, locum quemdam, ac veluti *foramen pellucidum* habentia, quod externa internaue tantum membranae ne omnino dehisceret, impendebat. Neque dubitandum quin, si eadem corpora adolevisent, inter illa facile adnumeranda essent, quae repentino interitu, ob apertum ex tempore cordis foramen concidunt, cujus profecto mortis genus et alii saepe et nos crebro vidimus (De morb. cord. et aneurysmatibus. L. I. C. 23. p. 38. Lugd. Bat. 1740.).

66) Eph. Nat. Cur. Dec. A. 9 et 10. Obs. 164. (ictus thoracis), MUMSEN (ictus ab equo calcitrante), LUDWIG l. c. (percussio), FINE l. c. (concussio), HUFELAND's *Journal d. pr. Heilk.* 14. B. 2. St. p. 200. (concussio per glandem plumbeam sine vulnere extrinseco), METZGER l. c. (equi calcitrantis ictus), CHAUSSIER in *Samml. auserl. Abhandl. f. pr. Aerzte.* 12. B. p. 720. (rota currus super pectus decurrens).

67) ODIER in nota versionis op. Cox (sub itinere maritimo vehementem vomitum excitante. Cfr. infra mea observatio).

68) MORGAGNI Ep. XXVI. 13.

69) PORTAL *mém. de l'acad. de Paris.* A. 1784. p. 51.

70) MURRAY l. c. p. 26.

monalis ab aneurysmate aortae ⁷¹⁾, hujus angustia ⁷²⁾, insultus epilepticus ⁷³⁾, cordis friabilitas ⁷⁴⁾, suppuratio, exulceratio *) et lithiasis ⁷⁵⁾. Haec caussae magis in cordis ventriculos quam in auriculas imperium exercent, vix tamen in unum illorum prae alio ⁷⁶⁾. Violentiae externae vehementissimae rupturam cordis per se excitare valent; alias quaedam requiritur *praedispositio*. Quaerimus illam tum in praegressa inflammatione cordis suppurationes erosionesque excitante ⁷⁷⁾, tum in deletio imperio nervorum ⁷⁸⁾, ex quo

T 2

sub-

71) NICHOLLS l. c. (casus Regis GEORGII II.).

72) *Breslauer Samml.*

73) JOHNSTON l. c.

74) Cap. XII. §. XLVII. N. 4. (62). ERDMANN l. c.

*) LANGLADE l. c. MORGAGNI Ep. XXVII. 5. 8. —
LEMERY *Mém. de l'acad. de Paris. A.* 1732. p. 429.
(Casus uxoris ducis Brunswigensis), PENADA l. c.

75) MORGAGNI Ep. XXVII. 2. TESTA l. c. p. 395.

76) CORVISART et PORTAL in ea versantur opinione, ventriculum cordis sinistrum saepius quam dextrum rupturae obnoxium esse: ast vix reperio differentiam, nam inter septemdecim observationes quas sub oculis habeo, octo in ventriculo dextro et novem in sinistro locum obtinuerant.

77) TESTA l. c. p. 392.: „So glaube ich in den meisten Krankheitgeschichten derer, welche an der Zerreißung des Herzens gestorben, eine schleichende Entzündung des letztern zu erkennen, die endlich in Verschwärung überging.“

78) Forte huc spectat *ruptura cordis in peste* de qua loquitur QUEZENAX (*des fièvres* T. 2. p. 448.).

substantia cordis friabilis **) evadit, vel alia pacto degenerat ⁷⁹⁾).

Diagnosis. 3. Cum rupturam cordis, signa saltem generalia, morbum hujus visceris indicantia ⁸⁰⁾, praecedere soleant, diagnosin originis mortis hujus repentinae (interdum sub somno ingruentis ⁸¹⁾) haud semper ardua est ⁸²⁾. Apoplexia aut ruptura

**) ASHBURNER l. c.

79) Corda rupta saepe multa pinguedine circumdantur.

TESTA l. c. — KREYSIG l. c. p. 446.

80) Ardor et dolores lancinantes ventriculi pectoris inter scapulas, delirium, pulsus debilis, extremitatum frigus ANGUISCOLA l. c. Palpitatio cordis (BRERA l. c.). Cfr. infra.

81) ANGUISCOLA l. c.

82) Ardua tamen fuisset diagnosi sequenti in casu. C. Univers. Vilnensis chirurgiae Professor NISZKOWSKI, vir quadragesimum circiter annum agens, habitu corporis spongioso praeditus, jam a. 1814. conqueri coepit, de anxietate, nausea, et vomitu matutinis horis urgentibus, inprimis dum animus ejus a gravioribus curis et a protractis vigiliis, quas operationes chirurgicae et exercitium artis obstetriciae secum trahere solent, agitabatur. Pulsus illi erat normalis praeter quamdam frequentiam. Nec de cordis palpitatione, nec de alio signo, morbum hujus visceris indicante, querelas agebat. Die ultima Augusti a. 1816. cum eo prope littora fluminis Vilia adhuc deambulaveram. Die tertia Septembris, hora sexta matutina ad illum derepente advocor, nuntium simul accipiens, quod morti proximus sit! Revera aegrotum inveni cum facie a statu sano valdopere recedente, anxietate summa, dolore forti sub sterno, jactatione

ptura aneurysmatis tamen in errorem ducere possent.

4. Ru-

continua, pulsu frequente irregulari et exiguo. Adstiterat jam amicus noster communis, Professor MIA-
ROWSKI. Aegrotus, mentis omnino compos, narra-
bat, se post somnum sat irrequietum vomitum habi-
tualem inconsueta tamen vi, perpeßum esse, atque
absolutis vomendi conatibus tam debilem redditum
fuisse. Debilitate ista non obstante, venam brachii
sinistri secavimus, eductis circiter novem cruoris
unciis. Sequebatur aliquod levamen. Nihilominus
palam erat aegrum adhuc in vitae periculo versari.
Qua de caussa illum non dereliquimus. Hora sexta
vespertina angustiae plus quam unquam augebantur, ac
aeger e lecto prosiliens ac sedile sibi eligens, exclama-
bat, „Ah! nunc me pessime habeo, laboro maximo
morbo eoque diuturno.“ Quae verba vix cum protu-
lisset, in lipothymiam, subsequentibus motibus non-
nullis convulsivis capitis, incidit, ac inter brachia
mea animam exhalavit. Secto a Professore anatomi-
ae cadavere (cui labori adstare non potuissem) re-
periebatur pericardium cruore repletum et ventriculus
cordis sinister cum fissura perpendiculari longitudinis
pollicis. Cor caeterum normale erat, adeo tamen fri-
abile, ut sub delicata licet exploratione attactus digiti
novum foramen excitaret. Nervi vagi eo loco, quo in
pectoris cavum intrant, utrinque a tumoribus steato-
matis obsessi fuerunt. Similis tumor magnitudinis
ovi gallinaei colli latus dextrum occupabat, atque
strumam simulabat. Tumores nervos vagos comprimes-
centes videntur simul et emesin excitasse et cor ita
friabile reddidisse ut hoc viscus nisi sub vomitu re-
sistere haud potuerit. Grumus sanguinis forte sub

Animad-
versiones.

4. Ruptura cordis forte frequentius contin-
geret, nisi concretio illius cum pericardio, in
locis maxime exesis, id impediret⁸³⁾. Visae
praeterea sunt rupturae valvularum⁸⁴⁾, columna-
rum carnearum ventriculorum⁸⁵⁾, septi ventri-
culorum cordis⁸⁶⁾ et claustrum foraminis ovalis⁸⁷⁾.
Potest hinc ruptura cordis locum invenire quin
sanguis

primo morbi insultu effluxui cruoris obstitit, unde
aeger adhuc per duodecim horas vitam protrahere po-
tuerat. Forte contigit quid simile CORVISARTIO (l. c.
p. 261.) ubi ait: „*Plusieurs observations attestent qu'elle (la mort) n'arrive quelques fois que le deuxième ou troisième jour, sans doute parce que le sang, dans ce cas, ne s'épanche que par une déchirure fort étroite ou oblique et par conséquent lentement et en petite quantité.*“

83) Inter observationes egregii ROSTAN (l. c.) exstat casus cordis, non eo in loco rupti ubi substantia sua a concretione fibrosa cum pericardio cohaerente resarcita erat, sed in longe alio adpectuque sano.

84) SCHULZE de elasticitatis effectum in corpus humanum; in HALLERI diss. anat. T. 3. p. 661.

85) MARAT in *Journal de méd. continué*. T. VI. p. 587. (ruptu columna carnea in ventriculo sinistro ex nisu), CORVISART l. c. p. 263. Obs. 40. („*on s'apercevait dans le ventricule gauche, qu'un des gros piliers, qui soutiennent les valvules mitrales, étoit rompu à la base.*“).

86) *Breslauer Sammlung* l. c.

87) CORVISART l. c. (Post ictus super pectus), TACCONI (Comment. Inst. Bonon. T. 6. p. 64.), ABERNETHY *Philosoph. Transact.* Y. 1798. p. 1.

sanguis in pericardium extravasatus reperitur⁸⁸⁾.

CAPUT XIV.

De inflammatione arteriarum, praecipue aortae.

§. LV.

Historia doctrinae. Symptomata.

1. **D**e inflammatione arteriarum jam lo-^{Historia doctrinae.}cuti sunt ARETAEUS¹⁾, MORGAGNI²⁾, STOLL³⁾, FASELIUS⁴⁾, LANGSWERTH⁵⁾, BIRCH⁶⁾, WIL-
LICH⁷⁾,

88) Sanguinem in pericardium effusum interdum, ex erosione aut aortae aut venae pulmonalis pullulare, jam SENAC docuit *T. 2. Livr. 4. Chap. 6.* p. 351. Porro in observationibus tum medicorum Berolinensium tum FABRICII HILDANI legitur de pericardio materia saniosa sanguinolenta repletò quin vel in corde vel in vasis contiguus continui solutio detegeretur.

1) De curat. acut. L. II. p. 7. p. 108. (Sub nomine παχείη ἀρτηρίη). Cfr. GRUNER de morb. antiquit. p. 187. et SPRENGEL *Geschichte der Arzneyk.* 2. Th. p. 78.

2) Epist. XXVI. 35.

3) Rat. med. Vol. II. P. 2.

4) Diss. sistens morbos arteriarum. Jen. 1757.

5) Theor. med. de arter. et ven. in corp. hum. affectio-
nibus. Prag. 1763.

6) *Journal de méd.* T. LXX.

LICH ⁷⁾, A. MONRO ⁸⁾ aliique, quatenus scilicet illa inflammatio in singulis arteriis post laesiones externas et in textu viscerum phlogosi correptorum obvenit. Verum *systematis arteriosi* (et venosi) *universi* inflammationem *solitariam* primum descripsit J. P. FRANK ⁹⁾. (Inventum ejus confirmatum est a SCHMUCK ¹⁰⁾, SASSE ¹¹⁾, REIL ¹²⁾, SPANGENBERG ¹³⁾, MELI ¹⁴⁾, KREYSIG ¹⁵⁾, JONES ¹⁶⁾, HODGSON ¹⁷⁾ nec non a nostra experientia ¹⁸⁾).

2. Sym-

- 7) BALDINGER's *neues Magazin*. 8. B. p. 268.
- 8) *Ueber die Häute der Pulsader und über ihre Krankh.* v. *Edinb. Versuche*. 2. B. Art. 16.
- 9) *Epit. de cur. hom. morbis*. Lib. II. p. 175. Cfr. Lib. V. P. 2. p. 1. sq.
- 10) *Diss. de vasorum sanguiferorum inflammatione*. Heidelberg. 1793.
- 11) *Diss. de vasorum sanguiferorum inflammat.* Hal. 1797.
- 12) *Fieberlehre*. 2. B. p. 293.
- 13) HORN's *Archiv f. med. Erfahr.* 5. B. 1814. 2. H. p. 269.
- 14) *Storia d'una angiotitide universale seguita da alcuni considerazioni generali intorno all' infiammazione dei vasi sanguiferi*. v. *Annali universali di Medicina compilati da OMODEI*. T. 17. 1821.
- 15) *Op. c.* 3. Th. p. 269. et in notis ad versionem germanicam operis HODGSONII.
- 16) *Ueber den Prozeß der Natur Blutungen aus zerschnittenen Arterien zu stillen*. A. d. E. Hannover 1813.
- 17) *Op. c.* p. 1 — 92.
- 18) Inflammationem systematis arteriosi et inprimis aortae vidi 1^o in sacerdote a. 1814. m. augusto; — 2^o in

2. *Symptomata inflammationis singulae arteriae* majoris et superficialis sunt: dolor et durities secundum illius curriculum; pulsatio fortis supra locum affectum, inferius autem pulsus vix ullus; partis affectae sensibilitas imminuta, tumor inprimis venarum, ecchymomata et tandem febris, tussis cum sputis cruentis¹⁹⁾. — *Symptomata inflammationis universi systematis arteriosi et inprimis aortae* sunt: ardor totius corporis²⁰⁾, cutis rubor et pruritus²¹⁾, dolores artuum²²⁾ et capitis; facies accensa, aures coccineae²³⁾, oculi splendentes, torvi²⁴⁾; epistaxis²⁵⁾; os siccum, lingua arida, sitis inextinguibilis, deglutendi difficultas²⁶⁾, aestus sub sterno, vel super illud ad spatium triangulare²⁷⁾; sensus ac
si

viro a. 1817. m. novembri; — 3° in adolescente a. 1818. m. martio; et 4° in juvene nobili a. 1819. m. decembri.

19) THOMSON apud HODGSON l. c. p. 13—29. — KREYSIG ibid. in nota 3. ad p. 29.

20) Putarem febrem *ardentem* veterum, seu *causum*, nil aliud fuisse quam inflammationem systematis arteriosi.

21) MELI l. c.

22) MELI l. c.

23) Mirabili modo in aegro meo 3°.

24) „Oculorum bulbi et palpebrae convulsive movebantur.“ J. P. FRANK l. c.

25) MELI l. c. Apud aegrum meum 4tum in ipsa convalescentia.

26) MELI l. c.

27) In aegro 3°.

si ferrum candens per aortae decursum ad arterias crurales usque protruderetur ²⁸⁾; vertigo, obnubilatio, visus viridis ²⁹⁾, proclivitas ad lipothymias, imprimis sub corporis motu aut erecta positione; vibratio carotidum, oscillatio arteriarum universi corporis ³⁰⁾; pulsus chordae metallicaе instar durus ³¹⁾, frequentissimus ³²⁾, interdum dicrotus ³³⁾, tensio venarum cutis ³⁴⁾; oppressio pectoris, jactatio, anxietas, urina pauca, ignea, veluti cruenta ³⁵⁾, jumentosa, purulenta. Aliquando pulsatio cordis ³⁶⁾, tussis, vomitus ³⁷⁾, diarrhoea ³⁸⁾ et subsultus tendinum ³⁹⁾. Morbus continenter, aut binis stipatus exacerbationibus *), ad septimam diem protrahitur, qua aut in sanitatem, aut in morbum chronicum aut in mortem

28) KREYSIG op. c. 2. T^h. p. 271.

29) Aeger 2tus et 4tus.

30) Aeger 4tus.

31) Ex hoc signo Pater meus potissimum inflammationem arteriarum dignoscere solebat.

32) Numeravi a 120. — usque ad 130. Pater meus numeravit a 185. ad 200.

33) MELI l. c.

34) MELI l. c.

35) MELI l. c.

36) In aegro Patris mei aderat vero simul cor volumine auctum.

37) Aeger 1us.

38) Aeger 4tus.

39) Aeger 4tus.

*) Aeger 4tus.

tem terminatur. Ibi crisis per sudorem fieri solet; hinc vires decrescunt, extremitates frigent, dum partes internae adurantur, pulsus diffluit ⁴⁰⁾ aliaque agoniae ingruunt signa.

§. LVI.

Autopsia cadaverum. Causae.

1. *Cadavera* hominum ita defunctorum, Autopsia
aortae superficiem internam rubore coccineo no- ^{cadave-}
tatam exhibent. Rubor iste ut plurimum ad arte- ^{rum.}
rias carotides, brachiales et crurales, quin immo
ad ipsam venam cavam ⁴¹⁾ extenditur. Praeter
ruborem (infido sane inflammationis signo ⁴²⁾,
nisi alia symptomata illam designantia praegressa
sint) arteriae inflammatione prehensae offerunt:
proprium cavum copiosâ lymphâ coagulabili (mo-
do parietibus adhaerente ⁴³⁾, modo inter ipsas
mem-

40) In aegro 1°. Tarde advocatus pulsum non inveniens
specificè durum morbum non cognovi, nisi per sec-
tionem cadaveris.

41) Aeger ius. „Quibusdam arteriae secundum dorsum
inflammanur, quod pulsatio in alteris praecordiis
manifestat: nam et ipsa vena cava morborum particeps
efficitur.“ ARETAEUS l. c.

42) „Dieses rothe Ansehen der innern Arterienflächen be-
obachtet man oft in der Nähe von Gerinseln, und mag
dann wahrscheinlich die Wirkung der nach dem Tode
erfolgten Ausschwitzung seyn.“ HODGSON l. c. p. 9.
Cfr. LAENNEC l. c. p. 353 — 363.

43) „Puriformis haec materia ad inflammatae arteriae

membranas depositâ 44)) repletum 45); concrementis polyposis 46) et pseudomembranis 47) repletum; angustatum 48) et oblitteratum 49); mem-

branas-

internam superficiem tenaciter hinc inde adhaerere a nobis conspecta est.“ J. P. FRANK l. c. p. 17.

44) HODGSON l. c. p. 37. Jam HALLER dixerat: „mol-
lis succus erat, pultacens, non dissimilis ejus qui in
atheromate invenitur.“ (Opusc. pathol. Obs. 47.
p. 127.).

45) HODGSON l. c. p. 5. 31. „So ist es daher auch nicht
unwahrscheinlich, daß die innere Haut der Arterien, in
Folge der Entzündung, ohne das Daseyn einer Ver-
schwärung dennoch Eiter absondere, wie dies bisweilen
in serösen Membranen sich ereignet, indem die Strö-
mung durch das Gefäß den Zustand verwischt und nicht
bleibend werden läßt.“

46) Ephem. N. Cur. Dec. I. A. 1. Obs. 18. Dec. III. A.
1. Append. p. 85. Act. Nat. Cur. Vol. X. Obs. 95. —
Nov. acta N. Cur. Vol. VII. Obs. 37. — MORGAGNI
Epist. VII. 11. Epist. XXXVIII. 40. — KLAUNIG
Nosoc. Charitatis. Hist. 4 et 22. — PATIN epist. de
aortae polypo. Brix. 1731. — HAEN Rat. med. T.
III. Part. 6. Cap. 4. §. 3. (funis polyposus lineae unius
fere omnes arterias detinens), HALLER Nov. Comm.
Soc. Goett. T. VIII. A. 1777. p. 7. (casus similis),
HODGSON l. c. p. 5. ERMANN in Svenska Lökare-
Sällskapets Handlingar. 1819. (polypus in arteria pul-
monali).

47) SPANGENBERG l. c. (Aortae lumen sic ad calami
scriptorii amplitudinem decreverat).

48) BOERHAAVE Prax. med. T. I. p. 242. Ipse vidi.

49) MICHELOTTI Epist. infra cit. G. BLANE in medico-
chirurgical Transactions. Vol. 5. (Aorta ab origine ar-

branasque tumidas ⁵⁰⁾, molles ⁵¹⁾, decoloratas ⁵²⁾, incrassatas ⁵³⁾, callosas ⁵⁴⁾, inaequales ⁵⁵⁾, cartilagineas ⁵⁶⁾, excrescentiis fungosis, granosis ⁵⁷⁾, tumoribus ⁵⁸⁾, crustis calcareis ⁵⁹⁾

teriae subclaviae sinistrae, usque ad illam canalis arteriosi omnino clausa erat). GOODISSON in *Dublin Hospital reports Vol. II. Journal de méd. chir. et pharm. T. 32. 1815. Avril* p. 377. (obliteratio aortae descendentis cum dilatatione reliquarum arteriarum et cordis). HODGSON l. c. p. 113. (Obliteratio arteriae femoralis, brachialis, radialis, ulnaris, tibialis lateris dextri). ROSTAN in *Nouveau Journal de med. chir. et pharm. 1818. Janv. T. I.* p. 81. (de obliteratione arteriae brachialis narrat isochronismum pulsuum in utroque carpo producente, provocatque ad similem observationem apud MORGAGNI l. c. Epist. XXXIV. 23.).

50) MONRO l. c. HODGSON l. c. p. 36. Tab. I. fig. 2. p. 271.

51) PORTAL *Cours d'anatomie médicale. T. 3.* p. 127. — J. P. FRANK l. c. p. 16.

52) MORGAGNI Ep. XVIII. 2. Ep. XXIII. 4. Ep. XXV. 10. Ep. XXVI. 36. Ep. XLIII. 22. Ep. XLIV. 3. Ep. LXIV. 12. 19. Ep. LXVII. 54.

53) J. P. FRANK l. c. p. 18. — HODGSON l. c. p. 11.

54) BANG Act. Soc. Havn. Vol. I. p. 17. (caussa palpitationis cordis).

55) MORGAGNI Ep. IV. 21. HODGSON l. c. p. 37.

56) HODGSON l. c. p. 35.

57) Idem ib. p. 7.

58) Medicus Trombelli interdum a dolore ad sternum affectus, et pulsum intermittentem expertus est. Post aliquot annos, hisce symptomatibus auctis a gravi

reis ⁵⁹⁾ (sub forma macularum, squammarum, punctulorum acuminatorum, annulorum, arenae, lapidum ⁶⁰⁾) notatas, exulceratas ⁶⁰⁾, (sanguine
sic

dyspnoea invadebatur, cum pulsu non modo intermittente, sed et inaequali. Post tres dies moritur. Ad ostium aortae tumor detectus est, *inter ipsas arteriae hujus membranas natus ovi columbini magnitudinem referens*, qui tumor omnem arteriae cavitatem opplebat. Ex hoc tumore aliquot parva cochlearia puris effluabant. PIETRO PAULLO DELL' ARME *Saggi di medicina pratica, con note di BORSIERI. Faenza 1768. Osserv. 35.*)

59) Cap. XV. §. LIX. N. 1.

60) TULPIUS *Obs. med. Lib. II. Cap. XXV. p. 134. Tab. VI.* (lapis drachmarum duarum in aorta). BÜTTNER *Anatom. Wahrnehm. 3. B. p. 17.* (concrementa lapidea in arteriis uteri). — KINGLAKE *Lond. med. Journ. 1789. Vol. X. P. 4. p. 344.* (substantia saxeae drachmae dimidia inter membranas arteriae pulmonalis). *Ephem. N. Cur. Dec. III. a. I. p. 103.* (In arteriis coronariis cordis). Alia lapidum arteriarum exempla leguntur apud SCHENK *Obs. med. Lib. II. Obs. 233.* — CHR. LANG *Miscell. Nat. Cur. med. Lips. 1664. p. 14.* — CHOMEL in *Philosoph. Transact. N. 312. in Miscell. Nat. Cur. Dec. III. A. I. Append. p. 103.* *Ephem. N. Cur. Cent. I. Obs. 3. Cent. X. Append. p. 442.* SCHURIG *Lithologia Dresdae 1744. p. 229.* — WALTER *Obs. anat. p. 44.*

60) STÖRK *ann. med. II. p. 262.* — THENEN *Unterricht für Unterwundärzte bei den Armeen. Berl. 1782. p. 230.* — HODGSON *l. c. p. 31. Tab. I. fig. 1.* — FANZAGO *Osservazione di un ulcere nell' aorta v. Nuovi saggi della Cesarea Regia Accademia di scienze lettere*

sic aut in viscera cum arteriis concreta ⁶¹⁾ aut in telam cellulosa contiguam extravasato ac nonnunquam a venis hic iterum absorpto ⁶²⁾), dilatatas ⁶³⁾, friabilis

ed arti di Padova. Vol. I. — Ab ulceribus vero ipsarum arteriarum probe distingui debere *erosiones illarum a pure ex abscessu propinquo*. Sic vidit CRUIKSHANK (*Geschichte der Einsaug-Gefäße. A. d. E. p. 118.*) bubonem venereum inguinalem, qui subjacentem arteriam ad lethalem haemorrhagiam usque erodit. Vidi in Nosocomio Vindobonensi a. 1798. bubonem inguinalem gangraenosum lateris sinistri, qui integumenta abdominis ad palmam latitudinis et ultra depascebat; lethalem erosionem arteriae epigastricae producendo. Alia exempla sic erosarum arteriarum inveniuntur apud SCHENK *Obs. med. Lib. II. Obs. 230. p. 435.* — MOROAGNI *Epist. VII. 9. Epist. XVI. 4. Ep. XXVI. 7. 17. 21. Ep. XXVII. 2. 22. 24. 25. 28. Ep. XL. 24. Ep. XLII. 39.* — In actis medic. Berolin. Dec. I. T. 8. p. 86. — WEITBRECHT in *Commentar. Acad. Petropolit. T. IV. SANDIFORT Obs. anat. path. Lib. I. Cap. 2. p. 53.*

61) VAN DÜVERN (*Observat. anatom. pathol. Lugd. Batav. 1789. Obs. I.*) de oesophago adhaerente, ac disrupta in illum sese deplente narrat. Simile omnino exemplum vidi Viennae a. 1799. in magno nosocomio.

62) Aneurysma per anastomosin J. BELLII (*Principles of Surgery. Vol. 1. p. 450. Vol. 3. p. 255. Angiectasia HODGSONII (l. c. p. 77.). Cfr. FREER Observations on aneurysma p. 28. Plate 3. ELSE Medical Observations and inquiries. Vol. 3. p. 169. — PEARSON Medical communications p. 95. SCARPA über Pulsadergeschwülste p. 294.*

63) Vid. Cap. XVI. §. LXIII. N. 1.

friabiles ⁶⁴⁾, gangraenosas ⁶⁵⁾ et hydatidibus obsessas ⁶⁶⁾.

Causae. 2. *Inflammatio singularum arteriarum* causas plerumque traumaticas agnoscit; inprimis ligaturam arteriarum ⁶⁷⁾, maximeque illarum, quae aneurysmate detentae fuerant ⁶⁸⁾. Inflammatio *universi systematis arteriosi acuta*, maribus communior quam foeminis ⁶⁹⁾, causas cum pericarditiide communes habet. Ad illas potissimum animi pathemata, cursus velox ⁷⁰⁾ et transpiratio suppressa; forte potus aceti ⁷¹⁾ spectant.

Chro-

64) De aorta, ab ictu baculi pectori illato, disrupta, quin vel costae vel vertebrae fractae fuerint, testantur MORGAGNI (Ep. LIII. 35. Cfr. Ep. LIII. 8. 36.) et PYL (*Aufsätze und Beobachtungen aus der gerichtl. Arzneyw.* 4. B. Beobacht. 7. 8.).

65) HODGSON l. c. p. 33.

66) MORGAGNI Ep. VII. 12. Ep. XXI. 19. Ep. XLIII. 17. 18.

67) HODGSON l. c. p. 7.: „Ich sahe die Entzündung der innern Haut nach der Unterbindung der Schenkelarterie bei einer Amputation sich bis zum Herzen ausdehnen.“
OEHME de morbis recens natorum chirurgicis. Lips. 1773. (Arteria hypogastrica inflammata ex ligatura umbilici).

68) CLINE *Transact. of a Society for the improvement of med. Knowledge. Vol. I.* p. 171. ABERNETHY *Surgical observations.* P. 4. p. 230.

69) Sic Patris mei, sic propria exempla docent.

70) J. P. FRANK l. c. (homicida fugam tentans).

71) Aeger ius morbum suum repetebat ex eo, quod sitiens nocturno tempore sub itinere cauponam adiverat,

Chronico modo arteriae inflammantur culpâ arthritidis, syphilidis, mercurii ⁷²⁾, scorbuti ⁷³⁾, verbo morborum specificorum ⁷⁴⁾.

§. LVII.

Diagnosis. Prognosis. Cura.

1. Symptomata inflammationis systematis ar-
 teriarum cum illis febrium inflammatoriarum
 comparando, suspicio ⁷⁵⁾ febres istas ex illa inflammatione
 proficisci, confirmatur. Hanc ipsam quoque inflammationem
 saepe latere suspicamur in nonnullis morbis exanthematicis ⁷⁶⁾, in rheumatismo
 ubi illi per errorem loco aquae *acetum* porrectum
 fuit, quod affatim ingurgitavit. Forte tamen haec
 ipsa sitis jam erat morbi ingruentis symptoma.

72) SCARPA *über Pulsadergeschwülste* p. 62. — CORVISART l. c. — RICHÉRAND *Nosographie philosoph.* T. 4. p. 74. — HODGSON l. c. p. 12. Tab. I. fig. 3. Quodsi mercurius erodere valeat, teste exanthemate mercuriali, tegumenta corporis; teste angina venerea, membranam faucium; cur quaeso, ille non erodere tunicas arteriarum?

73) Cfr. P. III. Volum. II. Cap. de scorbuto.

74) HODGSON l. c. p. 12. — KREYSIG l. c. 2. Th. p. 747.

75) Primum illam patefecit Germaniae conspicuus medicus WEDERIND.

76) e. c. in *scarlatina* et *morbillis*. In *utrisque* ob consensum, quem cutis cum membrana interna arteriarum alit. In *scarlatina*, ob sedimentum puriforme in urina veluti desquamationem internam exhibente obque proclivitatē hujus morbi in hydropem, communissimum comitem morborum systematis arteriosi.

matismo acuto arthriticorum ⁷⁷⁾, in anasarca inflammatorio - rheumatica ⁷⁸⁾ inque haemorrhagiis ⁷⁹⁾. Arduum est illam a pericarditide et a phlebitide (cum quibus aliunde saepe societatem init) distinguere. Attamen, si vigente summa febre inflammatoria cum anxietate et vibratione arteriarum, pulsu frequentissimo, specificè duro, obnubilatione capitis, sensu lipothymiae, deessent dolor sub sterno aut ad latus sinistrum thoracis, aegerque de motu cordis abnormi non conquereretur, potius inflammatio systematis arteriosi, quam pericarditidis arguenda foret.

Prognosis. 2. Inflammatio singulae arteriae inprimis ob

In *morbillis* ob proclivitatem ad haemorrhagias et ad gangraenam.

77) Cor sub hoc malo saepe inflammari, monuimus. Adde angustias in rheumatismo acuto arthriticorum obvenientes, quae ex sola musculorum tendinum et ligamentorum phlogosi explicari nequeunt; adde volubilem illius naturam, ita ut malum spatio temporis brevissimo modo in hanc modo in illam corporis partem irruat; adde haemorrhagias, inprimis epistaxin, quae morbo illo familiaris sunt, adde frequentes ossescantias arteriarum, quae in hominibus arthritidi quondam obnoxiis deteguntur; adde sedimentum maximum et specificum, quod urina exhibet.

78) Sane nulla corporis humani pars facilius extravasatum serosum largiri potest, quam ipsa vasa exhalantia, arteriae scilicet.

79) Cap. XX. §. LXXXVII. N. 3. (30).

ob facilem morbi ad cor propagationem⁸⁰⁾ timenda est. Inflammatio universi systematis arteriosi nisi crisin suam aut in haemorrhagia externa, aut in urina cum sedimento puriformi⁸¹⁾, aut in metastasi⁸²⁾ obtineat; nisque per haemorrhagias internas⁸³⁾, per gangraenam⁸⁴⁾, perque labefactionem systematis nervosi, praecipite morte terminetur: exitus, vel in lithiasin arteriarum, vel in multiplicia mala, evolutioni aneurysmatis ansam porrigentia, inevitabiles habet.

U 2

3. Ad

80) HODGSON l. c.

81) „Pars maxima illius lymphae (a membrana interna arteriae exsudatae) a sanguinis torrente abstergitur . . . et per renes suo tempore excernitur ac, albi in urinis sedimenti sub specie, felicem in multis exitum promittit.“ J. P. FRANK. Epit. l. c. p. 18.

82) P. I. Vol. I. Cap. VII. §. LXXII. 2.

83) Culpa abscessulorum diruptorum. Sic die 16. Januarii 1800. medicus meus secundarius, Dr. SCHMIDT, juvenem viginti duo annorum curavit, qui ad Nosocomium Vindobonense venerat de nihilo nisi de doloribus quasi rheumaticis inter scapulas querelas agens. Data fuerunt lenia diapnoica. Quarta die introitus, ob alvum obstructam clyster injectus fuit. Cum hoc cum nisu redderet *mortuus concidit*. Aperto cadavere in cordis vicinis ulcusculum aortae detectum est. Pericardium conspicuam sanguinis copiam continebat.

84) Si lithiasis arteriarum gangraenae locum dari possit (Cap. XV. §. LVIII. N. 2. (22)), cur non et polypi, obliteraciones arteriarum efficiantes, indequo aditum cruoris ad portam quandam impredientes?

Cura. 3. Ad haec mala impedienda, quo citius id fieri potest, ad methodum adversus febrem inflammatoriam ⁸⁵⁾ et pericarditidem ⁸⁶⁾ commendatam, confugiendum est. Num cruoris de- tractione indicata, haec ope arteriotomiae susci- pienda erit?

CAPUT XV.

De lithiasi arteriarum.

§. LVIII.

Sedes. Symptomata.

Sedes. 1. *Lithiasis arteriarum* ¹⁾ plerumque ad initium aortae locum obtinet ²⁾. Visa tamen est
aorta

85) P. I. Vol. I. Cap. VII. §. LXXIII.

86) Cap. VII. §. XXVII.

1) AGLIETTI *sulla litiasi delle arterie; in sessioni pub- bliche dell' Ateneo Veneto tenute negl' anni 1813 ed 1814.* p. 39. CRUVETHIER *Mémoires sur quelques altérations organiques des artères v. Journal de méd. chir. et pharm.* 1815. Decemb. p. 366.

2) e. c. LANCISIUS *de motu cordis et aneurysmatibus,* in Opp. var. T. II. p. 250. — ejusd. *von d. verschied. plötzlich. Todesarten, übers. v. FAHNER.* 2. Th. p. 123. — BLANCARD *Anat. pract. rat.* Cent. I. Obs. 41. p. 97. — TH. BARTHOLINUS l. c. Cent. I. Hist. 50.

aorta ad initium suum normalis, et in decursu
dum-

T. I. p. 77. — SCULTETI tract. de Trichias. adm. p. 83. — VIEUSSENS *Traité sur la structure du coeur*. p. 109. — SENAC *Traité de la struct. du coeur*. T. II. p. 433. — VATER Diss. de osteogenia naturali et praeternaturali. Prooem. in HALLERI diss. anat. T. VI. p. 227. — Ejusd. museum anat. propr. Helmst. 1750. p. 92. — Miscell. Nat. Cur. Dec. I. A. 9. 10. Obs. 31. 102. Dec. II. A. 1. Obs. 90. Dec. III. A. 3. Append. p. 161. A. 4. Obs. 58. A. 9. 10. Obs. 171. Eph. N. Cur. Cent. VI. Obs. 51. Cent. X. App. p. 442. Act. N. Cur. Vol. III. Obs. 31. — Commenc. liter. Noric. 1732. p. 138. — *Histoir. de l'acad. des scienc. de Par.* 1701. p. 35. — MORGAGNI de causis et sedib. morb. Ep. IV. 20. Ep. VII. 9. Ep. XVII. 17. Ep. XVIII. 28. 30. Ep. XIX. 49. Ep. XXI. 4. Ep. XXVI. 15. 37. Ep. XL. 24. Ep. XLIX. 18. Ep. LX. 6. Ep. LXIV. 13. et plur. loc. — BUCHWALD Diss. observ. quadriga. Hafn. 1740. — GUATTANI l. c. — BIRMI observ. anat. in SANDIFORT Thes. anat. Vol. III. N. 15. — BÖHMER Obs. anat. rar. Fasc. I. praefat. p. X. Not. dd. — BAADER Obs. med. 45. — MECKEL in *Mém. de l'acad. des scienc. à Berl.* 1754. *Collect. Acad. Part. étrang.* T. IX. p. 14. — POHL Progr. de ossificatione vasorum praeternaturali. Lips. 1774. in *Wurz neu. Auszüge*. 8. B. p. 103. — SANDIFORT Obs. anat. path. L. I. C. 2. p. 54. L. III. C. 2. p. 43. L. IV. C. 6. p. 55 et 59. — Ejusd. Mus. anat. Vol. I. Sect. 5. N. 78. p. 273. — TRILLER Diss. de fame lethali a callosa oris ventriculi angustia. §. XXVII. in *Opusc. med. Francof.* 1766. T. I. p. 24 sq. — MOHRENHHEIM's *Wiener Beiträge*. 2. B. p. 212. — STOLL *Heilungsmethode*, übers. v. FABRI. 1. B. p. 239. — *Beiträge z. Arznei-*

dumtaxat ossea ³⁾. Aortam sub diaphragmate osseam reperimus ⁴⁾, reperieruntque alii osseam in toto curriculo ⁵⁾. Osseae detectae fuere arteriae quotquot in superficie externa decurrunt ⁶⁾. Narratur de lithiasi universali arteriarum, solis arteriis encephalicis exceptis ⁷⁾. Longe frequentius lithiasis arteriarum singularum obvenit; videlicet arteriarum carotidum ⁸⁾, arteriae inno-

mina-

kunde, v. FR. CHR. SCHEIDEMANTEL. *Leipz.* 1797.
 1. Th. — WALTER's *anat. Mus.* 1. B. p. 143. N. 287.
 288. p. 149. N. 298. 299. p. 150. N. 300. 301. 302. —
 PALETTA in WEIGEL's *ital. med. chir. Bibl.* 4. B. 1. St.
 p. 120. — VALCARENCHI de aorta aneurysmatica.
 Obs. I. p. 58. 60. — HODGSON l. c. p. 11. — HOWELL
 in the *London medical and physical Journal* by FOTHER-
 GILL. T. XLVI. 1821. Sept. (ossificatio sub forma
 annuli). Multa exempla ipse collegi.

3) HARVEY exercit. alt. de circulo sanguinis in Opp.
 T. I. p. 131. — MORGAGNI Epist. XXIV. 16. Epist.
 XLIV. 21. Ep. LVII. 10. Ep. LX. 12.

4) Cap. XI. §. XLII. N. 1. (36).

5) BAADERI observ. med. 44. — SANDIFORT Thesaurus
 anat. diss. Vol. III. p. 55. — LIEUTAUD hist. anatom.
 med. Lib. II. Sect. 5. Obs. 772. b. T. II. p. 245. —
 BOGGI in PACCHIONI Opp. p. 216.

6) MICHAELIS in RICHTER's *chir. Bibl.* 6. B. p. 160.

7) BUCHWALD Observ. quadriga. Hafn. 1740. Obs. 3.
 in HALLERI Collect. diss. ad morborum historiam et
 curat. facientium.

8) BLANCARD Anat. pract. ration. Cent. I. Obs. 19. p.
 49. Obs. 41. p. 97. — WILLIS anat. cerebri. Cap. 7. —
idem de anima brutorum. Pars II. Cap. 8. — MOR-

minatae⁹⁾ et basilaris¹⁰⁾, arteriarum pelvis¹¹⁾, arteriae lienalis¹²⁾, arteriarum abdominalium¹³⁾, brachialium¹⁴⁾ cruralium¹⁵⁾, multarumque aliarum¹⁶⁾.

2. *Symptomata lithiasis aortae* cum illis Symptomata.
lithiasis cordis¹⁷⁾, cui saepe jungitur¹⁸⁾, conveniunt.

GAGNI Ep. XXIV. 6. Ep. XLIII. 17. Ep. LXII. 7. Ep. LXIV. 13. Ep. LXVII. 14. — LIEUTAUD l. c. Lib. III. Sect. 2. Obs. 65. 66. T. II. p. 328. — BOUCHER in *Journal de méd.* 1776. dec. T. 46. p. 549. — STOLL rat. medendi. T. I. SANDIFORT l. c. Lib. III. Cap. 2. p. 52.

9) SANDIFORT l. c. p. 45.

10) MORGAGNI Ep. XXVII. 2.

11) Idem Ep. XXXVII. 30. Ep. XL. 23. 24. Ep. XLII. 35. Ep. LX. 4.

12) Idem Ep. III. 2. Ep. XX. 26. Ep. XL. 22. WICHMANN *Ideen zur Diagnostik.* 2. B. p. 161.

13) MORGAGNI Ep. XL. 24. Ep. LVI. 18.

14) Idem Ep. XLIII. 17.

15) NAISH in *Philosoph. Transact.* N. 369. p. 226.

16) HALLERI *Elem. Physiol.* T. IV. p. 130. Vol. VIII. P. II. p. 78. — De corp. hum. fabr. Lib. IV. Sect. 3. p. 130. — Praelect. in BOERHAAVII institut. Vol. III. p. 130. — PYTHAGORAE et PABONIS exercit. anat. et med. p. 208. — *Breslauer Samml.* 1725. p. 659. — TRILLERI *Opusc. med. et philolog.* T. I. p. 25. BOEHMER *Obs. anat. rar.* Fasc. I. p. 10. not. ff. *Kongl. Vetenskaps Acad. Handling.* 1765. p. 292. 1762. p. 163.

17) Cap. XI. §. XLII.

18) Ibid. N. 7. (32).

niunt. Cujuscunque porro arteriae lithiasis, propria agnoscit symptomata, ex impedito cruoris circulo facile explicanda. Sic ex lithiasi arteriarum encephalicarum apoplexia ¹⁹⁾; ex illa arteriarum pulmonalium pneumonorrhagia ²⁰⁾, observantur. Arteriis cruralibus lithiasi laborantibus, *gangraena sicca senilis* extremitatum inferiorum expectanda ²²⁾. Arteriis brachialibus eodem vitio labo-

19) Carotidum ossificationes in *apoplecticis* mentionem jam injeci (P. II. Vol. I. Sect. I. Cap. V. §. XXV. 3 (65.)). Verum tamen cum HODGSON (l. c. p. 47.) non dicerem: „und selten beobachtete ich einen, nicht von zufälliger Gewaltthätigkeit entspringenden Schlagflus, ohne jene krankhafte Ausartung (lithiasis) der Gefäße des Herzens.“ Rite monet CHEYNE (*cases of apoplexy and lethargy. Lond. 1812.*): „Zerreiſung der Arterie ist nicht eine nothwendige Folge der Absetzung von Kalkstoff in die Häute derselben, selbst wenn diese in dem ganzen Verlaufe der Arterie Statt fände.“ Interea jam BAILLIE (*Morbid Anatomy* p. 453.) de vi ossificationum arteriarum in apoplexiis cerebri gignendis pulchre locutus est.

20) „Blutspeien in alten Subjecten wird häufig von diesem Fehler der Arterien begleitet.“ HODGSON l. c. p. 47.

22) Sic observationes COWPER (*Philosoph. Trans. Vol. 23. p. 1195. — Vol. 24. p. 1970.*), NAISSH (*ib. Vol. 34. p. 226.*), HODGSON (l. c. p. 65.) et meae docent. Inter alios vidi Viennae a. 1802. mense Septembri virum 59 annorum, qui jam ante duos annos cum dimidio gangraena digitorum pedis dextri correptus, ac moscho et opio sanatus fuerat. Nunc malum recruduit. Pulsus erat irregularis et, praesertim in

laborantibus, pulsus defectus ²³⁾ forteque manus gangraena ²⁴⁾ oritur. Praeter nutritionis defraudatio-

brachio dextro, vix perceptibilis. Pater meus lithiasin arteriarum suspicatus est. Ac re quidem vera, aegroto die 1a octobris, postquam gangraena ultra genua pervenerat, demortuo, detegebatur aorta, maxime eo in loco, ubi in arterias iliacas dividitur, ita ossificata, ut vix specillum admittere potuisset. Adebat simul ossificatio valvularum mitralium et semilunarium cordis. Cfr. HALLER Elem. physiol. Lib. IV. S. 4. §. 32. MARITIUS Pr. de arteria crurali ossea, per oedema gangraenamque siccam lethali. Viteb. 1798. FABR. HILDANUS Opp. Cent. II. Obs. 49. LANCISI de motu cordis ab aneur. — SENAC l. c. T. 2. p. 415. — HODGSON l. c. p. 309.

23) Forte huc spectat observatio, quam BERRYAT retulit (*Histoire de l'académie des sciences* 1748. p. 61.) de femina, in qua nullus arteriarum motus percipi potuerat, quacumque in parte arteriae investigarentur. Post motum etiam fortiozem atque cum magis incaluisset, nullibi tamen corporis et nequidem ad thoracem, sensibilis erat arteriarum pulsatio, ita ut multi medici huic feminae, dum aegrotaret, mortem praedixerint, quin tamen justa fuisset eorum prognosis.

24) Mense Februario a. 1821. ad senem in consilium vocatus fui, qui, praevio frigore marmoreo, pruritu intolerabili et dolore summo digitorum auricularium et annularium utriusque manus, in partium illarum gangraenam, cum lapsu unguium incidit. Sectio cadaveris non fuit concessa. Eo magis ossificationem arteriarum brachii suspicor, cum defuncti aegri frater, adhuc vivens, morbo cordis laboret, quem a lithiasi derivarem.

dationem ²⁵⁾ communissimus lithiasis arteriarum effectus est hydrothorax ²⁶⁾, aut saltem crurum et scroti oedema, secedente ab illis facillime epidermide.

§. LIX.

C a u s s a e. D i a g n o s i s.

Caussae. 1. Quamvis ossescentia arteriarum interdum in aetate quoque juvenili observetur ²⁷⁾, attamen longe illa frequentior est in senili ²⁸⁾. Ibi rhachitidem, hic arthritidem pro morbi *caussa* agnoscimus: constat etenim tum rhachitidem, tum arthritidem saepissime secretioni morbosae
phos-

25) „Diese Absetzung kalkerdiger Masse in den Arterienhäuten ist oft Ursache sehr ernsthafter Folgen, sowohl durch Unterbrechung der Continuität des leidenden Gefäßes, als auch, indem sie den Blutstrom, welcher durch das Gefäß fließen sollte, von der Ernährung anderer Theile abhält.“ HODGSON l. c. p. 46.

26) P. II. Vol. II. Sect. I. Cap. XI. §. LIV.

27) Infantis quindecim mensium arteriam temporalem osseam possidet YOUNG teste HODGSON (l. c. p. 45.). Cfr. PORTAL *Cours d'anat. méd.* T. 5. p. 133.

28) GERNET diss. de siccitatis senilis effectibus. Lips. 1753. — S. CH. LUCAE Progr. de ossescentia arteriarum senili. Marb. 1817. — BAILLIE *Transact. of a Society for improvement of med. Knowl.* Vol. I. p. 133. — BICHAT (*Anatomie générale.* T. 2. p. 292.), qui ait: „je puis assurer que sur dix sujets, il y en a au moins sept qui présentent des incrustations au de là de la soixantième année.“

phosphatis calcis ortum praebere, ac materiam osseam ad arterias depositam nil aliud esse quam phosphatē calcis ²⁹⁾. Forte vero ossescentia arteriarum (ne dicamus, totius, plus minus, corporis) in senibus, vix *morbum* constituit, sed potius ad *operationem normalem naturae*, ultimam vitae humanae periodum molientis (cujus evolutionem rhachitis et arthritidis *anticipare* solent ³⁰⁾), spectat. Qualemcunque caeterum causam lithiasis arteriarum admittamus, nunquam tamen credendum est, ossificationes in vivente homine, instar incrustationum fossilium, locum obtinere ³¹⁾.

2. Lithiasis arteriarum *diagnosis* minoribus ^{Diagnosis.} difficultatibus premitur, si ratio habeatur constitutionis corporis, aetatis aegrotorum, morborum praegressorum ³²⁾, ac symptomatum praesentium, inter

29) Teste BRAND haec materies ossea ad arterias deposita componitur: ex *phosphate calcis* 65,5, et ex *materia animali* 34,5. — Haec constat maxime ex *albumine*. (HODGSON l. c. p. 44.). Analysis a FOURCROX et VAUQUELIN suscepta exhibuit: phosphatis calcis 65,3, carbonatis calcis 6,5, salium solubileum 4,0 et materiae animalis 24,2. (RAYER l. c.).

30) Libenter arthritidem pro *senectute anticipata* definirem.

31) HALLERUS processum ossescentiae in corpore humano sequenti modo explicat: „cascosa primo, inde callosa, quasi coriacea, demum *osseae squammæ* fit simillima.“

32) Cap. XIV. §. LVII. N. 1. (77).

inter quae *pulsus* sic dictus *senilis*, lentus scilicet, tensus et irregularis eminentem locum obtinet.

§. LX.

P r o g n o s i s. C u r a.

Prognosis. 1. Lithiasis arteriarum forte citius mortem properaret, nisi arteriae collaterales saepe vices arteriarum ossescentium agerent ³³⁾, nisique pars phosphatis calcis, alias arteriis infensa, per vias urinales ³⁴⁾ et cutem ³⁵⁾ secederet.

Cura. 2. Quam ob rem in lithiasi arteriarum curanda juvat, ut cunctae emundationis viae apertae teneantur. Urinam promovemus usu *foliorum digitalis purpureae* ³⁶⁾, *stipitum solani dulcamarae*,

33) JADELOT de ambis carotidibus ob lithiasin obliterated narrat, supplemibus procul dubio arteriis vertebralibus. (*Anatomische Beschreibung eines sehr ungewöhnlichen Menschenkopfes. A. d. Fr. Jen. 1805*).¹

34) Jam dudum innotuit urinam paucam lithiasin arteriarum promovere (MICHAELIS l. c.). Nec rara est complicatio lithiasis arteriarum cum calculo viarum urinalium. Cfr. GIESELER diss. de calculo vesicae. Leid. 1674. (Arteriae lapidescentes lienalis et coronaria, simul cum calculo vesicae) et supra. Cap. XI. §. XLII. (36).

35) Forte sudor ille urinosus, de quo alibi quaestionem institui (P. I. Vol. II. Cap. XXXVIII. §. CLVIII. 3. (67)) effectum, systematis arteriosi, sese per cutim a lithiasi liberantis, sistebat.

36) ERDMANN *Beiträge zur prakt. Arzneiwissenschaft.* 3. B. p. 82.

camarae, et *acidi nitrici* ³⁷⁾. Opus transpirationis sustinemus *sulphure* et *guajaco*. Alvum sollicitamus *rheo*, quibus singulis indicationibus, *aquae minerales acidum carbonicum et sodam continent* maxime satisfaciunt, utpote quae, cum senectutis officinam ita destruant, non immerito *fontes vitae* nuncupantur. Si aeger fuerit plethoricus, *venae sectio*, semel bisve de anno, non est praetereunda. In arthritico — scorbuticis, *qualitatem etiam sanguinis emendare* studemus, succis vegetabilium recentium ³⁸⁾, victu selecto ex jusculis viperarum, testudinum et ranarum.

CAPUT

37) Sub forma limonadae.

38) P. II. Vol. II. Sect. I. Cap. X. §. XLVIII. N. 9.

CAPUT XVI.

De aneurysmate, praecipue aortae.

§. LXI.

Definitio. Literatura.

Definitio. 1. **T**umor, cui aut dilatatio, aut erosio membranarum arteriam constituentium ansam dedit, aneurysma *) nuncupatur.

Literatura. 2. Nulla ante GALENUM¹⁾ de aneurysmatibus mentio

*) BOERHAAVE et RICHTER scribunt aneurisma. SWIETENIUS scribit *aneurismo* a GR. ἀνευρύω, dilato. Constat aneurysmatis vocabulum non ubique apud veteres eodem sensu occurrere. GALENUS, AËTIUS, AEGINETA, AVICENNA, alique inter veteres praestantissimi, aneurysina adesse dicunt, quando arteria, quaecunque etiam de causa, ita fuit vulnerata, ut sanguis effluat. FERNELIUS in omni aneurysmate arteriae *dilatationem* adesse credidit, quam sententiam VESALIUS fovisse videtur. Hac theoria non contentus, SENNERTUS statuit, in quolibet aneurysmate, muscularis sive internae tunicae arteriosae *ruptionem* adesse, externa interim, quam tenuem, raram, ac mollem vocat, illaesa remanente. (Opp. omnia med. T. III. Lib. V. p. 1. C. 23.).

1) De tumor. praetern. C. II. — Method. med. Lib. II. Cap. 7.

mentio facta est; ipseque dumtaxat aneurysmata externa cognoverat. Debetur aneurysmatum generalis doctrina VESALIO ²⁾, SYLVATICO ³⁾, POLITIO ⁴⁾, TH. BARTHOLINO ⁵⁾, HORNEO ⁶⁾, WEPFERO ⁷⁾, FABRICIO ⁸⁾, METZGERO ⁹⁾, WEDELIO ¹⁰⁾, SENNERTO ¹¹⁾, FERNELIO ¹²⁾, KLOSEO ¹³⁾, LITTREO ¹⁴⁾, HOLTORFIO ^{*)}, ALBERTO ¹⁵⁾, LANCI-SIO ¹⁶⁾, MICHELOTTIO ¹⁷⁾, ALBERTINO ¹⁸⁾, HIL-SCHE-

- 2) Chirurgia magna. Lib. V. Cap. I. p. 1040. (A. 1557).
- 3) Tract. de aneurysmatibus. Vincent. 1595.
- 4) Apologia de aneurysmate praetenso. Panorm. 1620.
- 5) De aneurysmate. Lugd. Bat. 1641. — Hist. anat. Cent. II. hist. 9. IV. 41.
- 6) Epist. de aneurysmate. Panorm. 1644.
- 7) Diss. περί ανευρύσματος. Basil. 1659.
- 8) Diss. de aneurysmate. Basil. 1667.
- 9) Diss. de aneurysmate. Tubing. 1679.
- 10) Diss. de aneurysmate. Jen. 1699.
- 11) Op. omn. T. V. Lib. 5. Pr. I. Cap. 43.
- 12) Universa medicina. De extern. corp. affect. Lib. 7. Cap. 3.
- 13) Diss. de tumore aneurysmatico. Lips. 1702.
- 14) Histoire de l'acad. des scienc. de Paris 1707. p. 22. 1712. p. 31.
- *) Casus aneurysmatis in capite pueri XI. annorum. Argent. 1722.
- 15) Diss. de aneurysmate. Hal. 1725.
- 16) De aneurysmatibus. Romae 1728.
- 17) Epist. de morbis sanguinis ductuum in Comm. Acad. Bonon. T. I. p. 464.
- 18) Comment. Bonon. T. I. p. 387.

SCHERO ¹⁹⁾, PETITO ²⁰⁾, WALTHERO ²¹⁾, MORGAGNIO ²²⁾, LEEUVENO ²³⁾, GUATTANIO ²⁴⁾, ARNAULDO ²⁵⁾, GIBELLETO ²⁶⁾, GÖNNERO ²⁷⁾, ASMANNO ²⁸⁾, MONROO ²⁹⁾, VERBRUGGIO ³⁰⁾, WELTINO ³¹⁾, STRIBELIO ³²⁾, LAUTHIO ³³⁾, RANEO ³⁴⁾, WITTEO ³⁵⁾, CAILLOTO ³⁶⁾, BICHATO ³⁷⁾, AYRE-RO ³⁸⁾,

19) Diss. de aneurysmate. Jenae 1728.

20) in *Mém. de l'acad. de Paris* 1736.

21) Pr. de aneurysmate. Lips. 1738. in *Nouveau Journal de l'acad. de Berlin* 1785. N. 48.

22) De sed. et caus. morbor. Epist. XXVI. Epist. anat. I.

23) Diss. de aneurysmate vero. Leidae 1742.

24) *Historiae duae aneurysmatum*. Romae 1745.

25) *Observations on aneurysms*. Lond. 1750.

26) Diss. de aneurysmate. Argentor. 1757.

27) Diss. de vasorum distentione. Hal. 1761.

28) Diss. de aneurysmatibus. Groening. 1763.

29) *Cases of aneurysms with remarks*. In *Edinb. essay and observations*. Vol. 3. Edinb. 1771. N. 12.

30) Diss. de aneurysmate. 1773.

31) Diss. de aneurysmate vero pectoris externo, hemiplegiae sobole. 1780.

32) Diss. de aneurysmate. Viennae 1783.

33) *Collectio scriptorum latinorum de aneurysmatibus*. Argent. 1785.

34) Diss. de arteriarum morbis et praecipue de aneurysmatibus. Lugd. Bat. 1787.

35) Diss. de aneurysmate ejusque curatione. Kilon. 1787.

36) *Essay sur l'aneurysme*. Paris 1799.

37) *Anatomie générale appliquée à la physiologie et à la médecine*. T. 2. Paris 1801. p. 282.

RO³⁸), SARAZINO³⁹), GRAEFFIO⁴⁰), BENEDIXIO⁴¹),
 BRIOTO⁴²), DINGEMANSIO⁴³), RECAMIERO⁴⁴),
 CHR. FR. LUDWIGIO⁴⁵), SCARPA⁴⁶), ACKER-
 DIANNO⁴⁷), POPPIO⁴⁸), HÜBNERO⁴⁹), LAENNEC⁵⁰),
 ABERNETHY⁵¹), FREER⁵²), HODGSON⁵³), CHE-

VAL-

38) *Ueber die Pulsadergeschwülste und ihre chirurg. Behandlung.* Gött. 1800.

39) *Considérations sur les causes générales de l'aneurysmes et de la rupture spontanée des vaisseaux sanguins artérielles.* Paris 1800.

40) *Angiectasien.* Leipz. 1808.

41) *Diss. Aneurysma externum ejusque curatio.* Jenae 1801.

42) *Essay sur les tumeurs pour le sang artériel.* Paris 1802.

43) *Verhandeling over de waare en onwaare Slagaderbreuken.* Amsterd. 1803.

44) *Sur la formation de quelques aneurysmes spontanés* in *Journal de méd.* T. XI. p. 29.

45) *Pr. diagnostices chirurgicae fragmenta IV. De aneurysmate vero interno.* 1811.

46) *Sull' aneurysma, riflessioni ed osservazioni anatomico-chirurgiche.* Pavia 1804. 2. ed. 1820.

47) *Diss. observat. in aneurysmate.* Upsal. 1804.

48) *Diss. selectiora capita de aneurysmatibus.* Altdorf: 1805.

49) *Diss. de aneurysmatibus.* Goett. 1807.

50) *Op. c.* T. II.

51) *Surgical observations on aneurysms.*

52) *Observations on aneurysms.*

53) *Op. c.* p. 94.

Frank Prax. II. 2. 2:

X.

VALLIER *), BOYSEN **), DOERING ***), ADELMANN ****), aliisque ⁵⁴). De *aneurysmate aortae* speciatim scripserunt KNIPSMARKE ⁵⁵), VALCARENGHI ⁵⁶), HALLER ⁵⁷), GUATTANI ⁵⁸), LOMBARDINI ⁵⁹), BURSERIUS ⁶⁰), SANDIFORT ⁶¹), DERRECAGAIX ⁶²),

SPA-

*) Diss. aneurysmatum adumbratio anatom. — pathologica. Berol. 1821.

**) Diss. de aneurysmatibus. Kil. 1822.

***) Diss. quaedam circa aneurysmatum pathologiam. Berol. 1822.

****) Diss. de aneurysmate spurio varicoso. Wurzb. 1821.

54) Act. Erud. Lips. a. 1696. Febr. p. 50. — 1702. Nov. p. 506. — 1706. April. p. 189. — 1708. April. p. 170. — 1712. Sept. p. 417. — 1714. Sept. p. 420. — 1716. Mart. p. 89. 99. — 1718. Jan. p. 14. — 1719. Jan. p. 253. — 1725. Jul. p. 332. Ephem. N. Cur. Dec. I. A. 1. Obs. 18. A. 4 et 5. Obs. 98. A. 6 et 7. Obs. 26. Dec. II. A. 3. Obs. 119. — Dec. III. A. 2. Obs. 109. A. 7 et 8. Obs. 178. App. p. 126. A. 9 et 10. Obs. 55. Cent. V et VI. p. 61. 74.

55) De aortae aneurysmate et polypo cordis.

56) De aneurysmate observ. binae. Cremonae 1741.

57) Progr. de aneurysm. aortae. Goett. 1749.

58) Animadversiones de aneurysmaticis praecordiorum morbis. Flor. 1756.

59) De aneurysmaticis praecordiorum morbis. Ticini 1787.

60) Instit. T. IV.

61) *Heel- en ontleedkundige Verhandeling over eenen Slagader-Breuk in de groote Slagader. S'gravenhage 1765.*

62) DESAULT *auserl. chirurg. Wahrnehmungen. N. 178. — Ejusdem: Journal de chirurgie. T. 3.*

SPAVENTI⁶³), BAILLIE⁶⁴), SOMMER^{*}), HEISLER^{**}),
 EHRHARDT⁶⁵), NOVERRE^{***}), DECKART^{****}) et
 CLOQUET^{*****}).

§. LXII.

S y m p t o m a t a.

1. Alia sunt *symptomata aneurysmatum ex-* Genera-
ternorum, alia *internorum*. tim.

2. *Aneurysma externum* exhibet tumorem Sympt. a
 loco quo conspicua arteria decurrit. Tumor hic externor.
 ex fundo arctiore in saccum assurgit et pulsa-
 tionem, cum illa cordis cohaerentem, manifestat.
 Cutis talem tumorem cooperiens, saltem a morbi
 initio, a consueto colore non abludit. Tumor
 sub levi compressione evanescit, cessante ea cum
 sibilo, vel strepitu, redit. Quin immo similia
 X 2 phae-

63) Diss. de frequentioribus cordis majorumque vaso-
 rum morbis internis. Viennae 1772.

64) *Anatomie des krankhaften Baues. N. 2. — Series of*
engravings. Fasc. I. Tab. 3.

*) Diss. aneurysmatis aortae pleuritidem mentientis ca-
 sum. Berol. 1816.

**) Diss. rariorem aneurysmatis aortae sternum perfo-
 rantis historiam exhibens. Landish. 1817.

65) De aneurysmate aortae commentatio anatomico-pa-
 thologica. Lips. 1820.

***) *Diss. sur les aneurysmes de l'aorte. Paris 1820.*

****) Diss. sist. descriptionem concretionis venae cavae
 superioris una cum ingente aortae ascendentis aneu-
 rysmate adnexa morbi historia. Berol. 1823.

*****) *Revue médicale. 1823. Février.*

phaenomena etiam sub compressione, dummodo fortiore, arteriae tumorem aduentis oriri solent. Arteriae, a tumore decurrentis, pulsatio, exilis et simul inaequalis est. Membrum, hac sola forte arteria instructum, pallescit, frigescit, oedematosum laxumque redditur. Subinde ex sacco aneurysmatis enormiter extenso, ac simul tenuiore, sanguis contentus pellucet et exsudat; aut vascula cutis distracta, inflammationem, suppurationem vel gangraenam concipiunt ⁶⁶⁾.

Sympt. a.
interni.

3. *Aneurysmata interna* plerumque ab universali quadam arteriarum affectione incipiunt. Aegroti saepe de vaga, atque huc illuc per colum et artus errante, arteriarum pulsatione conqueruntur. Morbo in *aorta* sedem figente, observari solent ⁶⁷⁾; vertigo, animi inconsueta irritabilitas, insomnia protracta ⁶⁸⁾, emaciatio ⁶⁹⁾, impotentia corpus anteriora versus, sine sensuum obnubilatione, inclinandi, ardores nocturni, frigus extremitatum, pandiculationes, sudores quies-

66) J. P. FRANK Epitome de curandis hominum morbis. Vol. V. P. II. p. 46.

67) Sequens morbi descriptio ex centum triginta septem propriis observationibus circiterque totidem extraneis deprompta est.

68) Molestissima erat agrypnia in viro triginta duo annorum (PASEAWSKI).

69) In aneurysmate aortae descendens aegrum veluti in phthisi pulmonali emaciatum vidi.

quiescente icet corpore, cita defatigatio ⁷⁰⁾, capitis posteriora versus subitanea retractio ⁷¹⁾, livor labiorum, venae faciei varicosae, frequens obfuscatio oculorum visusque coloratus ⁷²⁾, auditus difficilis ⁷³⁾, susurrus auris alterutrae praecipue sinistrae, sternutatio ⁷⁴⁾, oscitatio, articularum temporalium tensio et pulsatio vehemens ⁷⁵⁾, vibratio carotidum; inflatio colli veluti sub partu, dolores lancinantes ad latus illius sinistrum, struma ⁷⁶⁾, tumor pulsans ex spatio triangulari super sternum prodiens ⁷⁷⁾, claviculis insidens, constrictio faucium, rauco, aphonia ⁷⁸⁾, ardor oeso-

70) BURNS l. c. p. 283.

71) De hoc symptomate conquerebatur vir triginta quinque annorum (KOROLKO).

72) Idem KOROLKO objecta saepe viridia aut flava cernebat.

73) HODGSON l. c. p. 165. Obs. 23. (Aneurysma erat prope originem arteriae innominatae).

74) KREYSIG Op. cit. 2. Th. p. 503.

75) Evidentissima erant haec symptomata apud KOROLKO. Cfr. MORGAGNI Epist. XVII. Art. 17. — BURNS l. c. p. 277.

76) P. II. Vol. II. Sect. 1. Cap. VI. §. XXIV. N. 1. (*).

77) „Die Geschwulst erscheint zuerst an dem Grunde des Halses und steigt nach und nach höher.“ HODGSON l. c. p. 132.

78) Juvenis Vilmensis (Statynski), animi plane compos, suffocationi proximus, signo, manu dextra super brachium sinistrum facto, venae sectionem, quam deficiente voce verbis designare hand potuerat, exposcebat.

oesophagi, dysphagia ⁷⁹⁾, ructus sonori ⁸⁰⁾, singultuosi, pondus ventriculi post cibos assumptos ⁸¹⁾, vomitus, dolores ad pectus, claviculas, scapulas, dorsum, diaphragmatis curriculum ⁸²⁾, lumbos, extremitatesque praecipue superiores ⁸³⁾; pulsatio modo obscura, profunda, interna a solo aegroto percipienda, modo attactui, visui et auditui ⁸⁴⁾ manifesta (sublevationis sterni et costarum, harumque et vertebrarum destructionis caussa ⁸⁵⁾) atque in regione epigastrica ⁸⁶⁾, umbilicali, iliaca sinistra, dorsali ⁸⁷⁾, evidentissima; oppres-

79) Cfr. P. III. Vol. I. Cap. de dysphagia.

80) Legi de his meretur MORGAGNI Epist. XVII. 16. Epist. XVIII. 17. Epist. XXVI. 11.

81) Familiare symptoma.

82) SIMMONS in *medical communications*. Vol. I.

83) Dolores brachiorum manuumque etiam MICHELOTTI in monacho cujus cadavere dissecto inventum est aneurysma supra aortae curvaturam pugni magnitudinis. Aderant simul squamae osseae ad internam tumoris faciem. l. c. p. 442.

84) Interdum haec pulsatio in thorace *dextro* palam fit, ita ut suspicio de *cordis translocatione* oriri possit. (ROSTAN in *Nouveau Journal de médecine, chirurgie et pharmacie*. 1818. Mai. Vol. 2. p. 29.).

85) Vide infra §. LXIII. N. 2. (36).

86) CONCANEN in *med. comm.* v. *Edinburg.* 2. Dec. 5. B. p. 98. — In epigastrio pulsationem *cordis*, ab aneurysmate aortae, *depressi*, in clinico Vilnensi percepi.

87) VESALIUS refert, se anno 1557 nobilem LEONARDUM VELSERUM invisisse qui ex effrenati equi saltu et concussione corripiebatur vehemente dorsi dolore;

oppressio et angustia pectoris, saepe periodica⁸⁸⁾, cum lipothymiis, motibus convulsivis oris et extremitatum, lachrymatione involuntaria, difficultate spirandi, interdum sibilosa⁸⁹⁾, imprimis a motu, a gressu adversus ventum, a cibis calide deglutitis, ab animi pathematibus, ab aëre per adstantium numerum corrupto, ab alvi et urinae depositione, a compressione carotidum, quin immo a sola pulsuum protracta exploratione⁹⁰⁾, excitata, et a perfrictione thoracis aut colli, vel a vomitu, mitigata; tussis laboriosa, atrox, saepe a motu corporis inducta, emesin eliciens, cum sputis mucosis, purulentis, iisque tunc copiosissimis, haud raro cruentis; epistaxis, pneumorrhagia; menstrua copiosa, aut suppressa⁹¹⁾;

positio

postea tumor aliquis spinam circa pulsans deprehendebatur, quo in casu statim pronunciavit aneurysma esse arteriae aortae atque veritas hujus diagnoseos ex ipsius cadaveris sectione patuit (BONET sepulchr. anat. Lib. IV. Sect. 2.). Et BURSERIUS ait: „interdum etiam in jugulo et temporibus et dorso etiam pulsationes sunt manifestae“ (l. c. p. 194.).

88) Paroxysmi istiusmodi modo omni mense, modo plurics de die obveniunt et plerumque ab octava usque ad quartam horae partem protrahuntur.

89) Vide iupra §. LXV. N. 9. (6). — BURNS l. c. p. 277.

90) In KOROLKO vidi.

91) Menstruorum observationes, quas saepius in aneurysmate aortae descendents observavi, ut symptoma suppurationis aortae abdominalis describit BEDING-

positio corporis dumtaxat erecta, aut antrorsum flexo trunco ⁹²⁾, aut supine in dorsum, aut in alterutrum latus, saepissime dextrum concessus; pulsus modo regularis, modo intermittens ⁹³⁾, mox debilis, mox fortis, nunc lentus, nunc frequens, fere semper celer et vibrans, cumque cordis motu cohaerens, sed saepe diversus in utrisque brachiis; ictus prosilientes arteriarum brachiorum et crurum ipsis nonnunquam venis propinquioribus communicati ⁹⁴⁾; urina nunc copiosa aquea, nunc pauca rubra cum sedimento lateritio; oedema crurum, faciei (saepe lividae) et anasarca. — *Arteriae coeliacae aneurysma* sese exhibuit pulsatione ad regionem epigastricam, pondere ventriculi, ab alimentorum ingestione aucto, colicâ et sensu puncturae super cutem ⁹⁵⁾.

§. LXIII.

Autopsiae cadaverum.

Aneurysma ipsum.

1. Arteria aut in universo ambitu, aut in latere

FIELD (*A compendium of medical practice*): addit et difficultates urinae.

92) MORGAGNI Epist. XVIII. 17. — BURNS l. c. p. 281.

93) Forte saepius in aneurysmate aortae descendentis. v. BURNS l. c. p. 252.

94) In femina cum aneurysmate aortae in clinico Vilnensi a. 1823 decumbente, venae, arteriis contiguæ, pulsationem exhibebant.

95) NYSTEN in *Journal de médecine, chirurgie et pharmacie*. 1815. Octobre. p. 123.

*latere alterutro saccum efformat. Dum arteria in universo ambitu saccum efformat ille interdum bipartitus est*⁹⁶⁾. Membranae talem saccum constituentes sunt modo normales⁹⁷⁾ et glabrae, modo incrassatae⁹⁸⁾, tenuiores⁹⁹⁾, oblitae interius multis exiguis excrescentiis planis et in medio perforatis, ulcusculis, fissuris et rimis in fibrosa tunica actis et lymphæ coagulabili impletis, rubellis punctis tinctae, squamulisque osseis sive bracteis innumerabilibus obductae. Tunica vasculosa, hinc illinc a margine horum osseorum concrementorum abrupta et ab arteriae pariete separata conspicitur, quo fit ut asperam superficiem offerat. Etiam oblecta est atheromatosis tumoribus parvulis¹⁰⁰⁾. Arteria in toto ambitu dilatata plerumque sanguinem grumosum, rarius¹⁾ vero coagulum polyposum ex lamellis compo-

96) WALTER *Anatom. Museum.* 1. B. p. 150. N. 300. — HAEN *rat. med.* T. IV. Cap. 2. p. 15 et 23.

97) HODGSON (l. c. p. 72.) vere omnino ait: „*Bisweilen auch sieht man, obschon das Gefäß beträchtlich erweitert ist, doch keine besondere Structur-Veränderung in seinen Häuten.*“

98) HODGSON (l. c. p. 63.) membranas incrassatas aneurysmalis cum peritoneo saccum herniosum antiquum constituyente comparat.

99) EHRHARDT l. c. p. 8.

100) EHRHARDT l. c.

1) Cur HODGSON (l. c. p. 99.) nunquam dicat non inteligo, cum alio loco (p. 71.) ipse fateatur: „*doch enthalten solche theilweise Erweiterungen nur selten Ge-*

compositum et crystallos ²⁾ deponens, continet. Talem dilatationem, ad digitos transversos duos tresve expansam, saepe exhibuit *aorta ubi e corde exit* ³⁾. Maxima vero aneurysmata ad *ramum ascendentem* et *ad curvaturam aortae* obveniunt ⁴⁾. Dum expansio *aortam descendentem* occupat solet illa esse ovalis ⁵⁾. In ipsa una eademque aorta haud rara *plures tales expansiones*

rinnsel.“ Praeterea ipse BAILLIE (l. c.) monet, arterias dilatatas quando magnum adipiscuntur volumen majori minorive sanguinis in laminas sive strata concentrica sibi invicem imposita coacti quantitate esse referta atque impleta.

2) Teste FARADAYS crystalli hujusmodi ex sulphate calcis, ex muriate et phosphate sodae componuntur.

V. EVERARD HOME in *Philosophical Transact. of the R. Society of London, for the Y. 1820.*

3) TESTA l. c. p. 108. 109. 110. 125. 154. 155. — HODGSON l. c. p. 19. — CERUTTI *Beschreibung der krankhaften Präparate des anatom. Theaters zu Leipzig. 1819. c. tab. aenf. N. 736.*

4) CORVISART l. c. p. 346. Obs. LXXI. (Cordis magnitudinem bis superans), — TESTA l. c. p. 154. (magnitudinis capitis infantilis), — ALLAN BURNS l. c. p. 234 et 236. (circumferentiae decem pollicum). — HODGSON l. c. p. 72 et 73. (saccus manum acuminatam accipiens), — SANDIFORT apud VERBRUGGE l. c. p. 398. 402. (undeviginti et tres quartas partes pollicum), — RURSCH *Observ. anat. chirurg. Cent. Obs. 38. (ut pulvinar mediocre). Vidi binis vicibus ad magnitudinem capitis infantilis. Cfr. SCARPA l. c.*

5) EHRHARDT l. c.

nes deprehenduntur ⁶). Interdum aorta *in toto suo decursu* dilatatur ⁷). Vasa quae ex aorta dilatata proficiscuntur, modo etiam dilatata sunt ⁸), modo normalia ⁹). — Dum *arteria in alterutro latere saccum efformat*, membranae illius interna et media, laceratae aut erosae deteguntur, ita ut saccus ex membrana arteriae externa seu cellulosa constituatur ¹⁰). Laceratio aut erosio utpluri-

- 6) LAUTH scriptores de aneurysmat. p. 594. — AYERER l. c. p. 6. — DURET scholia ad libr. prim. de morbis internis. Cap. XXIX. — TESTA de re medica et chirurgica Epist. VII. Ferrariae 1781. et op. cit. p. 74. 108. — KREYSIG l. c. 2. Th. p. 339. — HODGSON l. c. p. 195. not. — EHRHARDT l. c. p. 5. — Vidi binis vicibus duo ejusdem aortae aneurysmata.
- 7) TESTA l. c. p. 276. (Triplo plus expansa usque ad divisionem in utramque arteriam iliacam), — LAENNEC l. c. (duplo).
- 8) EHRHARDT l. c. p. 5. — TESTA l. c. p. 155.
- 9) TESTA l. c. p. 169. — CLARUS *Annal. Clinik.* 1. B. 1. Abtheil. p. 134. — LAENNEC contendit subclaviam sinistram fere nunquam a normali diametro aberrare, etiamsi aorta sit maxime aneurysmatica.
- 10) Et NICHOLLSII (*Philosophic. Transact. Vol. 35. p. 443.*) et HODGSONII (l. c. p. 100.) experimenta docent, destructâ membranâ internâ et mediâ arteriae, externam illius non amplius impetui cruoris resistere posse, ideoque cedere. Idem ex destructione membranae *externae* arteriae contingere posse, internis tunicis illacsis, forte quis crederet? Ast experimenta HUNTERI et EVERARD. HOMEI (*Transactions of a Society for improvement of med. Knowl. p. 144.*) clare de-

plurimum transversales sunt; interdum illae secundum longitudinem, vel in circulum apparent. Dum locus laceratus seu erosus haud amplius est, nil aliud nisi foramen ex arteria ad saccum aneurysmaticum, veluti collo instructum, ducens, animadvertitur. Parietes ejusmodi aneurysmatis multo inaequaliori gaudent crassitie. Superficies eorum interna valde aspera et inaequalis cernitur ¹¹⁾. Interdum membrana quoque externa arteriae aneurysmaticae aut disrupta ¹²⁾, aut a gangraena erosa ¹³⁾ conspicitur, sanguine in partes contiguas effuso. In partibus quae impetui sanguinis extravasati resistere valent, e. c. tela cellulosa, membranae, ossa, oritur veluti novus saccus, capacitati extensionis illarum partium respondens. Alias enormis copia sanguinis

monstrant, membranâ externâ arteriarum destructâ, membranam mediam et internam, ad sanguinem coercendum, omnino capaces esse, atque membranam externam facile ope lymphae coagulabilis restitui.

11) EHRLHARDT l. c. p. 9.

12) *Rupturam sacci aneurysmatici mechanicam contingere potissimum dum ille in cavitationem a membrana serosa (e. c. pleuro, pericardium, peritoneum) obductam, prominet, contendit HODGSON (l. c. p. 128).*

13) *Erosionem ab eschara gangraenosa inprimis locum obtinere asserit HODGSON (l. c.), dum saccus aneurysmaticus cavitationem a membrana mucosa obtectam (e. c. internam superficiem oesophagi, intestinorum, vesicae urinariae) attingit.*

sanguinis in cava vicina extravasati in conspectum venit. Saccus tam ex membrana externa arteriae, quam ex partibus contiguis efformatus, coagulo polyposo, ex lamellis concentricis conflato ¹⁴⁾, repleti solet. Arteria supra et infra saccum saepe friabilis est et incrustationibus calcareis notata. Id genus aneurysmatis, rarius quam antecedens ex aorta originem ducit. Dum illud occurrit, cadit potius in partem aortae descendentem quam in adscendentem ¹⁵⁾. Diameter aortae eo loco, ex quo sinus aneurysmaticus principium capit, saepenumero non est auctus ¹⁶⁾. Haud raro observatur (praecipue in trunco adscendente et in curvatura aortae), quod ex aneurysmate in universo ambitu arteriarum per dilatationem orto, protuberant tumores, quibus ruptura membranarum internarum ansam porrexit ¹⁷⁾. — Praeter arterias externas et aortam aneurysmata sunt visa in *arteriis durae matris* ¹⁸⁾, in *carotidibus* circa latera sellae turcicae ¹⁹⁾,

14) Observantibus jam VESALIO, LANCISIO, HARWEXO, VALSALVA, MORGAGNI. Ait HODGSON (l. c. p. 122.): „dieses Coagulum scheint aus dem mit rothen Theilchen vermischten Faserstoff des Blutes zu bestehen.“

15) EHRHARDT l. c. p. 9.

16) EHRHARDT l. c. p. 10.

17) BAILLIE l. c. — MECKEL *Handbuch der pathologischen Anatomie*. p. 240. — CORVISART l. c. Obs. LIII. — HODGSON l. c. p. 107.

18) HOLTORF l. c. — MALACARNE *Encefalotomia nuova*

cae ¹⁹⁾, in arteriis medullae spinalis ²⁰⁾, in arteriis sublingualibus ²¹⁾, pulmonalibus ²²⁾, intercostalibus ²³⁾, in arteria coeliaca ²⁴⁾, splenica ²⁵⁾, renali ²⁶⁾, et spermatica ²⁷⁾.

2. Aneurysma

ed universale. Torino 1780. p. 68. Cfr. HODGSON l. c. p. 115.

19) BAADER observat. med. incisionibus cadaverum anatomicis illustratae. Frib. 1765. — BLANCAUD anat. pract. ration. Cent. II. Obs. 74. p. 286. — Miscell. Nat. Cur. Dec. II. A. 6. Obs. 207. — MATANI l. c. p. 145. — BONET Sepulchr. anat. Lib. II. Sect. 53. Obs. 4. 27. — BACH in RICHTERS chirurg. Bibliothek 8. B. p. 498. — EISENSCHMIDT in SCHMUCKERS vermisch. Schriften. 2. B. p. 241.

20) MALACARNE l. c. HODGSON l. c. p. 116.

21) COLLOMB Oeuvres méd. chir. p. 451.

22) BLANE Transactions of a Society for the improvement of medical Knowledge. Vol. II. p. 193. Cfr. BAILLIE Treatise on morbid anatomy. p. 456. — BLACKHALL on dropsies. p. 126.

23) „Die 19. Maji 1798. consilium meum petitum fuit Vindobonae pro comite GALLENBERG. Herpete hic a prima juventute, et a multis retro annis haemorrhoidibus laboraverat. A duobus cum dimidio annis sic dicto rheumatismo ad latus dextrum thoracis laborasse credebatur. Tradebantur varia, et simul mercurialia, a quibus interdum per menses se melius habere videbatur. Tandem instituto a me accuratiore examine, detegebatur aneurysma arteriae intercostalis secundae costae cum magna pulsatione.“ Ex Schedis Patris mei.

24) HODGSON l. c. Obs. 26. p. 170. (ad originem).

25) BONET Sepulchr. Lib. II. Sect. 8. Obs. 31. ex BAL-

2. Aneurysma aortae saepius *cor* deprimit, ^{Partes} aut, pro ratione sedis et circumferentiae, vel ^{conti-} dextrorsum vel sinistrorsum propellit. Haud raro disrupto aneurysmate ad initium aortae, cruor in *pericardium* effunditur ^{guae.} ²⁸). Quandoque tale aneurysma ita cum *arteria pulmonali* conglutinatum est, ut illud jam in cavum hujus ruptum effusumque observare liceat ²⁹). — Alias accidit ut aneurysma aortae adscendentis vel ejus flexionis aut *asperam arteriam* ³⁰), aut *oesophagum* ³¹),

LONIO. — MORGAGNI Epist. III. 2. — BEAUSSIER in *Journal de médecine*. T. XXXII. p. 157. — J. NE-
NER obs. de disrupta splenica arteria, in J. RÖMER
decas diss. med. italicar. Norib. 1797. — *Gli atti*
dell' academia delle scienze di Siena. T. II. p. 195. v.
Samml. auserl. Abhandl. f. pr. Aerzte. 17. B. p. 554.

26) Ephem. Nat. Cur. IX. Cent. 59. Obs. — TITIVS de
vitiis renum Comment. II et III. Vitemb. 1798.

27) *Journal de médecine*. 1760. T. XIII. p. 359. v. *Neue*
Samml. auserl. Wahrnehmungen. 4. B. p. 211.

28) MORGAGNI Epist. XXVI. 7. 17. 21. Epist. XXVII.

28. — SCARPA l. c. — BURNS l. c. p. 254. 256. 260.

286. — HODGSON l. c. p. 135. not. — Plura hujus
generis exempla vidi, quare miror LAENNEC ea rara
esse contendere miraturque et EHRHARDT l. c. p. 22.

29) WELLSIUS in *Transact. of a societ. for improvement*
of med. Knowl. Vol. 3. p. 85. — PAGENUS *Bulletin de*
la faculté de médecine. N. 3. — ZEINKIUS ibid. Cfr.
NANNONI *tratto di chirurgia*. T. 2. Obs. 74.

30) BURNS (l. c. p. 284.) animadvertit, *asperam arteriam*
tunc solum comprimi, dum aneurysma ex aortae ad-
scendentis parte *anteriori* ordiatur, minime vero quan-

gum³¹⁾, aut unum *bronchiorum* comprimat, et interjectis partibus exesis et detritis, in eorum cavitatem sanguinem effundat. Visa quoque est compressio finis *venae cavae superioris*³²⁾, atque compressio et obliteratio *cannalis communis carotidis*³³⁾, et *subclaviae sinistrae*³⁴⁾. Nec *nervi recurrentes* semper immunes manent³⁵⁾. —

Quando—

do ex dextro hujus vasis latere aut ex flexione ejus, in quo posteriori casu potius dysphagiam vidit. Legatur de hac argumento MALOET apud LAUTH l. c. p. 595. — HODGSON l. c. p. 134. — CORVISART l. c. p. 34. — BURNS l. c. p. 291. — RICHERAND *sur l'ouverture des aneurysmes de l'aorte dans la trachée artère, et les bronches*; in *Mémoires de la société d'éducation*. 4. année. et LAWRENCE in *medical and chirurgical transactions*. Vol. 6. p. 227. (Loquitur de aneurysmatibus ad radicem arteriae innominatae et ad arcum aortae, *foveus* in tracheam imprimentibus). Cfr. §. LXV. N. 9. (6).

- 31) MATANUS l. c. p. 120. — SAUVAGES nosol. method. T. II. p. 298. — DUPUYTREN apud CORVISART l. c. p. 342. — LAENNEC l. c. — EHRHARDT l. c. p. 22. — Haematemesin ex aneurysmate aortae in oesophagum aperto, vidi Vilnae a. 1814. Caussa rupturae erat portatio sacci rublonibus repleti.
- 32) CORVISART l. c. p. 342. (Lumen venae cavae superioris erat paene deletum; mors secuta est apoplectica, ex sanguinis e cerebro recursu impedito). DECKART l. c.
- 33) ASTLEY COOPER in *medico-chirurgical transactions*. Vol. I. p. 12. Tab. II. fig. 2.
- 34) HODGSON l. c. p. 155 et 156. Obs. 22.
- 35) PATISON in *the american Recorder*. Philadelph. 1820.

Quandoque aneurysmata *aortae adscendentis* excavant atque destruendo perforant *sternum* et *costas* ³⁶⁾, frangunt *scapulam* ³⁷⁾, incurvantque *claviculam* ³⁸⁾, rarissime tamen erodunt *vertebras dorsales* ³⁹⁾. — Aneurysma *aortae descendens* cum *pulmone* concreescere ⁴⁰⁾, ac disruptum, in
 illius

Vol. 2. N. 2. (Ex compressione nervi recurrentis dolorem scapulae in aneurysmate aortae explicat).

36) ALBERTINI l. c. p. 383. — RURSCH observat. chirurg. p. 37. 38. — SANDIFORT in nov. act. physic. med. nat. cur. T. XVIII. p. 21. — MORAND in *Mém. de l'acad. R. de Paris. a. 1707.* — VERBRUGGE l. c. EHRLHARDT l. c. p. 28. HEISTER l. c. — In miscellaneis variae literaturae Lucae editis (T. 2. p. 184.). Legitur de aneurysmate lateris dextri arcus aortae post magnam vocis et corporis contentionem orto, quod sic protuberabat dextrorsum, ut inter secundam et quartam costam, tertia penitus destructa, ovi anserini magnitudine erumperet. — In museo pathologico Ticinensi bina exempla vidi ossis sterni ab aneurysmate arcus aortae magna ex parte destructi. Et cutis super imposita disrupta erat. Cfr. J. P. FRANK Epitome l. c. p. 40. et hujus operis Part. II. Vol. II. Sect. 1. Cap. VII. §. XXVIII. N. 1. (36. 37.).

37) DUVERNEY l. c.

38) GUATTANIUS v. LAUTH l. c. p. 168.

39) Ejusmodi rarioris casus exemplum affert LAENNEC; aneurysmatis scilicet rami aortae *adscendentis*, pugni magnitudinem quater excedens, cujus moles anteriores partes vertebrae tertiae, quartae et quintae et ipsa nonnihil ligamenta intermedia comprimendo consumsit.

40) LAENNEC l. c. p. 427. — Vidi et ego.

Frank Prax. II. 2. 2.

illius cellulas aereas cruorem effundere ⁴¹⁾ potest. Frequenter istud aneurysma rumpitur in *mediastinum posterius* ⁴²⁾, et in *cavum pleurae sinistrum* ⁴³⁾, rarius in *dextrum* ⁴⁴⁾. Ruptura haec interdum sensim sensimque contingit ⁴⁵⁾. — Ab aneurysmate aortae *descendentis* talis compressio *ductus thoracici* observata est, ut partim destructus, partim vasa omnia lymphatica admodum distensa invenirentur ⁴⁶⁾. Visum est hoc aneurysma in *cavum abdominis* ⁴⁷⁾, inque *ven-*
tricu-

41) LAENNEC l. c.

42) WOLFF in novis actis Petropolitanis. 1789. T. V. —
HODGSON l. c. p. 107.

43) HODGSON l. c. p. 135. Pluries vidi.

44) LAENNEC l. c. Procul dubio, nec me id vidiſſe recordor.

45) BURNS (l. c. p. 292.) ubi saccus aneurysmaticus, inquit, per *parvum hiatus* cum cavitate communi thoracis et mediastino postico communicat, *lentius mors* accidit. Sic MORGAGNI narrat (Epist. XVII. 14.): aneurysmate aortae rupto et sanguine in sinistram pleurae cavitatem profuso, in latiori illic facto hiatus excavatam, tubulosam, polyposam massam depressam esse.

46) LAENNEC in *Journal de médecine, par CORVISART* T. 2. p. 159. — Jam LANCISIUS (Propos. XXII.) invenit in thoracis cavo dextro effusum serum, quod ait, probabiliter fuit lymphæ, quæ sua intra thoracicum ductum libera ab aneurysmatis compressione immissione prohibeatur, et idcirco pulmones lymphatica massa distenderat atque acredine sua eroderat.

47) BONET Sepulchr. anat. Lib. III. Sect. 23. Obs. 35. 40.

triculum ⁴⁸⁾ et *intestinum duodenum* ⁴⁹⁾ depletum. Saepissime vero illud ⁵⁰⁾ *vertebrarum corpora* ⁵¹⁾, illaesi saepius cartilaginibus ⁵²⁾, de-

Y 2

struit

48) NANNONI *trattato di chirurgia. T. 2. Obs. 87.*

49) Cfr. Part. III. Vol. I. Cap. de Haematemasi.

50) Inprimis si aneurysma in parte posteriore aortae locum obtineat.

51) DUVERNEY in *Comment. Petropol. VI. a. 1732. —*

LA FAYE in *Philosophical Transact. N. 287. — LAEN-*

NEC l. c. — KREYSIG l. c. — LAUTH l. c. p. 379. —

EHRLICH *Chirurgische, auf Reisen gemachte Erfahrungen. 1. B. —*

HODGSON l. c. p. 120. — EHRHARDT

l. c. p. 24. 25. — Pluries vidi exempla vertebrarum

tum dorsalium tum lumbalium plus minus ab aneu-

rysmate aortae descendentis destructarum. Haec de-

structio contingitne illa per potestatem sanguinis ossa

solvendi? (VERBRUGGE apud LAUTH l. c. p. 401.

453.) — per attritum undae cruentae? (LAENNEC l.

c.) — per absorptionem massae osseae operâ compres-

sionis a sacco aneurysmatico exercitae? (HUNTER,

SCARPA) — simulque per erosionem periostii in quo

vasa lymphatica, quae succum osseum adducere de-

berent, decurrunt (HODGSON), — per inflammatio-

nem lentam, ut putarem, a sacco aneurysmatico ossi-

bus communicatam? — Destructionem ossium aneu-

rysmatibus contiguorum, adeo a carie diversam, ut

contenditur (HODGSON l. c. p. 120.), haud inveni.

Sic fatetur quoque ROSENMÜLLER (*Anhang zu SCARPA*

über die Pulsudergeschwülste. p. 364.).

52) W. HUNTER *Med. observ. and inquiries. Vol. I. p.*

348. — HODGSON l. c. p. 121. — Caeterum etiam

cartilagines laesas fuisse legitur apud ASMAEN l. c.

aliosque scriptores de aneurysmatibus. p. 595.

struit et excavat. Nec parcat semper *intestino colon*, peritonaeo, musculis psoas et iliaco interno renibusque ⁵³).

§. LXIV.

C a u s s a e.

Praedispo-
nentes.

1. Mares aneurysmati maxime obnoxii sunt. Obvenit vero id pluries quoque inter feminas ⁵⁴). Contrahitur ab iis morbus praecipue tempore graviditatis, partus et puerperii ⁵⁵). Parcat ille ut plurimum infantibus ⁵⁶) et senibus ⁵⁷). Incidit saepissime inter annum trigesimum et quinquagesimum. Disponunt ad aneurysmata, praesertim aortae, vitium haereditarium ⁵⁸), habitus athleticus, plethoricus, opificia quae corporis positionem incurvatam exposcunt ⁵⁹), et febres in-

flamma-

53) MIANOWSKI in *Pamiętnikow Towarzystwa Lekarskiego Wilenskiego*. T. I. Wilno 1818. p. 191.

54) HODGSON (l. c. p. 130.) inter 63 aneurysmata, 56 in maribus et 7 in feminis numerat. Inter meos aegros quarta circiter pars ad sexum sequiorem spectabat.

55) Sic ex permultis observationibus edoctus sum.

56) NANNONI *trattato di chirurgia*. T. 4. p. 111. §. 1730.

57) Vidi quidem senes aneurysmatibus aortae laborantes, sed morbus illos jam a multis annis detinuerat.

58) LANCISI l. c. Lib. II. Propos. 47. p. 74. — MIRCHAEUS in LODER's *Journal f. die Chirurgie*. 2. B. p. 665. — J. P. FRANK Epit. l. c. p. 32.

59) Novem exempla aneurysmatis aortae inter lotrices observavi.

flammatoriae crebro perplexae maleque curatae ⁶⁰).

2. Aneurysmata *excitantur* in genere: a vul-Excitan-
neribus arteriarum ⁶¹), a pure, ichore has ipsas ^{tes}.
erodente ⁶²), ab osse fracto ⁶³), luxato, carioso,
a distentione ⁶⁴), saltu ⁶⁵), contusione, percus-
sione, ligaturâ ⁶⁶), risu ⁶⁷), tussi ⁶⁸), vomitu ⁶⁹),

60) Hae febres, tunicis arteriarum plurimis in locis simul infensae, efficere possunt, ut systema arteriosum plurima etiam aneurysmata uno eodemque tempore exhibeat, quin pro hoc phaenomeno explicando opus sit peculiarem admittere *diathesin aneurysmaticam*.

61) BOHN diss. de phlebotomia culposa. Lips. 1713. — MOLINELLI de aneurysmate a laesa brachii in mittendo sanguinem arteria. Bonon. 1748. — DESLANDES in *Journal de médecine*. T. 3. — *L'art de saigner*. Chap. 20.

62) ABERNETHY l. c. p. 246. — TRAVERS *medico-chirurg. Transact.* Vol. 4. — HODGSON l. c. p. 264.

63) DUVERNEY *Traité des maladies des os*. T. 1. (Ex tibiae fractura).

64) *Mém. de l'acad. R. des sciences de Paris* 1700. hist. p. 50. (Aorta dilatata et arteria subclavia dextra aneurysmatica ob subitam capitis in dextram partem flexionem).

65) HAEN rat. med. T. IV. C. 2. §. 4. (Popliteae). — HODGSON l. c. p. 186.

66) WARNER (*cases of surgery* p. 139.) narrat de serie aneurysmatum in arteria brachiali post amputationem ortarum. Similia habet RURSCH opp. obs. anat. chir. T. I. p. 4.

tu ⁶⁹), et clamore ⁷⁰). *Aneurysmati aortae* an-
sam porrigunt caussae illius arteriae inflamma-
tionem gignentes ⁷¹), praecipue nisus in ponde-
ribus elevandis movendisque ⁷²), sub coitu ⁷³),
partu ⁷⁴), luctatione, gestatione; vehemens
mo-

67) MICHELOTTI l. c.

68) *Mém. de l'acad. R. des sciences de Paris. A. 1733.*
p. 183. (in parte posteriore et anteriore colli). —
MORGAGNI l. c. Epist. XVIII. 25.

69) HAEN l. c. (Carotidis).

70) V. LEEUVEN l. c. p. 13. (Carotidis; asperam arte-
riam comprimendo mortem inferens).

71) Cap. XIV. §. LVI. N. 2.

72) Lotrices praeter frigus in linteis prope flumina la-
vandis susceptum, praeterque portationem illorum
madidorum ad proprias habitationes interdum dissi-
tas, incusabant inprimis vim in torculari, ad lintea
complananda, movendo, adhibitam.

73) Aneurysmata aortae in meretricibus familiaria esse
observationes MORGAGNI (Epist. XXVI. 15.), TESTAE
(l. c. p. 395.) docent. Matrona annos triginta nata,
obesa, arthritica, mihi narravit, quod a. 1817. sub
coitu in paroxysmum orthopnoeae, bihorium perdu-
rante, cum dolore pressorio sub sterno (loco dolente
extus maculâ rubrâ notata), aphoniâ, facie lividâ,
tussiculâ, sputis spumosis cruentis, pulsu in carpo
sinistro vix ullo, inpidit; — quodque similes paro-
xysmi ex eadem causa ac minores ex odore nico-
tianae, dein pluries rediere. A. 1821. quo prima vice
aegrotam vidi, praecipua aneurysmatis aortae de-
texi signa.

74) MICHELOTTI l. c. — Miror ego, non saepius con-
tingere.

motus ⁷⁵), venatio ⁷⁶), cursus ⁷⁷), vectio in curru incommodo super vias rudes ⁷⁸), lapsus ⁷⁹), struma ⁸⁰) aliique tumores ⁸¹), haemorrhagiae habituales

75) BELL *Anatomy of the human body. Vol. 2. — v. auserl. Abhandl. f. prakt. Aerzte. 17. B. p. 527.*

76) Plurima aneurysmata aortae vidi in hominibus venationi addictis, maxime in iis qui caeterum vitam sedentariam ducebant. Concludo hinc quod transistis repentinus a quiete ad motum, evolutioni aneurysmatibus praecordiorum favet.

77) VALCARENGHI l. c. Obs. 1 et 3. — KOROLKO, de quo supra narravi (§. LXII. N. 3 (71. 75.)), traha vehabatur. En equorum unus gressus ultiores recusans. Derelinquit igitur dominus traham, atque equum clamoribus et flagello, pedester per mille et ultra passus prosequitur. Incidit illico in febrem inflammatoriam cum gravi pectoris affectione, relicto aneurysmate arcus aortae, post quatuor annos lethali.

78) Nonnulla aneurysmata aortae in veredariis conspexi. Post vectionem diuturnam et incommodam, ultimis graviditatis mensibus susceptam, eundem observavi morbum.

79) MICHELOTTI l. c. p. 81. — Ex lapsu ab equo ictuque pectori illato aeger, de quo supra (§. LXII. N. 3. (68)), morbum acquisivit, sicque plurimi alii quos curavi.

80) HOPFENGÄRTNER in HUFELAND's *Journal der prakt. Heilkunde* 1817. 6. St. p. 26.

81) „J'ai trouvé une douzaine (de concrétions pierreuses) dans le pancreas d'un homme attaché à un ambassadeur de Venise, lequel étoit mort subitement d'un aneurysme de l'aorte. Le pancréas très tumefié, comprimait si fortement cette artère contre la colonne vertébrale, que la

tuales \ suppressac⁸²⁾, impetigines praepostere fugatae⁸³⁾, potus alcohol et vini⁸⁴⁾, syphilis⁸⁵⁾ et mercurius⁸⁵⁾).

Proxima. 3. *Causa proxima* aneurysmatum quae-
ebatur exclusive in membranarum arterias
constituentium modo *dilatatione*⁸⁷⁾, modo *la-
ceratione et erosione*⁸⁸⁾. Mediam nos inimus
viam et pro re nata unam et alteram ample-
ctimur opinionem⁸⁹⁾, concedendo tamen cum
aliis⁹⁰⁾,

*partie de l'aorte qui étoit pardessus étoit très grosse; son volume étoit augmenté jusqu'au coeur, dont le ven-
tricle gauche étoit très dilaté; la portion de l'aorte, qui étoit au-dessous du pancréas, étoit si rétrécie qu'à peine on pouvoit y introduire le petit doigt.*“ PORTAL
Cours d'anat. médic. T. 5. p. 356.

82) TESTA l. c. p. 73. (Saltem nexus in haemorrhagias habituales et aneurysmata admitti debet).

83) TESTA l. c.

84) Causa frequens aneurysmatis inter homines vulgi in Lithuania.

85) GUATTANI l. c. — MORGAGNI Epist. LVIII. 13. — MONRO in *N. Edinb. Versuche*. 3. B. p. 219.

86) DE HORNE in *Mém. de la soc. R. de méd. a. 1779.* p. 301.

87) FERNELIUS, VESALIUS, FORESTUS, DIMERBROE-
KIUS et maxima veterum medicorum pars.

88) FABRIC. HILDANUS, SENNERT, PALLETTA (v. WEIGEL's *ital. med. Bibl.* 4. B. 1. St. p. 73.), BICHAT (*Anatomie générale appliquée à la physiologie.* Paris 1801. T. 2. p. 282.) et tandem SCARPA (l. c.).

89) Sic et HODGSON (l. c. p. 99.) ubi ait: „Die An-
sicht unzähliger Präparate dieser Krankheit . . . hat

aliis ⁹⁰), aneurysmata aortae per dilatationem rarissima esse ⁹¹).

§. LXV.

D i a g n o s i s.

1. Quae cum ita sint, antiquam divisionem *Divisio.*
aneurysmatis in *verum* ⁹²) (ex dilatatione arteriarum) et in *spurium* ⁹³) (ex laceratione, erosione membranae internae et mediae arteriarum) retinemus. Addimus praeterea *aneurysma mixtum* (dum in aneurysmate vero, ex aliqua parte superficiei

mich fest überzeugt, daß, obwohl in den meisten aneurysmatischen Säcken, besonders in denen, welche einen beträchtlichen Umfang einnahmen, die Häute des Gefäßes zerrissen waren; dennoch verhältnismäßig in einer bedeutenden Anzahl von Fällen das Aneurysma von einer theilweisen Ausdehnung der Arterienhäute ausging.“

— Item BURNS l. c. p. 234. — KREYSIG l. c. 2. Th. p. 380.

90) BURNS (l. c. p. 238.) . . . „ich gestehe, daß unter vierzehn Fällen, wo ich die vorgefundenen Aneurysmen genau untersuchte, der eben von mir erzählte der einzige ist, der SCARPA's Behauptung nicht in jedem Punkte bestätigte.“

91) Duo dumtaxat vidi exempla, ubi tota aorta, sine laesione membranarum internarum, dilatata erat.

92) Vox aneurysmatis a dilatando (ἀπὸ τοῦ ἀνευρύειν) derivata est. Itaque optime exprimit dilatationem arteriae (aneurysma cylindroideum EHRHARDTII l. c.).

93) Status arteriae primo intuitu dilatationem *simulans*, jure *spurium* aneurysma dici potest (aneurysma *saccatum* EHRHARDTII).

ficiei ejus internae disruptae, aut exesae, protuberat aneurysma spurium), *aneurysma varicosum*⁹⁴⁾ (dum instrumentum secans venam perforat et in subjacentem arteriam penetrat, ita ut communicatio directa inter haec vasa locum obtineat, cujusque ope sanguis ex arteria in venam transit, hancque in saccum dilatat) et *aneurysma per anastomosin*⁹⁵⁾.

2. Si

94) Aneurysma hoc descriptum est a SENNERT (l. c.), W. HUNTER (*Medical observ. and inquiries. Vol. I. p. 340. A. 1757. et Vol. II. p. 390. A. 1764.*), GUATTANI (l. c. 1772.), CLEGHORN (*Medic. obs. and inquiries. Vol. III. p. 110.*), B. BELL (*System of surg. Vol. B. p. 199.*), SCARPA (l. c.), SABATIER (*Médecine opératoire. T. I. p. 417.*), RICHÉRAND (*Dict. des sciences médic. art. aneurysme variqueux*), BOYER (*Traité des maladies chirurg. T. 2. p. 177.*), LASSUS (*Médecine opératoire. T. 2. p. 443.*), HODGSON (l. c. p. 511.), ASMANN (l. c.), ADELMANN (l. c.) aliisque. — „Tale aneurysma varicosum seu varicem aneurysmaticam vidi die 28. Maji 1804. in clinico meo Vindobonensi. Occupabat venam medianam cubiti in viro, cui haec vena decem ante hebdomadas a chirurgo, cum subjacente arteria perfossa fuit. Interrogavi aegrotum num sibilum in tumore persentiat? respondit: hoc primum fuisse, ut sibilum strepentem ex tumore proprio auditu percipere potuerit. Vena vero ad duos fere pollices magis tumida erat, nec adeo pulsabat; quam quod quasi filum metallicum sub digitis, toties ac arteria pulsabat, trementem, nunquam vero penitus tremere cessantem, sisteret.“
Ex Schedis Patris mei.

95) Cap. XIV. §. LVI. N. 1 (62).

2. Si chirurgi convenient diagnosin aneu-^{Indicia} rysmatum *externorum* ⁹⁶⁾ interdum arduam esse, ^{aneurys-} propterea quod non semper pulsant ^{matis aor-} ^{tae.} ⁹⁷⁾, ideoque facile cum aliis tumoribus confundi possint; quid medici de diagnosi aneurysmatum *internorum* fateri debebunt? — Nihilominus, aneurysma aortae (paucis exceptis casibus morbi omnino signis suis destituti ⁹⁸⁾), medicum, in doctri-

96) Ait Louis (*Diction. encyclopédique art. aneurysme*): „Les signes qui caractérisent l'aneurysme vrai sont: une tumeur circonscrite, sans changement de couleur, à la peau, accompagnée d'un battement qui répond ordinairement à celui du pouls du malade; dès qu'on comprime la tumeur elle disparoit en totalité ou en partie.“

97) RUXSCH, SIMMONS l. c. — BURNS l. c. p. 289. — J. P. FRANK (l. c. p. 46.) qui ait: „sed facile sub adulto jam aneurysmate, ubi densae, aut polyposa materia infarctae sunt vasis affecti membranae, ubi sacci aneurysmatici fibrae jam omnem, quo stimulo respondeant, irritabilitatem amiserunt, ac tandem ubi cordis jam major subintrat debilitas, pulsatio, ac digito cedens mollities tremoris, disparent.“ — Exemplum aneurysmatis a contusione nati, ac ab empyrico cum morte subsequente aperti, adducit LANCISI, alterumque SWIETEN (*Comment. T. I. p. 288.*). Legi de hoc argumento merentur HAAEN *ratio medend. P. V. C. VI. §. 2. 3.* — SCHMIEDEL *de varietatibus vasorum. Erlang. 1744.* — LUDWIG *de variantibus arteriae brachialis ramis, in aneurysmatis operatione attendendis. Lips. 1767.* — AYMER l. c. p. 5.

98) Aneurysmata aortae a nullo symptomate indicata et ego detexi. Neque id mirum aut in hominibus vulgi

doctrina hujus aegritudinis versatum, aegrumque sat diu observantem, raro aufugere posse, contendimus. Neque id solum de morbo jam pro-
 vecto atque plus minus palpabili, sed etiam de
 incipiente minimisque signis stipato, contendi-
 mus. Aneurysmatis enim aortae praesentiam to-
 tics admittere inclinamus; quoties, praeviis
 caussis evolutioni illius morbi faventibus ⁹⁹⁾,
 quis constanter de capitis sensuumque affectioni-
 bus indicatis ¹⁰⁰⁾, nec non de doloribus circa
 pectus conqueritur; habitus aut volumen corpo-
 ris, sine nota alia ratione, a statu consueto
 deflectunt; respiratio aut circulus sanguinis of-
 fensae sunt, inprimis si pulsus in brachio dextro
 sit debilis et in sinistra fortis (rarius vice versa).
 Prudentis caeterum medici erit, diagnosin aneu-
 rymatis

multum quin querelas edant pati solitis, aut dum
 aneurysma ob molem suam admodum parvam oeco-
 nomiam animalem vix aut ne vix quidem perturbat.
 Sic SCARPA (l. c.) de parvo aneurysmate, ad radi-
 cem aortae, loquitur, quod sine praevio morbo-
 so indicio ruptum est. Sic BURNS (l. c. p. 272.) duo
 mortis subitaneae exempla describit, in quibus exi-
 guus tantum tumor principio aortae adhaerebat. Fa-
 tetur praeterea quandoque et majora aneurysmata oc-
 culta latere (l. c. p. 254.); inprimis dum aneurysma
 ad latus dextrum aortae adscendentis oritur, quo sci-
 licet in casu neque tracheam neque oesophagum com-
 primit. (l. c. p. 256.).

99) §. LXIV.

100) §. LXII. N. 2. (71 — 75).

rysmatis aortae prius non proclamare, quam morbis, cum quibus illud confundi posset, ad trutinam vocatis.

3. Sunt autem hujusmodi morbi pro varia ^{Facilis} aneurysmatis illius *sede*, admodum varii. ^{confusio.} Confundi nempe possunt: 1° *aneurysma aortae ascendentis* cum *aneurysmate arteriae carotidis et subclaviae*, — cum *angore pectoris*, — cum *dilatatione cordis*, — cum *varice ad sinem venae jugularis internae aliisque tumoribus colli*; 2° *aneurysma arcus aortae* cum *phthisi tracheali et pulmonali* cumque *vitiis venae azygae*; 3° *aneurysma aortae descendens thoracicae* etiam cum *phthisi pulmonali* et cum *morbis columnae dorsalis* et 4° *aneurysma aortae descendens abdominalis* cum *morbis columnae lumbalis et renum*; ne dicamus de serie morborum *vitia organica cordis et arteriarum simulantium* ¹⁾.

4. *Aneurysmata ex parte superiore arcus aortae emergentia*, propterea quod sternum et ^{Distinctio ab a. carotidis et art. subclaviae.} claviculae impediunt quominus antea evolvan-
tur, circa collum ascendunt, ideoque ad spectum *aneurysmatum arteriarum carotidum et subclaviarum* exhibent. Illa vero offerunt pulsationem profunde ad aneurysmatis radicem propagatam ²⁾, quae pulsatio in his desideratur.

5. *An-*

1) Cap. XVII.

2) BURNS (l. c. p. 133. et in *Surgical anatomy of the*

Distinctio
ab angore
pectoris.

5. *Angor pectoris.*

- a. Morbus inter annum aetatis quadragesimum et quinquagesimum evolutus.
- b. Derepente invadit.
- c. Libera intervalla, saltem incipiente morbo, observantur.
- d. Pulsatio in pectore haud communis.
- e. Vix unquam morbos tracheae et pulmonum simulat.
- f. Dolor brachii sinistri sat constans.
- g. Maxime in arthriticis obvenit.

Aneurysma aortae.

- a. Morbus saepe inter annum aetatis trigesimum et quadragesimum evolutus.
- b. Lente evolvitur.
- c. Passio continua est, etiamsi per paroxysmos invalescat.
- d. Pulsatio in pectore communissima.
- e. Saepe morbos tracheae et pulmonum simulat.
- f. Dolor brachii sinistri haud constans; potius dolores vagi in ambabus extremitatibus, fixusque dolor inter scapulas obveniunt.
- g. Arthriticos aequè ac sanissimos caeterum homines aggreditur.

6. *Di-*

head and neck p. 32.) narrat casus aneurysmatum aortae, tam alte in collo observatorum, ut inter saccum aneurysmaticum et sternum amplum spatium relinqueretur.

6. <i>Dilatatio cordis.</i>	<i>Aneurysma aortae.</i>	Distinctio
a. Cordis ipsius pulsatio.	a. Pulsatio in pectore.	a dilatatione cordis.
b. Pulsatio cordis limites designans.	b. Pulsatio cordis situ et ambitu raro respondet.	
c. Sensus vix afficiuntur, nisi appropinquante lipothymia.	c. Sensorium commune, visus, auditus, saepe a primo morbi initio perturbantur.	

Caeterum ambo morbi inter se invicem *complicationem* inire possunt ³⁾.

7. *Varix ad finem venae jugularis internae* Distinctio
tumorem super sternum exhibet, non pulsantem, ^{a varice jugularis.}
sed motum tremulum habentem. Praeterea ille tumor sub compressione plane evanescit, quod in aneurysmate aortae, adeo provecto ut extra thoracis limites ascenderet, contingere haud posset. Tandem varix ille conditionem morbosam totius venae jugularis sociam agnoscere solet ⁴⁾.

8. Possunt denique *tumores* qualescunque Distinctio
super sternum et claviculas, a subjacentibus ar- ^{ab aliis colli tumo-}
teriis ita elevari ac si ipsi pulsarent ⁵⁾. Possunt moribus.
etiam hujusmodi tumores per compressionem
arteriarum subjacentium, dyspnoeam, dysphagiam

3) BURNS l. c. p. 284. — KREXSIO l. c. 2. Th. p. 497.

4) BURNS l. c. p. 297.

5) Immo, glandula super arteriam jacens, fortio-
rem quam ipsa arteria efficit pulsationem. BURNS l. c.
p. 295.

giām et pulsum irregularem gignere *). Verum tumor super arteriam jacens, sub systole et diastole arteriae solum elevatur et cadit, non auge-
tur et tenditur in toto ambitu, non imminuitur
et mollior fit uti aneurysma. Porro tumor super
arteriam positus, dum manu extrorsum trahitur,
pulsare cessat; in aneurysmate vero sub tali tra-
ctione nulla contingit mutatio.

Distinctio
a phthisi
tracheali.

9. Quamvis ipsi quondam erroris *anēurysma
abortae* cum *phthisi tracheali* confundendi parti-
cipes redditi fuerimus 6), et quamvis alii medici
contra-

*) Burns l. c. p. 294.

6) Mense Majo 1820. ad dominum R. . . ., virum tri-
ginta annorum, festinanter in consilium vocatus sum.
Inveni aegrum, mihi prius haud notum, suffocationi
proximum. Maxime ille erat anxius: facies extremi-
tatesque livore insigniebantur. Tussis urgebat clan-
gosa uti in croup, sputa rejiciebantur pauca, puri-
formia cum multa saliva. Respiratio erat sibilosa.
Pulsus tangebatur regularis, parvus, contractus, in
utrisque manibus par. Aeger aphonus manus con-
tinuo inferiori tracheae parti admovebat. Cacterum
nullum locum dolentem indicabat. Deglutire neuti-
quam poterat. Cubare quocunque modo vellet non
prohibebatur, quamvis libentius paulo erectior jace-
bat. Motus cordis haud insolitus erat, sed vibrabant
insigniter carotides, oscillabantque jugulares. Medi-
cus ordinarius aegroti mihi narravit, aegrum ab
adolescencia libidini et ebrietati se dedisse, syphi-
lide pluries infectum sed nunquam perfecte sanatum
fuisse, modo muneris, quo fungebatur, necessitate,
nimis diu sedere coactum, modo vacantem officio vena-

contrarium prorsus errorem commiserint⁷⁾, — at-
tamen vix confusionem istiusmodi morborum
amplius

tioni intentus corpus vehementius agitare solitum
esse, quodam die Januarii 1820. taphia plus quam
solitus erat calefactum venatum ivisse, unde redux
defatigatus, tussire, raucitatem experiri, dolorem su-
periore in parte sterni, ac dyspnoeam, praecipue
sub ascensu scalarum pati coepit, hisce omnibus
neglectis ac plures per menses nulla cura adhibita,
mala sensim invaluisse, donec hesternae die in sta-
tum praesentem incidisset. Putavi aegrum laborasse
phthisi tracheali, cui nunc *croup* supervenerat. A
venae sectione, hirudinibus, calomel et digitali, mala
mitigata sunt, ast duabus inde elapsis hebdomadis
audivi aegrum a novo paroxysmo correptum fuisse,
qui paroxysmus iterum profligatur tertia autem vice
rediturus, sub summis angustiis, capite supino,
collo protracto, oculis micantibus, ex orbitisque pro-
trusis, brachiis vigentibus anteriora versus extensis,
manu conglobata, ore aperto, vitae finem imposuit.
Secto cadavere aneurysma spurium arcus aortae de-
tlexerunt. Saccus aneurysmaticus, magnitudinis ovi
gallinacei, parieti anteriori tracheae accretus erat. Car-
tilagines annulares tracheae penultimae quinque emol-
litae et a tumore ad faciem usque posteriorem arteriae
asperae propulsae conspiciebantur. Interna superficies
tracheae in loco sacco aneurysmatico respondente vio-
laceum colorem habebat. Aneurysma simul nervum
recurrentem lateris sinistri comprimebat. Cor et pul-
mones sani.

7) BAYLE, MOUTARD alique phthisin trachealem pro
aneurysmate aortae habuerant. v. CAYOL *Recherches*
sur la phthisie trachiale. Paris 1810.

Frank Prax. II. 2. 2.

Z

amplius expectandam esse existimamus, dummodo diagnosis non ex solis symptomatibus provectoris morbi⁸⁾, sed simul, et maxime quidem, ex initio et ex curriculo aegritudinis instituat.

Distinctio
a phthisi
pulmonali.

10. Longe autem difficilior est distinctio *aneurysmatis aortae a phthisi pulmonali*. Videmus enim illum morbum, macie corporis, febriculâ hecticâ, tussi, haemoptoe, sputis copiosissimis puriformibus⁹⁾, decubitu denegato, verbo omnibus phthiseos pulmonalis symptomatibus insignitum. Ast diversum plane erat morbi initium et

8) Utrum trachea ab externo tumore, utrum ab interno ulcere irritetur; signa hujus irritationis sat similia sunt, vixque signum diagnosticum, quod unum ab altero statu distingueret, expectandum est. Hujus rei memores sunt lectores operis clar. SACHSE: *Beytrag z. genauen Kenntniss u. Unterscheidung d. Kehlkopfs - und Luftröhrenschwindsucht*. Hannov. 1821.. (Etiam sub titulo singulari: *Ideen z. Diagnostik, angefangen v. ERNST WICHMANN, fortgesetzt v. WILH. SACHSE*). Quodsi hoc opus, dum tractatum meum de phthisi tracheali conscripseram, cognovissem; dixissem: cl. auctorem distinctionem inter phthisin laryngeam et phthisin trachealem nimis magni fecisse, — illum potius ulcera syphilitica asperae arteriae, quam veram phthisin descripsisse, — sternutationem neutiquam ad symptomata essentialia phthiseos laryngeae spectare etc.

9) Erravit sane HODGSON (l. c. p. 136.) ubi contendit, aneurysmata aortae descendentes dumtaxat sputis tenuibus et spumosis insigniri.

et curriculum. Paroxysmi enim suffocationis, cum interjectis intervallis plus minusve liberis, quales rarissime in phthisi pulmonali (nisi admodum provecta) observari solent, aneurysmatis aortae suspicionem, a sectionibus cadaverum confirmatam, sustinebant ¹⁰⁾.

Z 2

11. Plus

10) *Observatio I.* (Ex opere: *Dziennik medycyny, chirurgii, i Farmacyi. Wilno. p. 77. Postrzezenie przez doktora MIANOWSKIEGO*). Vir quinquaginta annorum, literis incumbens, simulque liquoribus fermentatis haud parcens, a juventute affectionibus rheumaticis obnoxius, pulsum a temporibus immemorabilibus in utroque carpo admodum irregularem exhibuit. A nonnullis porro annis de pectoris dolore ad scapulam sinistram extenso conquerebatur. Quibus malis mense Octobri a. 1820. tussis, notis catarrhalibus insignita, ast consuetis auxiliis rebellis, supervenit. Die 14. Novembris, dum juxta consuetudinem alvum deposuerat, a respirationis summa difficultate, sudorem eliciente, ac per quartam horae partem perdurante, correptus est. Rediit similis paroxysmus postridie sub eadem rerum positione, ac dein toties quoties vel alvum, vel urinam deponeret, vel gressus in cubiculo institueret, vel sederet. Enim vero decubitus dumtaxat supinus concessus erat. Paroxysmi, quo crebrius redibant eo longiores, ad horam scilicet protracti, eoque fortiores erant, videlicet cum corporis livore, sudore frigido, aphonia, suspensione functionum animi, praecipue memoriae et inspiratione adeo sonora, ut ea in tertio cubiculo audiri potuerit. Sub tali paroxysmo pulsus regularis evadebat, ast interdum adeo parvus et frequens ut aeger in agone constitutus videretur. Tussis versus finem pa-

Distinctio
a vitiis ve-
nae azygae.

11. Plus vice simplici ibi primo intuitu
aneu-

roxysmi comparebat, item ructus copiosi. Sub illa nonnunquam tantam *materiae puriformis* copiam rejiciebat, ut tres quatuor disci replerentur. Nemo hinc medicorum dubitabat, praeter aneurysma aortae et phthisin pulmonalem adesse. Verum demortuo aegro die 8. Decembris, sectoque cadavere, pulmones sine vomica, sine tuberculis, et, si excipias quandam illorum cum pleura et diaphragmate adhaesionem, plane normales detecti sunt. Et cor erat rite constitutum. Arcus vero aortae aneurysma trium pollicum amplitudinis exhibuit. *Observatio II.* PASEAWSKI de quo supra mentionem injeci (§. LXII. N. 3 (68)) mense Majo 1820, consilium meum expetendi gratia Vilnam petiit. Conquerebatur dumtaxat de ciborum desiderio deleto, et de agrypnia. Habitus cachecticus, lienosus, graviorem morbum indicabat. Nihilominus, praeter allata mala, nil nisi quandam hypochondrii dextrictionem, detegere potueram. Aegro parum post abituro, interea usum seri lactis cum succo herbae urticae proposui. Rediit ipse post duos menses, morbo potius aucto quam imminuto. Conquerebatur nempe de dolore columnae vertebralis inter scapulas, de pulsatione interna regionis epigastricae (a me non percipienda) et de impotentia gressus versus ventum institucndi. Circa causas morbi sedulo inquirens, aegrum quondam cum equo humum cedissee, pectus allidisse, saepiusque affectionibus rheumaticis obnoxium fuisse, expiscatus sum. De aneurysmate aortae nunc suscipionem alendo, ad diagnosin confirmandam, aegroto proposui ut Vilnae maneret utque simul aliorum medicorum consilium audiret. Promisit se post sex hebdomadas rediturum fore. — Rediit valde

aneurysma arteriae aortae suspicati sumus, ubi tamen, re propius perspecta, nil nisi affectionem haemorrhoidalem deteximus. Nonne hac sub rerum positione *vitium venae azygae* accusandum erat? Hac saltem in vena saepe caussae, quae reditum sanguinis ad cor impediunt, locatae sunt ¹¹⁾).

12. Do-

emaciatus, cum febricula pomeridiana, sudoribus nocturnis, tussi, sputis permultis, puriformibus, interdum sanguine tinctis, decubitu in latera vix concesso (malebat sedere). Aeger adhuc de sensu pulsationis internae, ex regione epigastrica ad pectus propagatae, querelas agebat; ast thorace denudato et scrupulose exanimato, nullum pulsationis vestigium detegere poteram. Pulsus a debito rhythmico haud recedebat. — Convocatis et aliis medicis in consilium, morbus pro phthisi pulmonali conclamata declaratus est, cui sententiae et ego subscripsi. Ast cum dein aegrum adhuc per duos menses observassem, ac paroxysmos veluti suffocationis, subsequente iterum levamine conspicuo, vidissem, plusquam unquam suspicio, de aneurysmate aortae, pulmonibus vim inferente, recruduit. Demortuo mense Januario 1821. aegro, familiam ejus, ut sectio cadaveris concederetur, enixe, et, ut ita dicam, genubus flexis, rogavi. Mirabatur alter medicorum, quod aperitionem corporis phthisici tanti facerem momenti. Miratus vero est magis adhuc, cum per cadaveris sectionem palam fieret, pulmones sanissimos fuisse, sed aortam descendentem aneurysma spurium magnitudinis pugni exhibuisse.

11) TESTA Op. c. p. 56. Cfr. quae de vena azyga in

Distinctio a morbis columnae vertebralis et renum. 12. Dolor, quem aneurysma aortae descendens circa columnam vertebralem excitare solet, ut sedes morbi hic quaeratur, malumque pro *rhachialgia* ¹²⁾, aut pro *lumbagine* ¹³⁾, declaretur, efficere potest. Nec desiderantur exempla confusionis aneurysmatis aortae descendens cum *morbis renum* ¹⁴⁾. Errores huiusmodi dumtaxat per diuturnam aegrorum observationem, habitaque ratione partium ex columna vertebrali nervos accipientium et lotii conditionis, evitari queunt.

Monitum. 13. Sicuti morbis organicis cordis interdum *inflammatio* ejusdem visceris superaccedit, ita et *aneurysmati aortae*. Vidimus saltem aegros hoc morbo detentos, qui derepente in febrem inflammatoriam incidebant, qua vigente symptomata aneurysmatis decuplo augebantur, donec venae sectio turbas debellaret, morbumque ad pristinum statum reduceret ¹⁵⁾.

§. LXVI.

P. II. Vol. I. Sect. 2. Cap. I. §. III. N. 2. et passim in curriculo hujus libri monui.

12) Suspico me hunc errorem in historia morbi in P. II. Vol. I. Sect. 1. Cap. II. §. VII. (89) tradita, commisisse.

13) SANDIFORT junior, *arteriam iliacam internam* aneurysmate detentam invenit. Aeger de maximis lumborum doloribus conquestus erat, qui pro effectu *ischiadis nervosae* habebantur. (Tabul. anatom. Lugd. Bat. 1801. Fasc. I. Tab. I. et II.).

14) KRÆRSIO op. c. 3. Th. p. 176.

15) Tale memorabile exemplum in viro clinici Vilnens.

§. LXVI.

P r o g n o s i s.

1. Aneurysma a natura sanari potest: 1^o ope ^{Sanatio} separationis tumoris per gangraenam, ortam a ^{spontanea.} distentione et inflammatione partis affectae ¹⁶); 2^o ope obliterationis portionis superioris et inferioris arteriae cum tumore communicantis, per fortuitam compressionem externam ¹⁷); — et 3^o ope depositionis fibrinae sanguinis in saccum aneurysmaticum et in arteriam ad illum ducentem, per obliterationem internam ¹⁸); quibus

singu-

mense Martio 1823. habui. Vidi aliud eodem tempore in praxi mea privata, scilicet viri viginti octo annorum, qui mihi jam a duobus annis de aneurysmate aortae suspectus erat, qui vero supervenientibus morbillis, cuncta morbi illius chronici signa tam clare exhibuit, ut suspicio aneurysmatis fere in certitudinem mutata sit.

16) SEVERINUS de abscessuum recondita natura. p. 173.

Edit. Francf. 1643. — WISEMAN in *chirurgic. Treat.* p. 73. — WILSON in *Transact. of a society for improvement of med. Knowl.* Vol. 2. p. 268. — HODGSON l. c. p. 147. Obs. 19. (in arteria iliaca). Obs. 20. (in arteria poplitea).

17) EVERARD HOME in *Transact. of a society for improvement of med. Knowl.* Vol. I. p. 139. — SCARPA op. c. über Pulsadergeschwülste p. 136. HODGSON l. c. p. 151. Obs. 2. (in arteria femorali, aegro tamen demortuo).

18) DESAULT in *Journal de méd.* T. LXXI. p. 430. (in poplitea), — PETIT in *Mém. de l'acad. R. des scien-*

singulis in casibus arteriae collaterales, dilatatae per anastomosin, vices arteriae, aneurysmate tentae, agunt¹⁹⁾. Eodem pacto natura succurrit, dum arteriae aut a tumoribus externis comprimuntur²⁰⁾, aut angustatae sunt²¹⁾, aut oblitteratae²²⁾.

2. Aneu-

ces de Paris. a. 1765. (in carotide dextra); — BAILLIE *Trans. of a societ. for improvement of med. Knowl. Vol. I. p. 119.* (in carotide dextra); — FORD in *Lond. med. Journ. Vol. 9.* (in poplitea); — FOUBERT *Mém. de l'acad. R. de chirurgie. T. II. p. 535.*; — SAVIARD *Journal des sçavans. a. 1691.*; — GUATTANI l. c. hist. 4. p. 16. Tab I. fig. 2. (in poplitea); — HODGSON l. c. p. 162. Obs. 23—26.; — FREER *Obs. on aneurysm. p. 107.*; — PELLETAN *clinique chirurgicale. T. I. p. 115.*; — ABERNETHY *Surgic. obs. on aneurysm. p. 252.*

19) De hoc argumento et cura aneurysmatum per ligaturam lege: JONES *on haemorrhage. Chap. 4. Sect. 1. Exper. 11. 12. 14.* — ASTLEY COOPER l. c. — WHITE *Cases in surgery. p. 139. Tab. 7.* — PELLETAN l. c. p. 127. — SCARPA l. c. — HODGSON l. c. p. 286.

20) STENZEL de steatomatibus aortae. Vitemb. 1723. (Quamvis duo steatomata aortam sub arcu ita compri-
muerint ut lumen illius arteriae fere evanuerit; attamen aeger adspectum hominis sani prae se ferebat).

21) MECKEL in *Mém. de l'acad. R. de Berlin 1756. Obs. 17. 18.* (Angustatio maxima aortae sub arcu, quin signa adfuissent, quod viscera abdominalia debita sanguinis copiâ orbata sint). Cfr. STOERK *Ann. med. II. p. 171.*

22) SEVERINUS l. c. p. 280. — PORIS v. DESAULT

2. Aneurysmata *externa* haud raro artis ope ^{Sanatio artificia-} sanationem admittunt ^{lis.} ²³⁾. De sanatione aneurysmatum *internorum* solum suspicari licet. Praeterea memores esse juvabit, posse illorum symptomata ita intermittere ²⁴⁾, aut formam mutare ²⁵⁾, ut habeantur pro sanatis. Caeterum longaevitati ipsum aortae aneurysma non semper obstat, imprimis si per debitum regimen debitamque curam progressibus morbi frenum injiciatur ²⁶⁾.

3. Aneurysmata saepius rumpuntur, in par- ^{Ruptura.} tibus internis, lethali cum eventu. Ruptura aneurysmatis aortae per loca indicata ²⁷⁾ contingit, modo sponte, deambulando ²⁸⁾, inter pocula et ^{jocos} ²⁹⁾,

Journ. de chir. T. 2. p. 107. — HODGSON l. c. p. 300. et p. 156. Obs. 22. p. 170. Obs. 26.

23) Legi meretur enumeratio aegrorum ab ASTLEY COOPER sanatorum apud BURNS l. c. p. 263.

24) LOMBARDINI l. c. p. 75.

25) Aneurysma aortae, dum crescit, sedem quodammodo mutat, mutantur itaque et symptomata a compressione partium vicinarum orta. Cfr. HODGSON l. c. p. 169. Obs. 25.

26) Divites vitam commodam ducentes longe diutius quam pauperes, ad graves labores damnati, aneurysmata aortae sustinent. Cfr. BURNS p. 286.

27) §. LXIII. N. 2 (26—49).

28) Plurima exempla hominum ex ruptura aneurysmatum aortae in plateis demortuorum Ticini, Viennae et Vilnae collegi. Vulgus illos ex apoplexia periisse credebatur.

jocos ²⁹⁾, sub graviditate ³⁰⁾, noctu ³¹⁾; modo sub nisu in alvo deponenda, ponderibus elevandis, maxime autem sub coitu ³²⁾. Nisi aeger extemplo moriatur ³³⁾, interitum angustiae summae, ad horam unam alteramve protractae, praecedunt ³⁴⁾.

Alii inter-
itus mo-
di.

4. Aneurysmata aortae nisi per rupturam vitae finem imponant, interficiunt aegros per suffocationem ³⁵⁾, apoplexiam ³⁶⁾, convulsiones, paraly-

29) MATANUS l. c. — BURNS l. c. p. 272.

30) BURNS l. c. p. 273 — 276.

31) MORGAGNI Epist. XVIII. 17.

32) MORGAGNI Epist. XXVI. 13. — BICHAT l. c. p. 341.

33) Frequentissime inopinate ii moriuntur, quibus sacculus aneurysmaticus in pericardium rumpitur (BURNS l. c. p. 272.).

34) Desperabunda sese jactabat et volutabat aegra per unius horae curriculum, in qua Vilnae 1819 aneurysma aortae ascendentis inveni. Maximae angustiae obveniunt quo propius cordi aneurysma aortae est (BURNS l. c. p. 281.). Aegra BURNS sensum frigoris et ligaturae circa cor experiebatur (l. c. p. 255.).

35) BURNS l. c. p. 292. (ex compressione tracheae) et p. 272., ubi ait: „Es ist jedoch, wie ich in zwey Fällen gesehen habe, nicht immer nöthig, daß die Geschwulst zerreiße, damit der Tod augenblicklich folge.“ Cfr. CAILLOT l. c.

36) Vertiginosas et apoplecticas affectiones in cordis et praecordiorum vitiis haud esse insolitas jam ALBERTINUS (l. c. p. 385.) animadvertit.

paralysin³⁷⁾, gangraenam³⁸⁾, hydropem³⁹⁾, tussim⁴⁰⁾, vix autem per dolores⁴¹⁾ et debilitatem⁴²⁾.

5. Quamvis paroxysmi, quibus aegroti aneurysmate aortae laborantes subjici solent, vix unquam sine mortis periculo obveniant, attamen illis interdum quid bonitribuendum est. Vidi-mus saltem aegrotos hujusmodi, qui, dum diu solitos paroxysmos perpessi non erant, parum urinae reddebant ideoque periculum hydropis incurrebant, qui vero, perpesso iterum paroxysmo, de novo mingere incipiebant.

§. LXVII.

37) BOERHAAVE *Patholog. Betracht. d. Herzens* l. c.

38) LAUTH l. c. praefat. p. XV.

39) De hydropo aneurysmatis praecordiorum socio pulchre loquitur ALBERTINI l. c. p. 304. Saepe illum observavi.

40) A. 1820. ad sacerdotem quinquaginta circiter annorum vocatus sum. Inveni illum diuturnâ obstructione hepatis, symptomatibus vix dubiis aneurysmatis aortae, et febre catarrhali nuper acquisitâ, laborantem. Morbis chronicis pacem nunc concedendo, dumtaxat curam morbi acuti incepti, non neglecta, cum aeger fuerit robustus et floridus, venae sectione. Redux postridie lectum vacuum inveni. Quaesivi a fratre; ubi nam est aeger? Respondit polonice *nie ma* (deest). Credidi illum ad alvum deponendam exiisse. Ast minime. Mortuus erat sub *tussis insultu*. Sectio cadaveris non fuit concessa.

41) LAUTH l. c.

42) LAUTH l. c.

§. LXVII.

C u r a.

A. externi. 1. Curam aneurysmatis *externi* chirurgis relinquimus cum monitu, ne parti affectae prius manum admoveant, quam sese certiores reddiderant, simul aneurysma aliquod internum non latere ⁴³⁾).

A. interni. 2. In aneurysmate *interno* praecipue *aortae* curando, scopo ulteriorem morbi evolutionem praepediendi, passiones aegrorum imminuendi atque vitam protrahendi, praecepta a HIPPOCRATE ⁴⁴⁾, VALSALVA ⁴⁵⁾, ALBERTINI ⁴⁶⁾, LANCISI ⁴⁷⁾, GUATTANI ⁴⁸⁾, indicata, a SABBATIER ⁴⁹⁾, et PELLETAN ⁵⁰⁾ confirmata, et a HODGSON ⁵¹⁾ aliisque

43) *Lond. med. Review* Vol. 2. p. 420. et BURNS l. c. p. 261. (Memorabilis ASTLEYI COOPERI casus exponitur, utpote qui vix operationem aneurysmatis arteriae popliteae inceperat, cum aeger jam sub cultri applicatione obierit. Secto cadavere, aneurysma quoque aortae, in pericardium disruptum, detegebatur, cujus signa alia praegressa non erant, praeter pondus in regione epigastrica post pastum et dyspnoea gressus instituendo). Cfr. HODGSON l. c. p. 329.

44) De morbis. Lib. I. C. 10.

45) MORGAGNI Epist. XVIII. 30. 31.

46) l. c.

47) Op. c. Lib. II. Cap. 21. Propos. 24. 27. 33.

48) l. c. p. 107.

49) *Médecine opératoire. T. I.* p. 364.

50) l. c.

51) l. c. p. 190.

que locupletata, sequimur. Loquimur 1^o de debito *regimine diaetetico* ⁵²⁾ victu scilicet tenui, potu aqueo, nisi tussis obstet, frigido ⁵³⁾, quiete corporis et animi summa; — 2^o de *venae sectionibus*, quas semel bisve de mense ad uncias tres aut quatuor ⁵⁴⁾ e brachio sinistro ⁵⁵⁾, nisi ingruens hydrops inde augeatur, instituimus; 3^o de *nitrate potassae* cum *emulsione ex seminibus hyoscyami nigri* parata; — 4^o de *foliis digitalis purpu-*

52) Cap. XI. §. XLV. N. 2.

53) A *glacie condita* aegri magnum levamen experiri solent, imprimis si deglutitio impedita sit. *Glacies* et extus super aneurysma imponebatur (GUÉRIN in *Recueil de la soc. de santé à Paris. N. 3.*); ast vehementes ex eo oriri solent dolores testante HODGSON l. c. p. 213.

54) Suadent quidem VALSALVA, PELLETAN aliique venae sectiones adeo copiosas et repetitas, ut aeger vix amplius vires ad brachium in lecto elevandum necessarias retineat; ast cum maluerim potius aneurysma, quam meam medendi methodum, pro mortis causa agnoscere, nunquam talia tentamina institui. Nec commendant illa MORGAGNI Epist. XVII. 32. — TESTA op. c. p. 74. 76. — HODGSON l. c. p. 209. — Venae sectione amplius non indicatâ *hirudines* thoraci admoveri possunt; *nunquam* vero *cucurbitulae scarificantes* quippe quae periculosam efficere possent revulsionem.

55) Expertus sum quod talis phlebotomia longe plus levaminis afferre soleat, quam si sanguis ex brachio dextro aut ex pedibus mitteretur.

purpureae ⁵⁶⁾; — 5° de *alumine* ⁵⁷⁾ et *elixirio*
acido HALLERI (nisi tussis id vetat); 6° de *aqua*
pruni laurocerasi (praecipue sub paroxysmo); —
 7° de *saccharo saturni* ⁵⁸⁾, et 8° de *fonticulis*
 (si arthritis aut impetigo fugata lateant). Ne
 aeger solus derelinquatur, curandum. Curandum
 quoque ut hydropis ingressus, quoadusque fieri
 licet, impediatur ⁵⁹⁾.

CAPUT

56) HODGSON (l. c. p. 210.) etiam adhibet, interpositis
 tamen intervallis.

57) *Serum lactis aluminosum* praescribitur a KREYSIG v.
 not. ad opus HODGSON l. c. p. 212. Antepono for-
 mam pulveris aluminis, cum serum lactis saepe flatu
 aliunde molestos adaugeat.

58) A grano uno ad grano duo de die. Non sine leva-
 mine, illi a digitali producto sal simile, adhibeo.

59) Cap. XI. §. XLV. 8.

CAPUT XVII.

*De motibus cordis et arteriarum, vitia
illarum partium organica simulan-
tibus.*

§ LXVIII.

Introductio. Definitiones. Literatura.

1. **Q**uemadmodum vitia organica cordis ^{Introduc-} et arteriarum sine partium illarum motibus ab-^{cio.} normibus exstare possunt, sic hi motus sine illis vitiis.

2. Loquimur praesertim de cordis et arte- ^{Definitio-} riarum *morbosa pulsatione* ^{nes.} ¹⁾ (impetuosa scilicet et molesta systole et diastole), *palpitatione* ²⁾ (motu videlicet irregulari et interrupto) et *tremore* (trepidatione nimirum systolen et diastolen imperfecte simulante).

3. Quibus in vitiis describendis insudarunt ^{Literatu-} ^{ra.} GALENUS ³⁾, LOWERUS ⁴⁾, MAYOWIUS ⁵⁾, WILLI-
SIUS ⁶⁾,

1) KREYSIG l. c. 1. Th. p. 280.

2) Cardiopalmus SWEDIAUERI a Gr. Καρδία, cor, et Παλμός palpitatio.

3) De loc. affect. Lib. V. C. 2.

4) Tractatus de corde. p. 132.

5) De motu musculorum. p. 95.

SIUS ⁶⁾, VILLANOVA ⁷⁾, LANGIUS ⁸⁾, CALANI ⁹⁾, FREYTAGIUS ¹⁰⁾, SANCHEZIUS ¹¹⁾, STYMMELIUS ¹²⁾, SCHILLINGIUS ¹³⁾, PISSINIUS ¹⁴⁾, RUSIUS ¹⁵⁾, PFENDLERUS ¹⁶⁾, SENNERTUS ¹⁷⁾, CROCIUS ¹⁸⁾, NICOLAVIUS ¹⁹⁾, SCHLEGELIUS ²⁰⁾, BERGENUS ²¹⁾, WALTERUS ²²⁾, CONRINGIUS ²³⁾, METZGERUS ²⁴⁾, FRIEDIUS ²⁵⁾, SEBIZIUS ²⁶⁾, BULGETIUS ²⁷⁾, SCHENKIUS ²⁸⁾,

6) Pharm. Rat. P. I. p. 260.

7) Opp. Tract. de tremore cordis.

8) Opp. Epist. L. I. N. 22. L. III. N. 2. Diss. de palpitatione cordis.

9) Commentarius in Galenum de cordis tremore. Lugd. Bat. 1538.

10) Diss. de palpitatione cordis. Bas. 1585.

11) De palpitatione cordis. Hispal. 1594.

12) Diss. de palpitatione cordis. Fr. 1596.

13) De cordis palpitatione cognoscenda et curanda. L. II. Fr. 1609.

14) Diss. περί τοῦ τῆς καρδίας παλμοῦ. Basil. 1598.

15) Diss. de palpitatione cordis. Basil. 1609.

16) Diss. de cordis palpitatione. Basil. 1616.

17) Diss. de cordis palpitatione. Witteb. 1618.

18) Quaest. med. de palpitationis cordis natura et curatione. Marb. 1622.

19) Diss. de palpitatione cordis. Lugd. Bat. 1622.

20) Diss. de palpitatione cordis. Jen. 1639.

21) Diss. de palpitatione cordis. Francof. 1640.

22) Diss. de palpitatione cordis. Lugd. Bat. 1642.

23) Diss. de palpitatione cordis. Helmst. 1643.

24) Diss. de palpitatione cordis. Argent. 1651.

25) Diss. de cordis palpitatione. Argent. 1710.

26) Diss. de palpitatione cordis. Argent. 1657.

27) De affectionibus cordis. Patav. 1657.

KIUS ²⁸), BISCOPIUS ²⁹), LOUVAINUS ³⁰), SYLVIUS ³¹),
 CRAUSIUS ³²), WEDELIUS ³³), AYRERUS ³⁴), AM-
 MANNUS ³⁵), CAMERARIUS ³⁶), LEICHNERUS ³⁷),
 TACKIUS ³⁸), FELSUS ³⁹), ZANDERUS ⁴⁰), TRYO-
 NUS ⁴¹), CAMUTIUS ⁴²), RIVINUS ⁴³), BUGELLAUS ⁴⁴),
 HOFFMANNUS ⁴⁵), DE LILLIUS ⁴⁶), MILLIERUS ⁴⁷),
 HERDLANUS ⁴⁸), DUNCANUS ⁴⁹), HERINGIUS ⁵⁰),

SCHMIDT-

28) Diss. de palpitatione cordis. Jenae 1662.

29) Diss. de motu cordis et palpitatione ejus. Lugd:
 Bat. 1662.

30) Diss. de palpitatione cordis. Leid. 1616.

31) Diss. de palpitatione cordis. Leid. 1667.

32) Diss. de palpitatione cordis. Jen. 1672.

33) Diss. Aeger palpitatione cordis laborans. Jen. 1674:

34) Diss. de palpitatione cordis. Altd. 1678.

35) Diss. de palpitatione cordis. Lips. 1680.

36) Diss. de palpitatione cordis. Tub. 1681.

37) Diss. de cordis palpitatione. Erf. 1686.

38) Diss. juvenis palpitatione cordis laborans. Gieß:
 1687.

39) Diss. de palpitatione cordis. Basil. 1694.

40) Diss. de palpitatione cordis. Leid. 1694.

41) Diss. de palpitatione cordis. Ultr. 1695.

42) Excussio brevis praecipui morbi, nempe cordis pal-
 pitationis.

43) Diss. de cordis palpitatione. Lips. 1710.

44) Diss. Theses medicae de palmo. Praegae 1710:

45) Diss. de palpitatione cordis. Hal. 1719.

46) Tr. de palpitatione cordis. Zwollae 1755.

47) Diss. de palpitatione cordis. Lugd. Bat. 1756:

48) Dissertat. de palpit. cordis. Edinb. 1800.

49) Diss. de palpitatione. Edinb. 1803.

50) Diss. de palpitatione cordis. Viteb. 1806.

SCHMIDTMÜLLERUS ⁵¹⁾, WOLFFIUS ⁵²⁾, LAENNECIUS ⁵³⁾ et LOCOCKIUS ^{*)}. De morbis autem cordis et arteriarum vitia organica simulantibus speciatim HUFELAND ^{**)} et MUHRBECK ^{***)} disse-
runt.

§. LXIX.

*Symptomata. Autopsiae cadaverum.*Sympto-
mata.

1. Imminentes pulsationes, palpitationes et tremores cordis saepius subita pulsus mutatio, insolita et repentina spirandi difficultas, summa praecordiorum anxietas, obnubilatio capitis et sensuum praecedunt; nec non quandoque auram quandam ex inferioribus ad cordis regionem adscendentem ipsi aegri sentiunt. Verum et per saepe motus illi vitii cordis nullo praecedente indicio periodice, noctu, interdiu ingruunt. Manifestantur a querelis aegrorum, a tactu, manum sinistrae admovendo mamillae, non raro a visu et auditu. Socia illis esse possunt, quotquot morborum cordis et arteriarum hucusque descripsimus symptomata. Saepissime caput dolore, vertigine auriumque tinnitu laborat. Pul-

sant:

51) Diss. de palpitatione cordis. Vit. 1808.

52) HUFELAND's *Journal*. 18. B. 1. St. p. 82.

53) Op. c. Vol. I. p. 195.

*) Diss. de cordis palpitatione. Edinb. 1821.

) *Herzkrankheiten nicht im Herzen*. v. ejusdem *Journ. der pr. Heilk.* 1822. Januar.*) v. HUFELAND's *Journal* 1823. August. p. 19.

sant plerumque carotides, oscillant jugulares. Somnus praevio interdum incubo ⁵⁴⁾ saepe ab insomniis terrificis interrumpitur. Vires languent imminentque lipothymiae. Extremitates vicissim algent urentque. Pectus dolet, respiratio difficilis evadit et anxia. Dolet haud raro epigastrium et pulsatur, hypochondria tenduntur, flatus eructantur, intestinaque cum rumore percurrunt, artus excruciantur, tremunt. Pulsus percipitur parvus, frequens, inaequalis, intermittens, plenus, fortis. Ipsi motus cordis peccare possunt relate 1° ad vim pulsationis 2° ad extensionem loci pulsantis, 3° ad rumorem pulsationem comitantem et 4° ad rhythmum qua contractiones succedunt ⁵⁵⁾.

2. Cadavera hominum sic laborantium quan- ^{Autopsiae}
doque nullum vitium cordis vel arteriarum ex- ^{cadave-}
hibent ⁵⁶⁾. Saepe inveniuntur morbi ventriculi ⁵⁷⁾,
intestinorum ⁵⁸⁾, hepatis ⁵⁹⁾ et lienis ⁶⁰⁾.

A a 2

§. LXX.

54) SENAC l. c. §. 10.

55) LAENNEC l. c. p. 196. (Stethoscopium auctoris ad huiusmodi cordis motus propius dignoscendos inservire vix dubito).

56) Legi de hoc argumento merentur MORGAGNI op. c. Ep. XXIII. 2. Loquitur enim de tali pulsatione cordis ut thorax sub quovis ictu clevari videretur; secto tamen cadavere omnia viscera sana reperta fuere.

57) HUFELAND *Journal d. pr. Heilk.* 5. B. p. 821. (ventriculus quasi bifariam divisus).58) CAMERARIUS Diss. de anatome hydropicae cum scholiis. Tub. 1691. DUCHATEAU in *Journ. de méd.*,

§. LXX.

C a u s s a e.

C. praedis-
ponentes.

1. *Praedisponunt* ad motus vitiatos cordis et arteriarum vitium haereditarium ⁶¹⁾, aetas infantilis, sexus sequior, temperamentum sensile et sanguineum, et tempus vernale ⁶²⁾.

C. excitantes.

2. *Excitant* pulsationem, palpitationem et tremorem cordis: animi pathemata videlicet amor ⁶³⁾, moeror ⁶⁴⁾, metus ⁶⁵⁾, terror ⁶⁶⁾, ira ⁶⁷⁾,

chirurg. et pharmacie 1815. Sept. p. 61. (Omnia signa dilatationis cordis aderant; attamen nil morboſi in cavitate pectoris detectum est, sed gangraena intestini colon).

59) BREHA v. supra. Cap. XI. §. XLIV. (19).

60) GRÜLING Cent. III. Obs. 66.

61) SYLVATICUS Cent. IV. et Consil. 38. — MOEBIUS Inst. Lib. II. Part. 2. C. 4. p. 156. — VICAT delectus Obs. pr. N. 23.

62) De palpitatione cordis quotannis verno tempore redeunte testatur jam GALENUS l. c.

63) Curavi Vilnae per triennium virginem mihi ob terribilem eamque continuam pectoris pulsationem de aneurysmate praecordiorum suspectam; crisi per optatum cum juvene matrimonium factâ. Similem historiam enarrat TESTA (l. c. p. 114.) et quivis medicorum in propria diuturna praxi inveniet.

64) FORESTUS Lib. XVII. Obs. 8. SENAC l. c. p. 487.

65) FORESTUS l. c. Obs. 5. (pestis).

66) RIVERIUS Obs. med. Cent. IV. (naufragii causa).

HOFFMANN Opp. T. III. de palpitatione cordis. Obs. 3.

ira ⁶⁷⁾, anxia expectatio ⁶⁸⁾, imaginatio ⁶⁹⁾,
idiosyncrasia ⁷⁰⁾, electricitas ⁷¹⁾, venena narco-
tica,

67) TIMAEUS A GULDENKLEE Lib. II. Cas. med. 16.
GABELSCHOVERUS Cent. IV. Cur. 84. SENAC l. c.
p. 486.

68) Verno a. 1820. pro filia comitis CH. monasterium
Visitationis Vilnense habitante in consilium vocatus
sum. Laborabat illa jam a tribus mensibus conspicua
cordis palpitatione, cum pulsu irregulari, anxietate,
jactatione, dyspnoea, decubitu impedito et lipothy-
miis. Suspicio vitii organici praecordiorum eo pro-
babilior erat, cum aegra hyeme praecedente morbum
acutum pectoris perpessa fuerit. Verumtamen causam
malorum causa erat *anxia expectatio*, num pater
ejus, Vollhyniae incola, ut monacha ipsa fiat, conces-
surus sit nec ne. Vix enim nuntio consensus paterno
accepto et monachali vesta induta, sana evasit.

69) Dum Pater meus Ticini tractatum de morbis cordis
et vasorum majorum pro praelectionibus suis elabo-
raverat, adeo in cordis palpitationem cum pulsu in-
termittente incidit, ut de aneurysmate praecordiorum
illi vix dubium esset. Terminato vero labore illo
ingrato, ac instituto itinere, indicata mala, *imagina-
tionis laesae effectus* (nam vitae sedentariae et appli-
cationi mentis aliunde adsuetus erat), evanuerant.
Raro mihi acciderat tractatum de morbis cordis tra-
dere, quin unus alterve discipulorum, palpitationes
pectoris et pulsum intermittentem non experiretur,
tempore vacationum disparituras.

70) e. c. odor rosae, praesentia felis in cubiculo.

71) Duas matronas ipse novi, quae tempestatem cum
tonitru nychthemero ante illius adventum ex palpita-

tica, ut hyoscyamus niger et conium maculatum ⁷³⁾, maxime digitalis purpurea ⁷⁴⁾, somnus pomeridianus ⁷⁵⁾, cofea ⁷⁶⁾, liquores fermentati ⁷⁷⁾, esus cinnamomi ⁷⁸⁾, fragariae vescae ⁷⁹⁾, lentium ⁸⁰⁾,

tione cordis, sudore universali et sensu lipothymiae praesagiunt.

73) Curavi quondam foeminam nobilissimam abscessu mammae laborantem. Cum dolores intolerabiles essent, cataplasmati emollienti loco affecto imponendo pauxillum herbae hyoscyami nigri addidi. Noctu sequenti advocor derepente, ac aegram ex una in alteram lipothymiam incidentem, cum pulsu irregulari et cordis palpitatione maxima invenio. Causam cum illico divinaverim, cataplasma rejicere, aegram in alterum cubiculum transferri jussi, quo facto pax restituta est. — Simile exemplum FR. HOFFMANN (l. c. Obs. 8.) de conio maculato mammis applicito narrat.

74) Jam aliquoties contigit aegras vidisse, prius ab aliis medicis, me inscio, ope digitalis curatos, qui aegri, cum pulsum valdopere intermittentem et irregularem exhiberent, primo intuitu de morbis praecordiorum mihi suspecti erant.

75) FORESTUS l. c. et quotidiana experientia.

76) P. II. Vol. I. Sect. 2. Cap. XIV. §. LXXI. N. 2. (37).

77) Tempore systematis Brunonis, dum vinum hominibus illi haud adsuetis porrigebatur, palpitationes cordis inde saepius obveniebant.

78) Eph. Nat. Cur. Dec. I. A. 3. Obs. 134. MOEBIUS in instit. L. II. P. 2. A. 4. p. 157.

79) Filius meus adoptivus VICTOR, (puer magnae spei, propria mihi carior vita, die 19. Junii V. St. A. 1819. Polociae in convictu Jesuitarum ex hydrope scarla-

tium ⁸⁰), pomorum ⁸¹), saburrae ⁸²), bilis ⁸³), vermes ⁸⁴), flatus ⁸⁵), venus ⁸⁶), onania ⁸⁷), gravid-

inae praegressae effectu, decimo aetatis anno, defunctus) quoties *fragariam vescam*, etiamsi pauca in copia comederet, palpitationem cordis sensumque lipothymiae experiebatur.

80) „*Je connais*, inquit SENAC (l. c. §. 5.) *un homme, qui est attaqué des palpitations du coeur dès qu'il mange des lentilles; il ressemble en cela à MALPIGHI (Epist. I. Ad BORELLI de pulmonibus) en qui le coeur étoit agité par des battemens violents dès qu'il mangeoit des legumes.*“

81) „SIMON PAULI rapporte qu'il étoit agité par des palpitations en automne, lorsqu'il mangeoit des pommes crues.“ SENAC l. c.

82) *Journal de méd. T. XXVII. p. 342.*

83) FERNELIUS apud SENAC l. c. §. 6.

84) BALDINGER *Neues Magazin. 5. B. p. 485. HUFELAND's Bemerkungen über Blattern p. 467.*

85) FIENUS *de flatibus. C. 18. TEN RHYNE febris cardiaca et palpitation cordis ex flatibus. v. HALLER Biblioth. med. pract. Vol. III. p. 256. — Atque hic locus quoque est de aëre in corde et vasis sanguineis contento mentionem injiciendi. Hoc mirum phaenomenon, ut causam palpitationis cordis, jam ARISTOTELIS (De respirat. C. 20.) suspicatus est. Innititur illi magna ex parte doctrina antiquorum pneumaticorum (GALEN. de different. pulsu. Lib. IV. p. 42.). Confirmatur vero praesentia aëris indicatis in locis ad enorme interdum volumen per sectiones cadaverum a PECHLINIO (Obs. physico-med. p. 155. ed. Hamb. 1691.), a FRID. HOFFMANNO (diss. de hydropo pericardii rarissimo. pracs. Hal. 1697.), a RUYSCHIO*

viditas⁸⁸), suppressio menstruorum⁸⁹), epistaxeos⁹⁰), haemorrhoidum⁹¹), herpetis⁹²), psorae⁹³), ulcera consolidata⁹⁴), cosmetica⁹⁵), et obstacula circuitui sanguinis opposita⁹⁶).

§. LXXI.

(respons. ad epist. probl. 16.), a VALSALVA apud MORGAGNI (Epist. V. 20.), a MORGAGNIO (Epist. LIV. 49.), a TESTA (l. c. p. 120.), qui caeterum prudenter monet, ob id praesentiam illius aëris in homine vivo nec dum demonstratam esse. Est illarum cae erum probabilis.

86) *Ex veneris ludibriis*, narrante DOLAEO, vir quidam in talem cordis palpitationem incidit, ut nisi receptum cecinisset, suffocatus fuisset. — De cordis palpitatione ex testium inflammatione, ZACUTUS LUSITANUS (in hist. med. princip. Lib. VIII. C. 8. Obs. 2.) mentionem injecit.

87) Fere omnes onanitici cordis palpitationi aut tremoribus subditi sunt.

88) Praecipue ultimis mensibus.

89) Cfr. P. IV. Vol. II. Cap. de Chlorosi et Amenorrhoea.

90) HOFFMANN Opp. T. III. Obs. I.

91) Communissima caussa. v. *Anomalien der Haemorrhoiden* in HUFELAND's Journ. 1822. 3. St. März.

92) PRESSAVINI *Nouv. traité des vapeurs*. p. 174.

93) OSIANDER *Denkwürdigkeiten*. 2. B. p. 146.

94) ZACUTUS LUSITANUS l. c. Obs. 30.

95) BACHER in *Journal de médec.* T. LXV. p. 400. — WENDT in HUFELAND's Journal. 5. B. p. 382.

96) e. c. *tubercula pulmonis*. Cfr. P. II. Vol. II. Sect. 1. Cap. X. §. XLIV. — SENAC l. c. §. 4. — *Merkw. Abh. von Lond.* 1. B. N. 4.

§. LXXI.

Diagnosis. Prognosis.

1. Quo junior, quo floridior, quo gracilior, ^{Diagnosis.} quo sensibilior aeger, quoque certius constat, tales morborum causas, quales ad vitia organica producenda requiruntur (febres inflammatoriae, rheumaticae, arthritis, violentiae externae, nissus, syphilis), praegressas non esse; eo magis alimur spe, cordis arteriarumque pulsationem, palpitationem et tremorem, non ex illis vitiis, sed aut ex plethora, aut ex sensibilitate morbosa et debilitate aut denique ex affectione viscerum dissitorum ortum ducere ⁹⁷⁾).

2. *Plethoram* tunc ut fontem motuum vi- ^{Plethora.} tiatorum cordis et arteriarum libenter admittimus; dum aeger juvenis floridus est, dum ille epistaxi aut aliis haemorrhagiis quondam obnoxius erat, dum morbus tempore vernali evolvitur, dum aeger potu liquorum fermentatorum uti solet, dum animi pathemata vehementia praegressa sunt, dum agitur de gravida, dum pulsus vehemens, magnus, oppressus, percipitur, respiratio concitior est, facies rubet, oculi splendent, caput dolet, ipseque aegrotus sensum plenitudinis percipit; dumque haec mala a motu, a pastu, a calore cubiculi augentur.

3. Ex *sensibilitate morbosa, debilitate et* ^{Sensibilitas morbosa, debilitas et cachexia.} *cachexia* motus abnormis cordis et arteriarum ^{deri-}

⁹⁷⁾ HUFELAND, MUIRBECK l. c.

derivare inclinamus: si agitur de homine gracili, sensili, juvene, hypochondriaco, scorbutico, convalescente, deque femina hysterica, chlorotica; — si animi pathemata diuturna et recondita locum obtinuerunt; — si pulsus debilis, contractus, creber, extremitates frigidae sunt; — si conspicuae evacuationes praegressae fuerunt, sique aura quaedam ex inferioribus partibus caput petit, et momento citius, in cor incidens, illud convellit.

Affectio
viscerum
dissito-
rum.

4. In *visceribus dissitis* hic ad trutinam vocandis, maxime ad *cerebrum et medullam spinalem*, ad *tracheam et pulmones*, ad *ventriculum et intestina*, ad *hepar et lienem*, nec non ad *uterum*, respicere solemus.

Cerebrum
et medulla
spinalis.

5. Cor enim et arterias, imperio, tum *cerebri* ⁹⁸⁾ tum *medullae spinalis* ⁹⁹⁾ non parum sub-
jici,

98) Hic *cerebri cum corde nexus* ad memoriam revocari debet (de quo jam pluries locutus sum in P. II. Vol. I. Sect. I. C. I. §. III. 27. — C. V. §. XXV. 3. (75). — C. XVIII. §. LXXV. 2. (6). — C. XXII. §. XCIV. 2. (80). — C. XXV. §. CVII. 3. (74—80). ac in innumerabilibus praesentis tractatus locis) et de quo pulchre scripserunt SENAC op. c. p. 128. 439. — TESTA op. c. p. 111. — KREYSIG l. c. 1. Th. p. 15. 18. 42. 116. 3. Th. p. 22. aliique.

99) P. II. Vol. I. Sect. 2. C. I. §. II. 4. Provocavi imprimis ad experimenta LE GALLOIS, quae ostendunt: quod ex quavis destructione partis cujusdam medullae spinalis quid a cordis vi detrahitur, ita ut hoc viscus ad sanguinem per universum corpus pellendum

jici, patet. Medulla haec a mala vertebrarum conformatione ¹⁰⁰⁾, a plethora ¹⁾ compressa, a rapido corporis incremento et a seminis jactura exhausta ²⁾, perversos cordis motus saepe excitare, duce experientia ³⁾ contendimus. At vero cavendum ne dolorem spinae, ab aneurysmate aortae

minus evadat idoneum. LE GALLOIS experimenta nunc contraindican- tur a TREVIRANO (*Biologie*. 4. Th. Götting. 1814. p. 266.), PHILIPPS (*Philosophic. Transact.* 1815. P. I. p. 65. P. II. p. 224.), ENS (de causa vices cordis alternos producente) et PARRY (*an experimental inquiry into the nature, causes and varieties of the arterial pulse. Lond.* 1816. p. 8.); ast observationes ad aegrorum lectos collectae, potius illa experimenta sustinent.

100) P. II. Vol. I. Sect. 2. Cap. II. §. VIII. 3. (41).
Obs. 2.

1) ib. Cap. I. §. III. 4. (100).

2) ib. 7.

3) Vindobonensium medicus Dr. Malfatti quondam, aegrum curabat, ob effrenam et diuturnam cordis pulsationem de vitio organico praecordiorum suspectum. Redux ab hoc aegro meditabundus, illi egregius quondam inter Tergestinos medicus VORDONI (Pater) obviam venit, quaerens: quid tibi est amice? Audiens historiam aegroti, Malfattium anxium red- dentis, respondit: Ne timeas: applica cucurbitulas scarificantes inter scapulas et aeger tuus sanabitur. Sicque accidit. Nunquam motus perversos cordis curo, quin ad columnam vertebralem respiciam, ac pluries effectus admirandos obtinere licuit.

aortae descendens ortum, cum affectione medullae spinalis confundamus ⁴⁾).

Trachea et
pulmones.

6. Sicuti vitia organica in tracheam imperium exercent ⁵⁾; ita morbi *tracheae* in aortam vim exercere queunt. Idem de morbis *corporis thyreoidei* ⁶⁾ et *pulmonum* ⁷⁾ valet.

Viscera abdominalia.

7. *Viscera abdominalia* saepius causas *pulsationis abnormis* tum *pectoris*, tum *ventris* includunt. *Pulsationem regionis epigastricae* ^{*)}, prae omni alia, pro aneurysmate aortae abdominalis aut arteriae coeliacae imponere posse, MORGAGNI ⁸⁾, BAILLIE ⁹⁾, ALBERS ¹⁰⁾, ALLAN BURNS ¹¹⁾, HODGSON ¹²⁾, RUBINI ¹³⁾ et LAENNEC ¹⁴⁾ jure monuerunt. Ostenderunt nempe pulsationem illam saepe numero a causis, toto coelo ab aneurysmatibus

4) Cap. XVI. §. LXIII. N. 2.

5) P. II. Vol. II. Sect. I. C. IV. §. XVI. 1.

6) ibid. Cap. VI. §. XXV. 2.

7) ibid. Cap. X. §. XLIV. 3.

*) Lego (*Bemerk. auf e. Reise um d. Welt in d. Jahren 1803 bis 1807. v. LANGSDORF. 2. B.*) in CALIFORNIA morbum (vulgo *Latido*), cujus praecipuum symptoma in perceptione pulsationis in abdomine consistit, regnare.

8) Op. c. Epist. XXIV. 34.

9) *Transact. of the college of Physic. Vol. 4. p. 271.*

10) *Edinb. med. and surg. Journal. Vol. 3. p. 8.*

11) Op. c. p. 301.

12) Op. c. p. 139.

13) *V. Annali universali di Medicina. 1819. Giugno.*

14) Op. c. Vol. 2. p. 436.

matibus alienis, oriri, spectant huc 1° flatus ventriculorum ita distendentes, ut ille a pulsatione arteriarum subjacentium adversus musculos abdominales prematur; — 2° irritabilitas systematis arteriosi major quam par est, uti apud hystericas et hypochondriacos contingere solet; — 3° obstructions hepatis et lienis; 4° tumores diaphragmatis, pancreatis, pylori aliisque arteriis et venis insidentes ¹⁵); 5° dilatatio venae cavae, sanguine tunc per contractionem auriculae dextrae in illam regurgitante ¹⁶); et 6° pulmonum parenchyma incrassatum diaphragma deprimens. Quibus singulis in casibus pulsatio citius oritur, magis expansa et undosa est, minusque cum pulsu corporum cohaeret, quam in aneurysmatibus. Caveamus vero ne motus vitiatos cordis et arteriarum ex viscerum abdominalium affectione ibi derivemus, ubi ipsa haec affectio vitiorum organicorum cordis et aortae effectum sistit. Inprimis explosio flatuum (aeque causa palpitacionis cordis in hypochondriacis et hystericis ²⁰), quam effectus angoris pectoris et aneurysmatum aortae) in errorem ducere solet.

9. Ac-

15) RUBINI l. c. (tumor cysticus, elasticus, qui peritoneum introrsum pellebat, et pulsationem ab arteriis subjacentibus accipiebat).

16) In hominibus haemorrhoidibus obnoxiiis, pulsationem regionis epigastricae, profluvium sanguinis ex ano annuntiassent, vidi. Cfr. KREXSIO l. c. 2. Th. Tab. 3.

20) De vitiis uteri, motuum abnormium cordis causis,

Complicatio. 9. Accidit interdum ut vitia organica cordis et aortae, quae quatenus exigua, per se oeconomiam animalem vix aut ne vix quidem perturbant, dum fortuito cum aliis recentioribus morbis *complicantur*, maximum tunc excitent tumultum, quem si congruis auxiliis etiam sedare valerēs, tamen, ex eo ad absentiam omnis vitii organici cordis et aortae concludendo, valde errares.

Prognosis. 10. Cautissime hinc *prognosis* motuum cordis et arteriarum vitia organica simulantium instituenda erit, idque eo magis, cum partes illae, licet primum dumtaxat per consensum patiantur, nihilominus, passione ista vel diu durante, vel saepius repetitā (nisi natura plenā crisin per febres ²¹), podagram ²²), morbos cutaneos ²³), haemorrhagias aliasque evacuationes obtineat, ocyus serius ²⁴) in vitia organica transire possint *).

§. LXXII.

lege FORESTUM l. c. Obs. 6. et HORSTIUM Opp. Vol. III. p. 60.

21) PETIT *Essay sur la méd. du coeur* p. 116.

22) Cordis palpitationem ab arthritide solvi posse, inter alias LANCISI (de subitaneis mortibus p. 60.) et SAUVAGES (Nosol. method. T. I.) indicaverunt.

23) LANCISIUS l. c. p. 60. (apostema ad podicem).

24) Legitur de palpitatione cordis quinquaginta annos durante, apud ANGELUM VICTORIUM in Consult. p. 447. Similia narrant SMETIUS in Miscell. med. C. 10. p. 523. et SCHENK L. II. Obs. 24.

*) Rite monet H. JAMES (*medico-chirurgical transact.*

§. LXXII.

C u r a.

1. Itaque, quo citius id fieri possit, morbo, *Cura morbi ex plethora* veniat, occurrendum est; — 1^o *thorax*, *venae sectione* ²⁵⁾ ex brachio sinistro aut potius ex pede ²⁶⁾; 2^o *hirudinibus*, pro re nata cranio, lateri thoracis sinistro, vasis haemorrhoidalibus admovendis; 3^o *cucurbitulis*, tum *siccis* ²⁷⁾ tum *scarificantibus*, ad cordis regionem ²⁸⁾, maxime vero inter scapulas ²⁹⁾; 4^o *nitrate potassae* et *supertartrate potassae*; 5^o *acidis vegetabilibus*; — 6^o *potu aquae frigidae* ³⁰⁾;

Vol. 8. P. II. N. 1817.), multas dilatationes aortae, venae cavae et cordis, ex obstaculis, quae sanguis in circuitu suo in locis dissitis invenerat, ortum ducere.

25) GAIENUS l. c. (scopo prophylactico in palpitacione periodica). — LIEBAULT *Ergo cordis παλμῶ φλεβοτομία*. Paris 1580. — Consentiant HAUTERMER, SALIUS DIVERSUS, VAN DER WIEL, ZACUTUS LUSITANUS, BALLONIUS, SYLVATICUS, PLATER, SYLVIVS, RIVERIUS, FR. HOFFMANNUS, ETTMÜLLERUS, SENAC (l. c. §. 15.) et quotidiana experientia.

26) Dico cum SENAC (l. c.): „*J'ai observé que les saignées du pied soulageoient plus promptement.*“

27) „*Quelques praticiens et RIVIERE, les appliquoient sur le thorax sans faire des scarifications, et il comptent beaucoup sur ce secours.*“ SENAC l. c.

28) ZACUTUS LUSITANUS *Prax. admir. L. I. Obs. 133.*

29) §. LXXI. 5. (3).

*dae*³⁰⁾; — 7^o *balneis pedum tepidiusculis*³¹⁾, *quiete* animi et corporis nec non *diacta modica*.

C. morbi
ex sensi-
bilitate
nimia.

2. Motibus abnormibus cordis et arteriarum *ex sensibilitate nimia* totius systematis provenientibus, nil virtutem *emulsionis ex seminibus hyoscyami nigri* et amygdalis paratae³²⁾, additoque *nitrate potassae* antecellit. Accedit *aqua pruni laurocerasi* aut illa *amygdalarum amararum cohobata*³³⁾. Quodsi irritatio in arteriis praedominaretur, ad *folia digitalis purpureae*³⁴⁾ recurrendum. Prosunt tunc quoque *elixir acidum* HALLERI³⁵⁾ et *alumen purum*³⁶⁾. Si irritatio potius in *systemate venoso* vigeret (ut apud haemorrhoidarios fieri solet), ab istis duobus auxiliis abstinendum, et ad *acida vegetabilia*³⁷⁾, imprimis ad illa, quae simul alvum leniter movent³⁹⁾, confu-

30) MICHAELIS in HUFELAND's *Journal*. 18. B. 3. St. p. 62. et in LODER's *Journal*. 3. B. p. 128.

31) „*Les pieds plongés long-tems dans l'eau, ont souvent calme les palpitations.*“ SENAC §. 19.

32) P. II. Vol. II. Sect. I. Cap. IV. §. XIX. N. 1. (32).

33) a gutt. decem ad viginti pro dosi.

34) tenue infusum, aut pulvis.

35) e. c. scrupulus unus in libra aquae communis, cum syrupo rubi Idaei.

36) R. aluminis puri drachmam semis, solve in aquae fontis libra una, adde syrupi violarum unciam unam.

37) Succus citri, vaccinii oxycoccus, berberis vulgaris (in regionibus septentrionalibus) succus fermentatus betæ ciclae, brassicae.

39) Pulpa tamarindorum, cassiae, prunorum.

confugiendum. Feminae hystericæ, haud plethoricae, sub ipso palpitationis paroxysmo maxime a liquore *anodyno minerali* HOFFMANN aut a *tinctura castorei* ⁴⁰⁾ reficiuntur. Quondam in usu erant *crocus* ⁴¹⁾, *sal volatile* ⁴²⁾, *opium* ⁴³⁾ ipsaque *electricitas* ⁴⁴⁾. Hystericæ simul plethoricae, inprimis si palpitatione ex animi pathemate oriatur, sub usu *pulveris antispasmodici rubri* STAHLII optime se habent.

3. Eodem morbo *ex debilitate* orto, excellunt *infusum corticis cinchonae officinalis frigida* ⁴⁵⁾, — *mars* ⁴⁶⁾, — *vinum generosum*, — ipsa *coffea* ⁴⁷⁾, ne dicamus de *victu* nutriente, aëre

40) Jam GALENUS adhibebat.

41) HERTOD Crocol. C. 14.

42) RIEDLIN Millenarius. N. 971. (Oleosum Sylvii).

43) TRALLES usus opii. Sect. 3. p. 164. SENAC l. c. p. 527.

44) SIGAUD LA FOND *de l'électricité médicale*. p. 13. 15.

45) Maxime in convalescentibus, cum lacte.

46) Praeprimis in chloroticis. Utor potissimum limaturâ martis, carbonate ferri, tinctura pomata martia et aquis martialibus, *Spa*, *Pyrmont*; quodsi simul vitia abdominalia subessent, mars cum solventibus exhibendus: „*De tous les mélanges que l'expérience autorise, inquit SENAC (l. c. §. 17.) il en est aucun qui produise des effets plus marqués que les bouillons rafraichissants, apéritifs, amers, purgatifs, auxquels on joint un gros ou deux de tartre martial soluble; c'est le remède que j'ai employé le plus souvent avec succès.*“

47) Pluries cum fructu adhibui. Est enim virtus coffeae

aëre rusticano, equitatione, itineribus et fuga studiorum.

C. morbi
ex cache-
xia.

4. Observavimus exempla motuum cordis abnormium et arteriarum, in hominibus *cachecticis*, ubi omnia auxilia incassum exhibebantur, praeter illa quibus antiquitas virtutem sanguinem purificandi tribuerat. De decoctis *smilacis saspaparillae* et *chinae*, *solani stipitum*, *solani dulcamarae* et *arctii lappae*, loquimur ⁴⁸⁾. Et cur sanguis qualitate peccare suaeque receptacula specificè irritare haud posset? Latente diathesi scorbutica ad methodum specificam recurrendum. In scrophulosis et praecipue arthriticis *fonticuli* ad potiora spectant auxilia ⁴⁹⁾.

C. morbi
ex affe-
ctione vi-
cerum ab-
domina-
lium.

5. Dum motus abnormes cordis et arteriarum *ex affectione nervea viscerum abdominalium debilitati junctae* ortum trahunt, *aquae minerales* simul tonicae et resolventes, e. c. quales fontes *Ems* largiuntur, primum inter auxilia locum obtinent. Accedunt *extracta* leniter amara, maxi-
me

palpitationem cordis producendī, maximum testimonium potestatis illius specificae super hoc viscus.

48) Carissimum mihi est sequens decoctum. R. Rad. chinae nodosae, bardanae aa unciam semis, stipitum solani dulcamarae drachmas duas. M. Pro decocto parando.

49) „Maxime valens in palpitationibus ut ego sum expertus felicissime cauterium adhibitum.“ MERCURIALIS sunt verba a SENAC (l. c. §. 19.) allata.

me illud *fumariae officinalis* ⁵⁰⁾. Dum potius *sensibilitas morbosa plexuum abdominalium* scenam ludit, *oxydum bismuthi* ⁵¹⁾ reliquis pharmacis palmam praeripit. Morbo ex *impedito circuitu sanguinis* per viscera abdominalia obstructa ortum ducente, valent quidem multum, tum *aquae salinae*, inprimis *Carolinae*, *Marienbad*, aliaeque *amarae* ⁵²⁾, tum *extracta resolventia*, potissimum *tritici repentis*, *leontodontis taraxaci*, *intubus cichorei*, tum *salia media*, praecipue *tartras potassae* et *sodae*, *sulphas sodae* aut *magnesiae*; — nil vero exstat, quod *pilulis SAIFFERTI* ⁵³⁾ aequiparari posset.

50) Sub forma pilularum ad drachmas duas de die.

51) ODIER in *Journ. gen. de méd. T. LXVIII. p. 49.*

52) *Bitterwasser* ex Silesia mihi est usitatissimum auxilium.

53) R. Extracti gentianae unciam semis. Fellis taurini drachmas tres. Scammonii drachmas duas. M. assidue et divide in pilulas centum sexaginta duo. Capiat mane jejunio ventriculo vel ante prandium quatuor ad octo. Didici hoc pretiosum auxilium ab egregio quondam ODIER (*Manuel de méd. pratique et Abhandl. f. pr. Aerzte. 22. B. p. 144.*) et ea re cum summo successu adhibui inprimis jungendo illi drachmam unam foliorum digitalis purpureae. Quid talis formula valeat sequens docet casus. Cum a. 1812. Vindobonae essem, ANTONII SALIERI, viri tunc sexagenarii, celeberrimi musicae compositoris, habitum corporis valdopere mutatum et morbosum inveni. Quid tibi est amice? quærebam. Ah, sepulcro me

appropinquo, respondit. Morbus enim, quo jam a tredecim annis laboro, nunc quotidie magis magisque saevit. Noctes integras insomnes et sedendo transigere sum coactus. Quod si enim cubitum petere vellem, illico me expectarent vehemens cordis pulsatio, angor mortis et lipothymiae, a quibus malis etiam sedendo non semper liber sum. Aeger caeterum nec de pectoris, nec de brachii doloribus conquerebatur. Deerant quoque symptomata hydrothoracis. Praeterca nullae praegressae erant caussae, quae facile morbo conspicuo eoque organico cordis aut aortae ansam porrigere potuissent. Adspectus aegri potius suspicionem obstructionum viscerum abdominalium movebat, quae etiam suspicio ab examine ventris satis confirmabatur. — Quis salutis tuae curam habet? quaesivi. Plurimi medici me curarunt, ast incassum. Amice, dixi; ego me nemini obtrudere soleo, sed te excipio. Vellem enim pro tot vesperibus, quibus excellens tua musica me delectavit, tibi saltem nonnullas noctes placidas conciliare. Fac, quaeso, experimentum cum *pilulis*, quas tibi praescripturus sum. Non sine difficultate aeger ad propositum meum accessit, at tanto cum successu, ut spatio nonnullorum hebdomadum a malo suo liberatus fuerit, et ad annum 1823. sanus vixerit. Quoties sub curriculo hujusmodi decennii prodroma antiqui mali percepit, illa semper, paucis sumentis pilulis debellavit.

CAPUT

CAPUT XVIII.

De phlebitide.

§. LXXIII.

Definitio. Literatura.

1. *Phlebitis*¹⁾ est inflammatio venae, in-Definitio.
 primis ejus membranae internae, insignita dolore
 ardente, tensione et tumore, decursum partis
 affectae sequentibus, accedente saepe febre, no-
 tas, prius inflammatorias, dein typhoides agno-
 scente.

2. De phlebitide jam clare locutus est ARE-Literatu-
 TAEUS²⁾. Ejusdem morbi porro mentionem in-^{ra.}
 jecerunt LANCISIUS³⁾, PARÉ⁴⁾, DIONIS⁵⁾, PLAT-
 NER⁶⁾, BLANCARD⁷⁾, SWIETEN⁸⁾, MORGAGNI⁹⁾,

J. HUN-

1) A GRAEC. Φλέψ, vena.

2) De caussis et signis acutorum morborum. Cap. 8. Lib.
II. p. 28 et 39.3) Opp. Edit. Venet. 1739. T. I. p. 55. de ulceribus in
venis.4) *Livr. X. Chap. 41.* p. 401.5) *Cours d'opération de chirurgie.* p. 680.6) *Chirurgia rationalis.* p. 18. 19.7) *Anat. pract. rat. Cent. I. Obs. 7.* p. 13. Cent. II.
Obs. 73.8) *Comment. in ΒΟΕΡΗΑΑΥ. Aphor. T. II. §. 372. 374.*

J. HUNTER ¹⁰), CLARK ¹¹), OSIANDER ¹²) aliique. Notio autem absoluta phlebitidis debetur J. P. FRANK ¹³), SHIRVEN ¹⁴), PALLETTA ¹⁵), SCHMUCK ¹⁶), MECKEL ¹⁷), SCHWILGUÉ ¹⁸), ABERNETHY ¹⁹), DUNDAS ²⁰), RUSSEL ²¹), LONGUET *), PATISSIER ²²), RICHARD CARMICHAEL ²³), HERISSE ²⁴), KREY-
SIG ²⁵),

9) De sed. et caus. morb. Epist. LIII. 30. — Epist. LVI. 10.

10) *Medical and philosoph. Comment. Vol. 3. p. 430.*

11) *Pract. essays on the management of Pregnancy. p. 63. 72. 2. Edit.*

12) *Denkwürdigkeiten f. Aerzte u. Geburtshelfer. Gött. 1797. 1. B.*

13) *Epitome de curandis homin. morbis. Vol. II. p. 175.*

14) *Med. and philos. Commentaries. Vol. 4. p. 210.*

15) *Exercitationes pathologicae. Mediol. 1820. Cap. 3. Edit. 2. in nota WENZELII.*

16) *Diss. sistens observationes medicas de vasorum sanguiferorum inflammatione. Heidelberg. 1793.*

17) *SASSE de vasorum sanguiferorum inflammatione. Hal. 1797.*

18) *Faits pour servir à l'histoire des inflammations vénéuses et artérielles. v. Bibliothèque méd. T. XVI. p. 190.*

19) *Surgical Works. p. 147.*

20) *Med. chirurg. Abhandlungen d. med. chir. Gesellschaft in London. A. d. E. von OSSAN. Berl. 1811.*

21) *Edinburgh medic. and surgical Journal 1814. Jan. N. 37.*

*) *Sur l'inflammation des veines. v. Collection des thèses, de la faculté de médecine de Paris. 1815.*

22) *Bulletin de la faculté de médecine 1816.*

23) *Transactions of the association of Queen College of Physicians in Ireland. Vol. 2. Dublin. 1818.*

SIG²⁵⁾, HODGSON²⁶⁾, PUCHELT²⁷⁾, A. WALTER²⁸⁾, WILSON²⁹⁾, RIBES³⁰⁾, MAJORLIN³¹⁾, FIZEAU³²⁾, VILLERMÉ³³⁾ et BRESCHET³⁴⁾. Secuti sunt SPRENGEL³⁵⁾, FALLOT³⁶⁾, PELIKAN³⁷⁾ et CZARNOWSKI³⁸⁾.

§. LXXIV.

Symptomata. Autopsiae cadaverum.

1. *Symptomata* phlebitidis juxta variam ve- Sympt.
narum sedem et dignitatem variamque indolem genera-
caussarum inflammationem excitantium, varia tim.
sunt. Dividuntur illa in *localia* et in *universalia*.

2. Ad

24) *Journal de médecine, chir. et pharm.* T. XII. p. 412.

25) Op. c. 3. Th. p. 273.

26) Op. c. p. 525.

27) Op. c. p. 59.

28) Diss. de venarum inflammatione. Dorpati Livonorum. 1820.

29) *Medical and chirurg. Transact.* T. 5. P. 3. p. 65.

30) *Mém. de la société médicale d'émulation A. VIII.* p. 624.

31) *ibid.* p. 630.

32) *Bibliothèque médicale.* T. XXX.

33) *Diction. des sciences médicales.* T. XLI. p. 341—363.

34) *Journal complémentaire du dictionnaire des sciences médicales.* T. II. p. 325. T. III. p. 317.

35) *ibid.* T. VIII. p. 85.

36) *ibid.* T. X. p. 80.

37) *Dziennik medycyny, chirurgii i farmacyi.* Wilno 1823. N. 1. 2.

38) Diss. de phlebitide. Vilnae 1823.

Sympt. localia.

2. Ad *Symptomata localia* spectant dolor tensivus, ab attactu auctus, in decursu venae, funis instar retinentis, nodisque intersectae; livor veluti in vibicibus, saepe rubor quidam erysipelaceus et tumor, interdum oedematosus³⁹⁾, circa partem affectam, haud raro ad totum membrum extensus. Sauciatâ consulto venâ inflammâtâ, sanguis pure mixtus exivisse visus est⁴⁰⁾. Ea cor versus perfricata, quo primum hoc opus suspenditur, sanguis motum levem retrogradum agnoscere solet⁴¹⁾. Interdum abscessuli in venae inflammatae curriculo formantur⁴²⁾.

Sympt. universalialia.

3. Vigentibus symptomatibus localibus, prae-vio debilitatis et anxietatis sensu, animi dejectione *) doloreque pectoris, alia ocyus serius adsociantur *universalia symptomata*, nimirum, horror, subsequente calore mordace, pulsu frequente, pleno, debili⁴⁴⁾, duro, contracto, irregulari; sitis, lingua rubra, muco bruneo obducta, aridissima; dolor capitis, dorsi, membrorum, abdominis tensi; virium magna prostratio; faciei mutatio, oculi languidi, rubri; respiratio difficilis, tumor super claviculam ad angulum maxillae

39) TRAVERS l. c. (in crure). — RAIKEN in *dictionnaire des sciences médicales* l. c. p. 355.

40) DUPUYTREN in *dict. des scienc. méd.* l. c. p. 344.

41) BRESCHET et VILLERMÉ l. c. p. 357.

42) HUNTER l. c.

*) PELIKAN l. c.

44) HODGSON l. c.

maxillae inferioris *), et, nisi curae tentamina morbo frenum injicere valeant, flavedo cutis, ecchymomata, sopor, subsultus tendinum, delirium, mors.

4. *Cadavera* hominum phlebitide perempto- Autopsiae
rum exhibent corpus plerumque pallidissimum, ^{cadave-}rum.
livescens, tumoremque partium venae inflamma-
tae contiguarum. Vulnus, si adsit, inflammatum,
suppuratum est. Conspicitur funis lividus, coe-
ruleus, tractum venarum affectarum superficia-
lium sequens. Textus cellulosus circum circa
rubit, tumet, et duritiae notatur. Musculi pro-
pinqui contracti sunt et lividi. Glandulae lym-
phaticae vicinae, tumidae et justo duriores ob-
servantur ⁴⁵⁾). Vena affecta ipsa, textui cel-
luloso contiguo arcte adhaeret ⁴⁶⁾), et resecta
instar arteriae hiat ⁴⁷⁾), exhibetque parietes in-
crassatos ⁴⁸⁾), friabiles ⁴⁹⁾), superficiem externam
rubram ⁵⁰⁾), internam violaceam ⁵¹⁾), nigram ⁵²⁾),
spongiosam ⁵³⁾), lymphæ coagulabili, pseudomem-
branis,

*) HODGSON l. c.

45) PELIKAN, CZARNIOWSKI l. c.

46) TRAVERS l. c.

47) HODGSON l. c.

48) RIBES l. c. HODGSON l. c.

49) RAIKEN l. c.

50) RECAMIER in *Dict. des scienc. méd.* l. c. p. 343.

51) RECAMIER l. c.

52) PALLETTA l. c. RAIKEN l. c.

53) MECKEL l. c.

branis, in frustulis secedentibus ⁵⁴), obductam ⁵⁵), impermeabilem ⁵⁶), firmiter occlusam ⁵⁷), dilatam ⁵⁸); valvulas partim erosas, partim laceras, tumidas et obscure rubentes ⁵⁹), sanguinemque purulentâ materiâ remixtum ⁶⁰). Quandoque cruoris loco nil nisi materies puriformis, spissa, alba ⁶¹), et foetida ⁶²), detegitur. Phaenomena allata plerumque ad locum affectum sat arcte circumscripta sunt ⁶³); alias venae quoque in locis dissitis inflammationis notas prae se ferunt ⁶⁴).

§. LXXV.

C a u s s a e.

Phleboto-
mia.

1. Frequentissima phlebitidis caussa est *phlebotomia*, tum directe, rudi scilicet manu, aut instru-

54) MECKEL l. c.

55) TRAVERS l. c.

56) TRAVERS l. c. RAIKEN l. c. (ob lympham coagulabilem venam replentem).

57) RAIKEN l. c. (adpectu ligamentum referens).

58) TRAVERS l. c. PUCHELT l. c. p. 73. (Forte dilatatio venae cavae inferioris magis hîc effectus fuit impediti circuitus sanguinis per pulmones, quam inflammationis. In genere hîc iste auctor in admittenda phlebitide nimis promptus videtur).

59) MECKEL l. c.

60) PALLETTA et fere omnes, me ipso non excluso.

61) RECAMIER l. c.

62) FIZEAU l. c.

63) PALLETTA l. c. TRAVERS l. c.

64) SCHWILGUÉ l. c. HODGSON l. c.

instrumento incongruo instituta; tum indirecte, membro laeso cito et fortiter agitato, aut aëre in cavum venae perducto ⁶⁵), aut applicitis emplastris glutinatis ad sistendum sanguinem e vena secta ruentem *). Vulnusculum tunc venae sauciatae non coalescit, excrescentiis fungosis obsidetur, margines illius invicem recedunt et reflectuntur, puris quid fundunt, donec post dies quatuor, sex, octo et tardius, localia inflammationis symptomata appareant et sic porro.

2. Sicuti contusiones, vulnera sclopetaria ⁶⁶), ^{Amputatio.} et fracturae, inprimis complicatae ⁶⁷), phlebitidi ansam porrigunt; ita etiam, et frequenter quidem, *amputationes* ⁶⁸).

3. Nec rarum est phlebitidem ortum de ^{Excisio varicum et applicatio hircudinum.} bere *varicibus* ⁶⁹), praecipue illarum *excisioni* ⁷⁰). Quid quod, ex ipsa *hirudinum* circa vasa haemorrhoidalia ⁷¹), et venas varicosas ⁷²)

65) Introductionem aëris in venas pro mortis ipsius causa agnoscunt BICHAT (*Anatomie générale. T. I. p. 418.*) et MAGENDI (*Journal de Physiologie* 1821. *Avril*).

*) PELIKAN l. c.

66) LONGUET l. c.

67) PALLETTA l. c.

68) HUNTER, VILLERMÉ, RICHARD CARMICHAEL, PELIKAN etc. Ipse plurima exempla vidi, partim a CZARNOWSKI l. c. descripta.

69) RIBES l. c.

70) TRAVERS l. c.

71) P. III. Vol. I. Caput de haemorrhoidibus ani.

ris 72) applicatione, symptomata phlebitidis observavimus.

Ligaturae
venarum,
et funiculi
umbilica-
tis.

4. Praecipue vero in phlebitide excitanda accusantur *ligaturae venarum* 73), et *funiculi umbilicalis*. Accidit nimirum ut, secedente nonnunquam ligatura umbilici, non cicatrix, sed suppuratio relinquatur, subsequenter febre, ejulatu, diarrhoea, ictero et nervorum turbis. Sectio cadaveris exhibet peritonaeum inflammatum ac pseudomembranis coopertum, ramos venae portae

72) Die 16. Maji A. 1816. mihi venam saphenam pedis dextri secari jussi. Postridie jam aegrotos visitare multasque scalas ascendere coactus fui. Impedivi sic coalitionem vulnusculi brevi post in suppurationem transcuntis. Die 24. ejusd. mensis en in vena tibiali praecipua phlebitidis symptomata, eo magis timenda, cum singulae cruris mei venae, ex vitio haereditario, varicosae sint. In consilium deducto chirurgiae tunc temporis professor NISKOWSKI, circa venam inflammatae hirudines applicare jussit, ast tanto cum detrimento, ut symptomata inflammatoria venae non solum aucta, sed et fere ad genu propagatae fuerint. Aqua saturnina frigide applicata potius nocuit. Conduxit quammaxime aqua cum aceto, consilio directoris nosocomiorum militarium, equite a TIEFFENBACH, adhibita. — Hisce ultimis annis plura phlebitidis exempla, ex applicatione hirudinum sub malleolis, observavi.

73) TRAVERS de operatione aneurysmatis narrat, ubi ob ligaturam, vena femoralis phlogosi correpta est, usque ad bifurcationem venae cavae propagata (l. c. et *dict. des scienc. méd.* l. c. p. 346.).

portae tumidos, cum parietibus incrassatis ⁷⁴⁾, venamque umbilicalem materiâ puriformi repletam ⁷⁵⁾.

5. Post *partum* inflammatio venarum uteri, Partus. iliaca et cavae observata est ⁷⁶⁾. In puerpera omnes abdominis venae sanie repletae erant ⁷⁷⁾. Venae sectionis ope sanguinem plane purulentum in puerpera eductum fuisse compertum habemus ⁷⁸⁾. Et post abortum venae interdum inflammantur ⁷⁹⁾. Ipse tumor albus puerperarum nonne phlebitis ⁸⁰⁾?

6. Venas *inflammationis partium contigua-* Inflammatio par-
rum participes fieri, observationes relate ad ^{tio par-}
 curriculum erysipclatis ^{tium con-} ⁸¹⁾, ulcerum et praeci- ^{tiguarum.}
 pue gangraenae nosocomialis ⁸²⁾ atque vari-
 cum ⁸³⁾,

74) MECKEL l. c.

75) OSIANDER l. c.

76) WILSON et CLARK l. c.

77) RIBES l. c.

78) Pater meus hoc phaenomenon in ipsa prima sua uxore observavit.

79) MECKEL l. c.

80) Cfr. P. IV. Vol. II. Caput de tumore albo puerperarum. Et SCHWILGUÉ, ubi observationem MECKELII refert, de puerpera scilicet, praeviis febre, et doloribus abdominis, pelvis et cruris dextri demortuam, cujus cadaver exhibuit venam cruralem ad aspectum arteriae referentem, cum pure sanguini mixto etc.

81) RIBES, MAJORLIN l. c.

82) LONGUET l. c. BRESCHET et VILLERMÉ l. c. p. 151.

cum⁸³), collecta, docent. Ipsa arteriarum inflammatio ad venas propagari posset⁸⁴).

Irritamenta mechanica et chemica. 7. *Irritamenta mechanica et chemica* venas inflammare, experimenta in animalibus instituta probant⁸⁵). Ipse calor ope balneorum pedis administratus, magnam interdum systemati venoso irritationem infert *). Si porro *vermium* (*polystoma*, *hexanthrydium*) in venis hominum praesentia confirmaretur, forte et haec animalcula ad causas phlebitidis spectarent. Ad illas certe spectant exanthemata praepostere fugata⁸⁶). — Suspiciari quoque licet venas interdum inflammari sub curriculo febris puerperalis⁸⁷), biliosae⁸⁸),

83) RIBES l. c. BROSCHE l. c. p. 333.

84) Saltem simultanea arteritis et phlebitis a Patre meo observata est (l. c.). Praeterea imperium arteriarum in venas et ab istarum *pulsatione* comprobatur. Luculentissimum hujus generis exemplum legitur in HUFELAND's *Journal* 1815. *Septembr.* Pulsationes illarum cum iis arteriarum cohaerebant.

85) MECKEL l. c.

*) In *Journ. général de méd. Franç. et étrangère* 1822. *Décembr.* p. 304. Casus narratur ubi post balneum pedum calidum ecchymomata comparuerunt, subsequente scorbuto (?).

86) RAIKEN in *Dict. des scienc. méd.* l. c. p. 355.

87) Ab eo tempore, a quo suspicionem hanc aleo, facultas mihi concessa est *unum* duntaxat cadaver feminae ex febre puerperali demortuae secandi. In hoc venae non solum non erant inflammatae, sed prorsus sanguine orbatae.

sae⁸⁸⁾, variolae⁸⁹⁾, lienitidis, icteri, scorbuti, tetani⁹⁰⁾, hacque ex inflammatione haemorrhagias, praesertim vero morbum sic dictum maculosum WERLHOFFII⁹¹⁾, ortum ducere.

§. LXXVI.

D i a g n o s i s.

1. Ast caveamus ne conjecturae hujusmodi Monitum. locum experientiae usurpent! Sane medici aevi nostri in inflammationibus omnis generis admit- tendis nimis prompti sunt.

2. Ne praeterea *phlebitis* cum *inflammatione* Facilis confusio. *arteriarum, vasorum lymphaticorum, et nervorum,* cumque *typho* et morbis in quibus venae puri- formem humorem includere possunt, confun- datur!

3. In *arteritide* dolor ex trunco ad ramos Distinct. extendi solet; in *phlebitide* contrarium expectan- ab arteri- tide. dum est. Systemate universo jam in consensum deducto illa cum pericarditide, haec potius cum typho, similitudinem alit.

4. *Vasis lymphaticis inflammatis* plurimae Distinct. *striae parallelae* in cute decurrunt; tument prae- ab inflam- matione terea ganglia lymphatica totumque turget mem- vasorum lymphati- corum. brum affectum.

5. Laeso

88) FIZEAU l. c.

89) FALLOT l. c.

90) PATISSIER l. c.

91) P. III. T. II. Cap. de scorbuto.

Distinct.
ab inflam-
matione
nervi. 5. Laeso *nervo* dolor extemplo oritur, qui
dolor, accedente dein inflammatione, omni alio
dolore major est.

Distinctio
a typho. 6. Distinctio *phlebitidis* a *typho* potius ha-
bita ratione caussarum et curriculi morbi, quam
ex solo intuitu symptomatum, utrisque in mor-
bis sibi sat similium, facienda est. De phlebi-
tide suspectae sunt illae febres, sub quarum
decursu praeter consueta typhi symptomata, do-
lores abdominis, haemorrhagiae, flavedo cutis
(absente hepatis affectione) obveniunt, quae sine
ulla contagii suspitione, in vulneratis, puerperis,
et haemorrhoidariis oriuntur. Caeterum et ty-
phus inflammationem systematis venosi sociam
habere posset.

Distinctio
ab aliis
morbis
cum pure
in venis. 7. Cum venae officio absorptionis verisimi-
liter non sint plane alienae ⁹²⁾, fieri posset ut
humorem purulentum ex alio loco desumptum ⁹³⁾
contineant, qui humor a puriformi materia, quae
ex ipsa venarum inflammatione generatur ⁹⁴⁾,
probe

92) MAYER in *Deutschem Archiv f. Physiologie von ME-
CKEL*. 3. B. 4. Hest. 5. B. 4. Hest. et *Bibliothèque uni-
verselle*. 1818. Janvier. p. 51.

93) SHIRVEN l. c. p. 20. — PALLETTA l. c. p. 21.

94) Nescio cur BRESCHET et VILLERMÉ (l. c. p. 359.)
humorem quem parietes venarum inflammatarum se-
cernunt, pro pure, abscessus sobole, declarent. Re-
ctius judicat PUCHELT l. c. p. 136.

probe distinguendus foret⁹⁵). Talis humor quondam pro *lacte* habebatur⁹⁶).

§. LXXVII.

P r o g n o s i s.

1. *Periculum* phlebitidis a dignitate venae ^{Pericu-} affectae, a statu illius anteriore, a conditione ^{lum.} peculiari aegroti, a duratione morbi et a mendendi ratione pendet. Itaque maxime timenda est phlebitis, si morbus prope venam cavam et portarum, aut in illis ipsis sedem figat; — si venam jam pridem labefactatam aggrediatur; — si homines cachecticos, a doloribus exhaustos; viribusque fractos detineat; si malum locale jam in universale transiverit, sique remedia calefactionis praepostere adhibita fuerint.

2. Nisi phlebitis *resolvatur*; aut *morte* ^{Exitus.} terminatur, aut in venarum *exulcerationem*, *occlusionem* et *dilatationem* ⁹⁷⁾ transit.

3. *Resolutio* phlebitidis expectanda est, dum ^{Resolutio.} cura localis, quominus universum systema in consensum trahatur, impedit, aut, in morbo jam universali reddito, dum lymphæ coagulabilis cruori mixta, per urinam, aut per alia colutoria elimi-

95) Sic BLANOARD (l. c. Cent. II. Obs. 37.) abscessum hepatis detexit, venâ cavâ ascendente pure repletâ.

96) RHODIUS Cent. II. Obs. 32. — P. DE CASTRO, — THOM. BARNHOLINUS Cent. I. hist. 17.

97) Cfr. Cap. XIX.

Frank Prax. II. 2. 2.

eliminatur, aut ad partem quandam corporis aegroti deponitur. Nullibi sane *crises* et *metastases* evidentiores sunt, quam in inflammatione vasorum sanguiferorum. Post perfectam etsi resolutionem phlebitidis, interdum *sensibilitas morbosa* venarum prius affectarum relinquitur *).

Exulceratio.

4. Monuimus interdum secundum curriculum venarum, per phlebotomiam inflammatarum, abscessulos oriri⁹⁸). Porro frequentissime venae exulcerantur, dum illarum inflammatio varicibus superaccedit⁹⁹). Visae praeterea sunt: *vena jugularis interna* exulcerata¹⁰⁰); — *vena cava* prope cor et ad superficiem internam erosa¹); — circa auriculam dextram cordis perforata²); — *vena cava superior* disrupta³); — *inferior* foraminibus

*) PELIKAN l. c. (Femina quaedam post quodlibet animi pathema dolorem per venas extremitatis, antea phlebitide detentae, simul cum venarum prius affectarum turgore, percipere solebat).

98) §. LXXIV. N. 2.

99) Cap. XIX.

100) TRAVERS l. c. p. 255.

1) MORGAGNI Epist. LIII. 37. (In viro laesione externâ derepente mortuo).

2) BELLINUS de morbis pectoris, tit. de internis pulsationibus. — LANCISIUS l. c. — PORTAL *Cours d'anatomie médicale*. T. 3. p. 354. (subsequente haemorrhagia pericardii).

3) DOUBLEDAY *Médec. observat. and inquiries*. Lond. 1776. Vol. 5. p. 144. (In equite qui vertigine correptus ab equo humum cecidit et post 48 horas obiit).

minibus notata ⁴⁾, *venaque azygos* abscessu de-
tenta ⁵⁾. Venas etiam a contiguis ulceribus
erodi posse, docetur ⁶⁾.

5. *Occlusio venarum* contingere potest: 1^o Occlusio.
per parietum *coalescentiam* ⁷⁾. Inflammationis
adhaesione illa sistit effectum, modo salutarem ⁸⁾,
modo nocivum ⁹⁾, modo indifferentem ¹⁰⁾; 2^o

C c 2 per

4) PUCHELT l. c. p. 192.

5) HALLERUS de morbis internis. L. II. C. 25.

6) PUCHELT l. c. p. 190.

7) Exempli leguntur apud BARTHOLINUM Obs. anat.
Cent. II. hist. 35. (vena cava inferior prope cor), —
WINKLER de vasorum lithiasi. Vol. I. §. 6 Not. a
(item), — MORGAGNI Epist. LVI. 10. (vena iliaca),
— HONGERSON l. c. p. 543. (vena iliaca) p. 544. (vena
femoralis), ibidem (vena jugularis interna) *Edinburgh
med. and chirurg. Journal. Vol. 7. p. 407. et Vol. 5.
p. 337. (vena jugularis interna).*

8) Quatenus haemorrhagiae coalescentiae ope cohibentur.
Cfr. Cap. XX. §. LXXXVIII. N. 4.

9) RHODIUS Mantiss. anat. No. XXI. p. 15. (In hydro-
pico venas venales et iliacas oblitteratas invenit), HAL-
LER opusc. pathol. Obs. 20. et Program. de aortae et
venae cavae gravioribus quibusdam morbis (casus
similis).

10) ALBINUS (Acad. annotationes. L. VII. C. 9.) exem-
plum *venae cavae* prope venas iliacas oblitteratae et
cum vertebrae dorsalibus concretae refert, quin aut
viscera pelvis aut extremitates inferiores detrimentum
visibile caperent. Plurimos annos vixit aeger de quo
KNAPE narrat (*HUFELAND's Journal. 36. B. 1. Heft.
p. 122.*) cujusque *vena cava inferior* per inflammatio-
nem et incrassationem membranarum suarum plane

per *parietum incrassationem*; 3° per *coagulum*¹¹⁾, veluti polyposum, quandoque proficuum¹²⁾; 4° per *massam adiposam* perque *medullosam substantiam*¹³⁾; 5° per *concrementa lapidea*¹⁴⁾, *lithiasin*

occlusa erat. 'Apud BAILLIE (*Transact. of a soc. for the improvement of med. Knowledge. Vol. I. p. 127. et ejusdem auctoris: Anatomie d. krankhaften Baues*) legitur de *vena cava* ab ingressu venarum renalium usque ad atrium cordis dextrum ligamentum simulante et nec aëris inflationem admittente.

- 11) HALLEB l. c. Program. p. 6. — Opusc. Obs. 19. (In vena jugulari interna sinistra infra parotidem), MORGAGNI Epist. LVI. 10. (In vena femorali), COATES in *Chapman's Philadelphia Journal* 1822. (in vena cava).
- 12) Teste HODGSON (l. c. p. 534.) venae prope loca gangraenosa coagulo cruento replentur, quod illas a haemorrhagiis tuetur.
- 13) BONTIUS de medicina Indorum 1718. L. IV. Obs. 8. p. 101. (In vena cava inferiore apud hominem, cujus regio umbilicalis pulsationem, illam foetus in utero materno aemulantem, exhibebat), — HODGSON l. c. p. 537. (in vena lienali dilatata nodum veluti scirrhum invenit).
- 14) SCHENK L. II. Obs. 8. (Per venae sectionem ex pede plurimi calculi exiere). Obs. 7. (In vena portarum), — J. G. WALTER Obs. anat. p. XLIV. et Museum anatom. Berolinense 1805. p. 422. (In venis vesicae urinae et uteri), — LOBSTEIN v. CRAUVEILHIER *Essay sur l'anatomie pathologique. T. II. p. 70.* (In venis haemorrhoidalibus, vesicae, et spermaticis), — ROSENMÜLLER v. PUCHELT l. c. p. 210. (In venis vesicae urinae), — DUPUYTREN v. CRAUVEILHIER l. c.

sin venarum confirmantia ¹⁵⁾, et *6° per tumores externos* ¹⁶⁾. Quibus singulis in casibus, *venae collaterales dilatatae, supplere solent* ¹⁷⁾.

§. LXXVIII.

C u r a.

1. In phlebitide a venae sectione originem ^{Morbi lo-}
ducen- ^{calis.}

p. 71. (In vena tibiali anteriore et posteriore), — TRI-
LORIER *ibid.* (In venis cutaneis pedis), — LANGSTAFF
apud HODGSON l. c. p. 536. (In venis uteri et prosta-
tae), — JOHN *Chemische Untersuchungen mineralischer,*
vegetabilischer u. animalischer Substanzen. Berl. 1816.
(In venis uteri) et ego (In venis uteri).

15) *Venae* longe rarius quam arteriae lithiasi subji-
ciuntur. Observata tamen est *lithiasis venarum coronarium*
cordis — a BONETO (v. CRUVEILHIER), BLANCARDO
(l. c. p. 14.), FÜRSTIO (Ephem. Nat. Curios. Dec. II.
A. 10. Obs. 175.); — *venae cavae* prope bipartitionem
in venas iliacas — a BAILLIE (l. c. p. 134.); *venae*
saphenae — a MARCARTNEY (HODGSON l. c. p. 536.);
venae cruralis — a WALTERO (*Anatom. Museum, ge-*
sammelt von J. G. WALTER, beschr. von J. A. WAL-
TER. 1. Th. Berl. 1796.); *venae popliteae* — a MUR-
RAY (Acta medica Suecica. T. I. p. 344.); qui multa
ossicula usque ad truncum venae cruralis observavit.

16) HUNTER (*Med. obs. and inquiries. Vol. 5. p. 333.*)
casum narrat ubi aneurysma aortae venam cavam
superiorem et truncos venarum jugularis et subclaviae
ita comprimebat, ut propriam formam fere amise-
rint.

17) Exempla a HODGSON (l. c. p. 547.) et a PUCHELT
(l. c. p. 201.) enarrantur.

ducente, ante omnia examinandum, num forte apex lanceolae disruptae, inter vulneris labia vel inter venae parietes lateat, quo in casu corpus extraneum abigendum foret. Idem de ligaturis aliisque caussis irritantibus valet. Porro status inflammatorius venae, quo recentior morbus eo securius, ope aquae *frigidae* et *aceti*, ac *diaeta severa*, compescitur ¹⁸⁾. Suadent alii *glaciem*, *acetatem saturni*, *embrocationem*, et maxime *hirudines*, per decursum venae inflammatae apponendae. Nisi id fiat in magna distantia, augmentum irritationis timemus ¹⁹⁾. Aliter sentiunt qui per auctam irritationem, inflammationem adhaesivam membranae internae venae excitare optant, scopo concretionem parietum venae obtinendi, sicque circulo puris cum sanguine obstandi. Ad quem scopum eo certius assequendum, praeterea *compressionem* venae affectae, modo super ²⁰⁾, modo infra ²¹⁾, locum affectum proponunt. Jure vir expertus ²²⁾ hypotheticam istam indicationem rejicit. — Nisi vena adeo conspicua sit, ut ex illius sectione haemorrhagia timeri debeat, nobis potius illius *sectio transversa* ²³⁾ arridet. Tandem quo diuturnior morbus quoque major partium

18) §. LXXV. N. 3 (72).

19) Ibidem.

20) HUNTER l. c.

21) ABERNETHY l. c.

22) HODGSON l. c.

23) BRESCHET et VILLERMÉ l. c. p. 362.

tium affectarum tensio, eo majus erit levamen a
cataplasmatibus emollientibus et narcoticis.

2. *Morbo universali* sese evolvente, quid ^{Morbi}
phlebotomia prope mali focum instituta valeat, ^{universa-}
^{lis.}
 explorandum, reliquo regimine antiphlogistico
 non neglecto. Praeprimis *acida vegetabilia* e. c.
succus citri, acidum tartarosum et, ad alvum
 simul apertam servandam, *tamarindorum* deco-
 ctum, commendari merentur. Necdum de virtute
foliorum digitalis purpureae, hac sub rerum
 positione quid certi pronunciare audemus. Ma-
 jorem fidem in *infusionem stipitum solani dul-*
camarae locamus. In ea nempe versamur opi-
 nione, hoc pharmacum ita specificè in *venas*
 agere, ac supra laudatum in *arterias*. — In-
 gruentibus symptomatibus typhi, secundum regu-
 las generales²⁴⁾, curandum. Si cutis fuerit sicca
 et ardens, pulsusque fortis, durus, *affusio aut*
lotio ope aquae frigidae non negligenda est.
 Alias optatos effectus a minimis *camphorae* do-
 sibus cum *nitrate potassae* obtinuimus. Caveas
 vero a farragine medicamentorum, hìc eo magis
 nocua, cum de morbo, debitas crises, tractu
 solummodo temporis obtinendas, exposcente,
 agatur.

CAPUT

24) P. I. Vol. I. Cap. IV. §. LV.

CAPUT XIX.

De varicibus.

§. LXXIX.

Definitio. Literatura.

Definitio. 1. **T**umor permanens et circumscriptus, compressioni cedens, ea ablata rediens, propria facultate non pulsans, ex venâ justo ampliore, plerumque nodis ex rubro coeruleis distincta, ortus, *varicem* *) constituit.

Literatura. 2. De varicibus scripserunt HIPPOCRATES ¹⁾, GALENUS ²⁾, AETIUS ³⁾, AVICENNA ⁴⁾, MANCINUS ⁵⁾, SEGER ⁶⁾, AGERIUS ⁷⁾, FRANKENAU ⁸⁾, MILLER ⁹⁾, WEDEL ¹⁰⁾,

*) GRAEC. *Κιστός*, LAT. *Varix*, *ramex*, *varicula*.
GALL. *Varices*. *Phlebectasie* (ALIBERT). GERM. *Blut-
aderknoten*. *Krampfadern*.

1) In libro *περὶ ἄλλων*. Sect. XVI. p. 678. edit. LINDENI.

2) De venae sectione. C. 1. — De atra bile. Lib. I. C. 4.
— De tumoribus. C. 16.

3) Tetrab. IV. Sect. 2. C. 84. Sect. 3. C. 10.

4) Canon. Lib. III. Fen. 22. Tract. 1. Cap. 15.

5) Tractatus duo, alter de varicibus, alter de reficiendo naso. Francf. 1586.

6) Diss. de aneurysmate venarum, seu varicibus. Basil. 1661.

7) Diss. de varice. Argent. 1671.

WEDEL ¹⁰), STORCH ¹¹), BORDENAVE ¹²), BALDINGER ¹³), HARRIS ¹⁴), POHL ¹⁵), STAMMELL ¹⁶), GILIBERT ¹⁷), PLOUCQUET ¹⁸), J. P. FRANK ¹⁹), HODGSON ²⁰), BRODIE ²¹), GIROD ²²), MONTFALCON ²³), PUCHELT ²⁴), et quot quot sunt auctores chirurgiae.

§. LXXX.

- 8) De varicum spontanea apertione v. Miscell. Acad. Nat. Cur. Dec. II. A. 3.
- 9) Diss. de varicibus. Altdorf. 1680.
- 10) Diss. de varice. Jenae 1699. Et Miscell. Acad. Nat. Cur. Dec. II. A. 6. p. 220.
- 11) *Krankheiten der Weiber.* 3. B.
- 12) Theses de varicibus. Paris 1762.
- 13) Program. in Aretaeum de venae cavae acuto morbo. Jen. 1771.
- 14) Diss. de varice et aneurysmate.
- 15) Diss. de varice interno morborum quorundam causa. Lips. 1785.
- 16) Diss. de tumoribus varicosis. Mogunt. 1789.
- 17) *Adversaria medico practica prima.* Lugdun. 1791. p. 68.
- 18) Diss. de phleberysmate seu varice. Tübing. 1806.
- 19) *Epitome de curandis hominum morb.* Lib. V. P. II. p. 67.
- 20) Op. c. p. 548.
- 21) *Observat. of the treatment of varicose veins of the legs.* v. *Medico-chirurgic. transact.* Vol. 7. p. 1. p. 195.
- 22) *Deux observations relatives à la cure de varices.* v. *Recueil périodique de la société de méd. de Paris.* T. XX. p. 64.
- 23) *Dictionaire des sciences médic.* T. LVII. p. 1—23.
- 24) Op. c. p. 148.

§. LXXX.

Symptomata. Autopsiae cadaverum.

Sympt.
varic. ex-
tern.

1. *Varices externam corporis superficiem occupantes*, apparent sub forma modo nodulorum racemosorum, modo ramorum, illis qui in lapidum superficiebus vegetabilia aemulantur, similitum, modoque congeriei hirudinum inter se invicem glomeratarum²⁵). Qualiscunque autem varicum externarum fuerit forma, a compressione evanescere eaque ablata resurgere solent. Color est illis ex rubro coeruleus, subniger. Propria non gaudent pulsatione. — Varices plerumque sedem in extremitatibus inferioribus, praecipue ad partem internam crurum, circa malleolos et genua figunt, ac enorme interdum hic volumen acquirunt²⁶). Rarissime in extremitatibus superioribus²⁷), saepius in mammarum scirrhorarum superficie, obveniunt. Quantam varices in morbis cutis scenam ludant, alibi tradidimus²⁸).

„Ubi

25) ALIBERT *Nosologie naturelle*. T. I.

26) HILDANUS varicem vidit, de qua asserit: „crassitie brachium meum ad carpum adaequabat.“ — Pater meus ad crura varices magnitudinis ovi gallinacei habebat. Majores adhuc observavi in aegrotis plicâ laborantibus.

27) Vidi tamen nonnulla exempla quoque in aegrotis plicosis. Describitur casus varicis extremitatum superiorum a PETIT *traité des maladies chirurgicales*. T. 2. p. 49.

28) P. I. Vol. II. Cap. XX. §. LXXXVII. 2. — Cap. XXXIV. §. CXXXIII. 5. — C. XXXVI. §. CXLIV. 2.

„Ubi tela cellulosa varicem laxior circumdat, extenditur facilius venae saccus, donec major distentio, aut fluidi indoles stagnantis²⁹⁾, dolorem³⁰⁾, et phlogosin hic excitet. Sub istis humor puriformis ex venae superficie secretus et in cellulas vicinas effusus, vel pseudoabscessus in istis efformant; vel easdem arcte cum venae dilatatae membranis connectit, crassiores, densiores has reddit, aut cum cute forsitan vicina, strictissime colligat. Cutis ipsa jam dudum a tumore extensa, durior, callosa, hoc in loco, et a statu sanitatis aliena, phlogosis fit particeps; quae, si forsitan verus abscessus nascatur, erosa, disrupta, difficilis curae in ulcus convertitur. Interdum varix, aut nimis extensa, aut illatâ violentiâ rumpitur³¹⁾, et sanguis sub cute in cellulas vicinas effusus ecchymoses constituit; aut ipsa pellis, forte tenuior simul adperitur, nigrumque cruorem — nunc sub aliquo symptomatum levamine, nunc saltem sine damno, nunc vero cum summo aegrotantis, a sanguinis jactura, discrimine eructat“³²⁾.

2. Va-

29) De varice in qua sanguis densatur. v. NESSI *Istituzioni di chirurgia*. T. 2. p. 146.

30) Interdum periodicum. v. PELARGUS *Medicinische Jahrgänge*. 2. B. p. 248.

31) Varix ad dorsum, menstruam secretionem perficiebat (Eph. Nat. Cur. Cent. VII. p. 206.).

32) J. P. FRANK l. c. p. 70.

Sympt.
varic. in-
tern.

2. *Varices internae* pro varia sede varia excitant symptomata, nimirum, ut monuimus, in *encephalo* — dolorem capitis³³), encephalitidem³⁴), apoplexiam³⁵), somnolentiam³⁶), maniam³⁷); in *specu vertebrali* — rhachialgiam³⁸); in *oculis* — circsophthalmiam³⁹), amaurosin⁴⁰); in *trachea* et *pulmonibus*⁴¹) — respirandi difficultatem, tussin, pneumonorrhagiam et phthisin⁴²); et, ut docebimus, in *ore* — stomatorrhagiam; in *oesophago* — dysphagiam; in *ventriculo* — cardialgiam, haematemesin; in *intestinis* — colicam, diarrhoeam cruentam et haemorrhoides; in *vesica* — dysuriam, ischuriam, haematuriam; in *utero* — fluorem album, metrorrhagiam; in *vagina* — coitum cruentum; in *testiculis* — vari-

33) P. II. Vol. I. Sect. 1. Cap. II. §. VIII. 5 (68).

34) ibid. Cap. III. §. XIV. 7 (99).

35) ibid. Cap. V. §. XXIV. 3 (47): „Varices sinuum venosorum minorum durae meningis, sunt rudimenta apoplexiae; saepe tales in fulguratis, sideratis apoplexia inveni.“ GILIBERT l. c. p. LXIX.

36) §. LXXXI. (54).

37) Ibid. Cap. XXV. §. CVII. 2 (24).

38) Op. c. Sect. II. Cap. I. §. III. 4.

39) ibid. Cap. XVIII. §. CV. 28.

40) ibid. Cap. XIX. §. CVIII. (13).

41) De tumoribus sanguineis pulmonum v. Diss. COSCHWITZII in HALLERI disput. academ. T. II.

42) P. II. Vol. II. Sect. I. Cap. IV. §. XVI. 1. — Cap. IX. §. XXXVIII. 2. — Cap. X. §. XLVII. 6.

varicocelen etc. Nec *cor* varicum semper expers ⁴³).

3. Varices delectae sunt: in vena cava ⁴⁴), Autopsiae azygos ⁴⁵), jugulari ⁴⁶), subclaviâ ⁴⁷), iliaca ⁴⁸), cadaverum. portae ⁴⁹), haemorrhoidali ⁵⁰), spermatica ⁵¹) et in vase brevi ⁵²).

§. LXXXI.

43) ALBERTINI in Commentariis Academiae Bononiensis. T. I. p. 389.

44) Acta medica Berolinensia. Vol. VII. Sect. 5. (in maniaco) — BLEULAND Spec. acad. de difficili alimentorum depulsione. Lugd. Bat. v. *Samml. auserles. Abhandlungen f. prakt. Aerzte.* 9. B. p. 73. (in infante quinque annorum) — MORGAGNI Epist. LIV. 37. (in juvene sano ex vulnere perempto) — HUFELAND's *Journal f. prakt. Aerzte.* 5. B. p. 820. (femina dyspnoea, livore faciei et oedemate pedum laborans) — PUCHELT l. c. p. 157.

45) MORGAGNI Epist. XXVI. 29. (in phthisi) — PORTAL *Cours d'anatomie medicale.* T. 3. p. 373. (in viro dyspnoea et hydrothorace laborante).

46) MORGAGNI Epist. VIII. 11. (in maniaco) — HODGSON l. c. p. 553.

47) PORTAL l. c. p. 354. 373.

48) BONET Sepulchr. anatom. Lib. VI. Sect. 3. Obs. 22.

49) STAHL vena portarum, porta malorum (saltem suspicio).

50) VESALIUS de fabrica corporis humani. Lib. H. Cap. XV. p. 662.

51) DYSON *Memoirs of the medical society of London.* Vol. 3. Lond. 1792. p. 556.

52) WEDEL Physiologia reformata. — STANGE v. STAHL l. c. p. 29. — LIEUTAUD *Historia anatom. medica.*

§. LXXXI.

C a u s s a e.

Praedispo-
nentes.

1. Varix, interdum congenita ⁵³), saepe haereditaria ⁵⁴), sexui femineo ⁵⁵), senibus, hominibus vitam sedentariam ducentibus, aut opificia stante pede perficientibus ⁵⁶), plicosisque praecipue addicta est.

Excitan-
tes.

2. *Excitant* varices graviditas ⁵⁷), partus ⁵⁸).

53) CORTIER *Précis d'observations de chirurgie. Lyon* 1802. p. 134. v. *Samml. auserl. Abhandlungen f. prakt. Aerzte.* 21. B. 2. St. p. 149.

54) „Senem nobilem Bruchsaliae cognovi (Liber Baro net. Deyring) fere perpetuo somno correptum, caeterum sanum, cui omni fere anno varices rumpebantur sponte ad crura, cum magno levamine. *Filius* hujus viri, non minus fuit somnolentus, cum varicibus faciei.“ Ex Schedis Patris mei; qui ipse, ut dixi magnis varicibus crurum laboraverat, quas et ego licet longe minori hucusque in gradu, patior.

55) Feminas etiam praeter graviditatem varicibus obnoxias esse; rite monet STORCH l. c. p. 103.

56) „... on voit souvent des varices à l'hôpital de St. Louis, sur des maçons, des soldats, des danseurs et corde.“ MONTFALCON l. c. p. 13.

57) HAASE diss. de gravidarum varicibus. Lips. 1788. — BIRKHOLZ de quibusdam gravidarum varicibus Lips. 1782. — LÜTZELBERGER diss. de symptomatibus quibusdam gravidarum, praecipue de varicibus et oedemate pedum. Jenae 1791. — BH. II. BRASSE diss. de varicibus, praesertim gravidarum. Berol. 1819. tab. aen.

tus ⁵⁸⁾, faeces durae in intestinis collectae ⁵⁹⁾, cibus nimius et flatus illa distendentes, fasciae et vestes corpus arcte circumdantes ⁶⁰⁾, contusiones, fracturae, exostoses, fumus carbonum sub vestibus evolutus, ignis caminorum cruribus prope admotus, glandulae mesenterii, pulmonum volumine auctae, vitia cordis aliorumque viscerum, respiratio, per cantum, flatum tubarum, longa oratione, suspensa; ponderum gestatio ⁶¹⁾ et animi pathemata ⁶²⁾.

3. *Causam proximam* varicum alii in san-Proxima.
guine pigro, crasso ac denso, melancholico et atrabilario ⁶³⁾, alii in systematis venosi debilitate, alii in mechanica parietum venarum dilatatione, alii in praegressa phlebitide, quaerunt. Ultimaee opinioni maxime faventes, reliquas tamen non plane excludimus.

§. LXXXII.

Diagnosis. Prognosis.

1. Dilatationem venarum *fugacem*, causâ ^{Diagno-}
caloris, motus, impedimenti transitorii cruoris
ortam ⁶⁴⁾,

58) Exempla varicum, sub ipso partus opere natarum, habentur apud STORCH l. c.

59) THOM *Erfahrungen und Bemerkungen*. p. 51.

60) J. P. FRANK l. c. p. 75.

61) „In bajulorum et gravidarum tibiis, inquit GILBERT, *varices nodosae* observantur“ l. c.

62) ALBERTINI l. c. p. 388.

63) *Opinio veterum*.

ortam ⁶⁴⁾, a permanente illa, quae varicibus propria est, distinguere vellemus. Distinctionem autem inter *dilatationem venae* et *varicem* ⁶⁵⁾, utpote lusu verborum et falsis praëmissis superstructam, arbitrariam et utilitate destitutam, non admittimus. Magni vero momenti divisionem varicum, in *externas* et *internas*, inque illas quae ex vitio aut *universi systematis venosi*, aut *partis illius* oriuntur, facimus. In varice externa dijudicanda *varicis aneurysmaticae* ⁶⁶⁾ memores esse juvabit. *Varicum internarum* suspicio alitur, ubi partem externam, cum internis, continuam, venulis varicosis obtectam, ac symptomata visceris aegroti, quae facile huic caussae tribuantur, conspiciamus ⁶⁷⁾.

2. Va-

64) „Praeter mechanicas passivas, inquit GILBERT, aliam speciem novi, et novit STAHLIUS, in qua (varice) vera adest energia naturae, in hystericis observanda. In hoc casu varices numerosae inveniuntur in cruribus, brachiis, prorsus evanidae post aliquot dies.“ l. c.

65) PUCHELT (l. c. p. 174.) sequentem distinctionem stabilivit: in *dilatatione venarum* 1° tumor cylindricus, 2° sedes in venis majoribus, 3° malum indolens, 4° partes vicinae in consensum haud trahuntur et 5° morbus chronicus. In *varice*: 1° tumor globosus, 2° sedes in venis minoribus, 3° malum dolens, 4° in partibus vicinis rubor et tumor excitatur et 5° morbus acutus.

66) Cap. XVI. §. LXV. N. 1. (94).

67) J. P. FRANK (l. c. p. 72.) addit: „Frequenter in

2. *Varices externae* parvae, ac a caussis ^{Prognosis.} localibus venientes ⁶⁸), pericula vix minantur et aliquando critica sunt ⁶⁹), et calvitiam impediunt ⁷⁰):

senibus, copiosis oculi albugineam varicibus obsessam, ac morbi soporosi, apoplexiae imminuentis vestigia simul observavimus: ubi facile ad eandem venarum cerebri, quam oculorum ea apparuit, conditionem conclusimus. Sub dysphagia, cardialgia, vomitu chronico, interdum cruento, inprimis periodico, quorum aliam, quae magis satisficiat, rationem non detegimus; ubi venulae pharyngis quamplurimum varicosae cernuntur, — si eundem venarum oesophagi ventriculi statum esse suspicamur, non semper a vero aberrabimus. In colicis doloribus, tensione abdominis, si recti intestini venas turgere videamus, aliarum caussarum defectu, non sine fundamento ad abdominis infarctum localem venosumque concludimus. Sub tumente ex venis haemorrhoidalibus recto, si urinae vel retinendae, vel mittendae difficultas periodice recurrat, sat aequo iudicio in venarum, quae vesicam, aut istius cervicem exornant, habitu varicoso, aut saltem infarctu sanguineo, morbi causam collocabimus.“

68) e. c. in gravidis: „partu absoluto hae varices disparent; sed frequentior, brevi spatio annorum graviditas, has denuo venas in tumorem attollit.“ J. P. FRANK l. c. p. 74.

69) Memorabilis est aphorismus HIPPOCRATIS (Sect. VI. Aph. 21.): „insanis, si *varices* vel haemorrhoides supervenerint, insanire solutio.“ Confirmatur iste aphorismus praecipue ab observationibus ROLEFINKII in med. consil. Lib. II.

Frank Prax. II. 2. 2.

Dd

diunt ⁷⁰⁾: secus autem magnae et cum morbis universi systematis cohaerentes. Hae enim si negligantur, haemorrhagiis interdum lethalibus ⁷¹⁾, et, praeviis repetitis inflammationibus, ulceribus varicosis ⁷²⁾, fungo, imprimis haematodi, ansam praebent. *Internae varices* pro loci, quem occupant, pro caussae unde descendunt, ac pro suae extensionis ratione, periculi plerumque plenae sunt ⁷⁴⁾. Caeterum in varicibus, tum externis tum internis, natura, veluti in aneurysmatibus, pericula interdum arcet ⁷⁵⁾.

§. LXXXIII.

70) „Quicumque calvi sunt, his varices magnae non fiunt. Quibuscunque vero calvis varices accedunt, hi rursus hirsuti sunt.“ HIPPOCRATIS Aph. Sect. VI. Aph. 34. — Pater meus in juventute galericulum capiti adoptaverat, in senio, magnis comparentibus, ut dixi, varicibus, illud rejicere potuit. Ipse magnam ad calvitiam dispositionem quondam habui, ast quod magis nunc in cruribus meis varices evolvuntur, eo magis mihi crines, saltem ad occiput, succrescunt. — Nexus inter varices et crines etiam in plicosis animadvertitur.

71) Mortem subitanam ex rupta varice pedis in grvida observavit STORCH (l. c. p. 109. 110.) ac similem casum ex GERMANNI observatione (Miscell. nat. cur. Dec. I. A. 3. Obs. 204.) refert de grvida.

72) HEISTER Institut. chirurg. P. II. p. 1101. — BERNSTEIN *Handbuch für Wundärzte*, verbo, *varix*.

74) BAGLIVI Prax. med. Cap. XI. de occultis et lethalibus viscerum varicibus.

75) Pulchre ait GILBERT (l. c.): „In aliis (varicibus)

§. LXXXIII.

C u r a.

1. *Curam varicum externarum* chirurgis ^{Varicis} ^{externae.} relinquimus cum monitu, eas non esse dispellendas, dum cum vitio universi systematis cohaerent ⁷⁶). In genere quaevis externa varix, nisi doleat, aut exercitio functionis cujusdam obstet, naturae committenda est. Attamen si nimis alicubi promineat, cum lamina aut plumbea, aut chartacea ⁷⁷), superimposito huic emplastro, obtegi potest. Forte etiam *argilla* adhiberi mereatur. Ubi tumor ruptionem minatur, fasciae vino madidae involvitur ⁷⁸). *Tibialia* ex pelle, quae ad libitum stringi et relaxari queunt, adhibemus. Suadentur quoque *lotiones adstringentes* *)

D d 2

alu-

etiam natura sicuti in aneurysmatibus, *sacrum illinit stratis lymphaticis, densis, quae rupturam impediunt.*

76) Non semper tutum esse varices dispellere, monuit STORCH (l. c. p. 107.) ex hypothesi quidem, quod natura materiam morbosam in illas deponat; meretur tamen res ipsa, ob alias rationes, medicorum attentionem. Cfr. P. III. Vol. I. de haemorrhoidibus ani.

77) GERMANICE *Pappendeckel*.

78) STORCH l. c. ETTMÜLLER Opp. T. II. p. 814.

*) DÜRR in HUFELAND's *Journ. d. pr. Heilk.* 1823. Mai. p. 47. (Adversus varices gravidarum: R. Corticis ulmi camp. Rad. tormentillae aa unc. unam. coq. c. Vino rubro. Sub finem adde herb. Cicutae unc. unam. col. libr. unam adde sacch. saturni drachmam unam cum dimidia. Spir. formic. uncias quatuor.

alumen purum ⁷⁹⁾, *sal ammoniacum* ⁸⁰⁾, *venae sectio* ⁸¹⁾, *varicis punctio* ⁸²⁾, *incisio* ⁸³⁾, *excisio* ⁸⁴⁾ et *ligatura* ⁸⁵⁾. Vitâ periclitante, nisi *compressio varicis* sufficiat, illi *ferrum candens* ⁸⁶⁾ applicandum.

Varicis internae.

2. *Varicum internarum cura*, praeceptis, sanguinem a loco affecto revellendi, venae rupturam impediendi, aut, si ea jam facta sit, illius obliterationem promovendi, innititur. Quo pacto istis indicationibus, modo per *venae sectionem* et *hirudines*, modo per *resolventia* et *eccoproctica*, modo

M. — Formula haec saltem simplicitate non peccat!).

79) „R. Aluminis, salis communis, fructuum acaciae.

Haec coque in aceto acerrimo. Spongia hoc acetone ebria pro fomento applicetur, mane et vesperi, loco varicoso et ita arctissime deligetur per mensem intergrum. Postmodum, ubi exsiccatae apparent varices; removenda est spongia et solum stricte per quinque vel sex menses locus varicosus est ligandus, donec omnino dispareat.“ ETTMÜLLER l. c.

80) RICHTER's *chirurg. Biblioth.* 4. B. p. 541.

81) In varicibus sanguinem mittebat HEISTER (l. c.) victus regimen ordinabat et fasciam repellentem. Sine hac, varices meae, quoties venam saphenam aperire curo, eo in latere imminuuntur.

82) ETTMÜLLER l. c. (cum acu aurea, aut argentea).

83) PETIT l. c.

84) CELSUS Lib. VII. Cap. 4.

85) EVERARD HOME, TRAVERS.

86) CELSUS l. c. „Vena omnis, ait, quae noxia est, aut *adusta* tabescit, aut manu exciditur.“

modo per *adstringentia* et *tonica* satisfaciendum sit, in cura morborum cerebri, medullae spinalis, oculorum, tracheae et pulmonum docuimus, et in illa morborum tubi intestinalis, viscerum uropoieticorum et partium genitalium, docebimus.

CAPUT XX.

De haemorrhagiis.

§. LXXXIV.

Definitio. Literatura.

1. Sanguis cum vehementia et celeritate, *Definitio.*
vel exterius, vel in corporis cavum prorumpens,
*haemorrhagiam**) constituit. Idem phaenomenon,
quatenus sine impetu, copiâ minore et guttatim,
praeter leges sanitatis contingit, *sanguinis stilli-*
cidium dicitur.

2. Haemorrhagarum doctrinam explanarunt *Literatu-*
DOLDIUS¹⁾, NEUDORFER²⁾, CAIUS³⁾, MATIS-^{ra.}

PERGER⁴⁾,

*) A GRAEC. αἷμα, sanguis, et ἐγγυμαι, erumpo. LAT. Sanguifluxus. GERM. Blutflüsse. GALL. Hémorrhagies. ANGL. Haemorrhages, flux of blood.

1) Diss. de omni sanguinis profluvio. Basil. 1594.

2) Diss. de haemorrhagia, seu fluore sanguinis. Basil. 1597.

3) Diss. de sanguinis effusione. Venet. 1607.

PERGER ⁴⁾), MÜLLER ⁵⁾), GÜNTHER ⁶⁾), PAULIS ⁷⁾,
 FINK ⁸⁾), MICHAELIS ⁹⁾), SCHLEGEL ¹⁰⁾), MOEBIUS ¹¹⁾,
 KOZAK ¹²⁾), AMMANN ¹³⁾), BORRICHIIUS ¹⁴⁾), MEIBO-
 MIUS ¹⁵⁾), LANGIUS ¹⁶⁾), VERRYIN ¹⁷⁾), MEMMIUS ¹⁸⁾,
 EDAMS ¹⁹⁾), PINKER ²⁰⁾), HEUSCH ²¹⁾), VAN DER
 BERGH ²²⁾), STAHL ²³⁾), BIERMANS ²⁴⁾), HELVE-
 TIUS ²⁵⁾), FR. HOFFMANN ²⁶⁾), ALBERTI ²⁷⁾, BÜ-
 TZER ²⁸⁾,

4) Diss. de haemorrhagia. Basil. 1620.

5) Diss. de haemorrhagia. Tübing. 1625.

6) Diss. de haemorrhagia. Lipsiae 1627.

7) Diss. de haemorrhagia. Hafn. 1629.

8) Diss. de haemorrhagia. Hafn. 1629.

9) Diss. de haemorrhagiis. Lipsiae 1636.

10) Diss. de haemorrhagia. Jenae 1640.

11) Diss. de haemorrhagiis ejusque speciebus principa-
 libus. Lips. 1652.

12) De haemorrhagia. Ulm. 1666.

13) Diss. de haemorrhagia. Lips. 1667.

14) Diss. de haemorrhagia. Hafn. 1682.

15) Diss. de haemorrhagiis. Helmst. 1684.

16) Diss. de haemorrhagiis. Lips. 1685. Opp. Vol. III,
 p. 224.

17) Diss. de haemorrhagia. Leid. 1687.

18) Diss. de haemorrhagiis. Basil. 1690.

19) Diss. de haemorrhagia in genere. Leid. 1692.

20) *Vom Blutfluss*. Dresden 1701.

21) Diss. de haemorrhagia. Leid. 1703.

22) Diss. de haemorrhagia. Lugd. Bat. 1704.

23) Progr. de consulta utilitate haemorrhagiarum. Hal.
 1704.

24) Diss. de haemato et haemorrhagia. Leid. 1704.

25) *Traité des pertes de sang*. Paris 1706. 2. édition.

26) De haemorrhagiarum genuina origine atque cura-

TZER ²⁸), HAGEMANN ²⁹), GOEBEL ³⁰), WEDEL ³¹),
 DE PRÉ ³²), JUCH ³³), JUNKER ³⁴), GAELIKE ³⁵),
 SCHWARZMANN ³⁶), CRELL ³⁷), HIERONYMUS ³⁸),

HEBEN-

ione ex principiis mechanicis. Hal. 1697. — Diss.
 compendiosa et clinica praxis haemorrhagiarum cum
 cautelis. Hal. 1708.

27) Diss. pathologica haemorrhagiarum. Hal. 1704. —
 Diss. de haemorrhagiis criticis. Hal. 1710. — Diss.
 de adstringentium perverso usu et effectu in haemor-
 rhagiis. Hal. 1729. — Diss. de haemorrhagiarum
 statu praeternaturali. Hal. 1735. — Diss. de haemor-
 rhagiarum complicatione. Hal. 1752.

28) Diss. de haemorrhagiis in genere. Harder. 1712.

29) Diss. de haemorrhagiis in genere. Regionmont. 1713.

30) Diss. de haemorrhagia generatim et speciatim na-
 tium. Ulraj. 1717.

31) Diss. de haemorrhagia. Jen. 1718.

32) Diss. de haemorrhagiis in genere. Erf. 1721. —
 Diss. de natura prudentia medica dirigenda. Erf.
 1725.

33) Diss. de haemorrhagia. Erf. 1729. — Diss. con-
 sideratio haemorrhagiarum, tam ad theoriam quam ad
 praxin. Erf. 1735.

34) Diss. de motuum augmento, post haemorrhagias
 tam naturales quam artificiales, saepius observando.
 Hal. 1734. — Diss. de haemorrhagiis naturalibus ge-
 neratim consideratis. Hal. 1739. — Diss. de quadrup-
 lici haemorrhagiarum naturalium respectu. Hal.
 1746.

35) De vera methodo curandi haemorrhagias spontaneas
 excedentes. Francf. ad Viadr. 1741.

36) Progr. de haemorrhagiis naturalibus et morbis cum
 iis cohaerentibus. Mogunt. 1742.

HEBENSTREIT ³⁹⁾, BÜCHNER ⁴⁰⁾, STENHUYS ⁴¹⁾,
 VAN WAGENINGER ⁴²⁾, KALTSCHNID ⁴³⁾, BAUMER ⁴⁴⁾,
 BOEHMER ⁴⁵⁾, CALVET ⁴⁶⁾, KOCH ⁴⁷⁾, SCHOEN-
 METZEL ⁴⁸⁾, GMELIN ⁴⁹⁾, LUDWIG ⁵⁰⁾, KIRK-
 LAND ⁵¹⁾,

37) Diss. de sanguinis jactura. Helmst. 1744.

38) Diss. de haemorrhagiis. Erford. 1748.

39) Progr. specimina XVII. de haemorrhagiis criticis.
 Lips. 1749.

40) Diss. consideratio generalis pathologiae haemorrhagiarum. Hal. 1750. — Diss. de notis haemorrhagias praesagientibus. Hal. 1755. — Diss. de salubritate haemorrhagiarum in mitigandis deliriis. Hal. 1756. — Diss. de difficultatibus circa promotionem haemorrhagiarum naturalium obviis, earumque causis. Hal. 1757.

41) Diss. de haemorrhagiis in genere. Groening. 1753.

42) Diss. de haemorrhagiis spontaneis in genere. Lugd. Bat. 1754.

43) Diss. de methodo haemorrhagias vulnerum sistendi. Jen. 1756.

44) Diss. de eo quod in haemorrhagiis proprium est et commune. Erford. 1758.

45) Diss. de haemorrhagia suppuratoria. Hal. 1759.

46) Diss. de haemorrhagiis internis. Avenioni. 1761.

47) Diss. de spiritu vini rectificatissimo, tanquam medicamento ad sistendas haemorrhagias optimo. Hal. 1762.

48) Diss. de haemorrhagiis. Heidelberg. 1762.

49) De probato tutoque usu interno vitrioli ferri factitii adversus haemorrhagias spontaneas largiores. Tübing. 1763.

50) Progr. de nimis haemorrhagiis, causa debilitatis in morbis. Lips. 1763.

LAND ⁵¹⁾, BOHN ^{*)}, TESSORI ^{**)}, REBENSCHIED ⁵²⁾,
 STRUVE ⁵³⁾, KOSTER ⁵⁴⁾, NONNE ⁵⁵⁾, LINNAEUS ⁵⁶⁾,
 BALDINGER ⁵⁷⁾, NIEMANN ⁵⁸⁾, STEIDELE ⁵⁹⁾, KRAU-
 SE ⁶⁰⁾, DOUGALL ⁶¹⁾, SAYERS ⁶²⁾, MAYER ⁶³⁾,
 SZKROCHOWSKI ⁶⁴⁾, RITTER ⁶⁵⁾, TAYLOR ⁶⁶⁾,
 SCHMIDT ⁶⁷⁾,

51) *Essay on the method of suppressing haemorrhagies from divided arteries.* Lond. 1763.

*) *Diss. de haemorrhagia.* Lips. 1764.

**) *Sanguinis fluxus multiplex.* Venetiis 1765.

52) *Diss. de diversis sanguinem sistendi artificiiis.* Duisburg. 1766.

53) *Diss. de haemorrhagiis.* Kiloniae 1766.

54) *Verhandeling over bloedstorting.* Leyd. 1768.

55) *Diss. an in haemorrhagiis lenia purgantia prosint?* Erford. 1768.

56) *Diss. de haemorrhagiis ex plethora.* Upsal. 1772. v. Amoen. Acad. Vol. IX. N. 181.

57) *Diss. haemorrhagiarum therapia.* Jenae 1772.

58) *Diss. de potentia animata morbifica, variarum haemorrhagiarum causa.* Hal. 1772.

59) *Abhandlung von Blutflüssen.* Wien 1776.

60) *Diss. de haemorrhagiarum pathologia.* Lips. 1777.
 — *Diss. de remediis haemorrhagiarum externarum.* Lips. 1778.

61) *Diss. de haemorrhagiis.* Edinb. 1778.

62) *Diss. de haemorrhagia.* Edinb. 1782.

63) *Diss. saluberrimus aquae frigidae externae applicatae in sistendis haemorrhagiis internis.* Francf. ad Viadr. 1783.

64) *Diss. de haemorrhagia.* v. EYREL diss. STOLLII. Vol. I.!

65) *Diss. de haemorrhagiarum pathologia, semiologia et therapia in genere.* Marb. 1785.

SCHMIDT ⁶⁷⁾, FELIX ⁶⁸⁾, BIRG ⁶⁹⁾, LANGFORD ⁷⁰⁾,
 ENGELHART ⁷¹⁾, FR. HUFELAND ⁷²⁾, KLOSE ⁷³⁾,
 KRIMPING ⁷⁴⁾, PANZANI ⁷⁵⁾, BOEHMER ⁷⁶⁾, HAL-
 LER ⁷⁷⁾, KLEVESAK ⁷⁸⁾, VOGEL ⁷⁹⁾, KLINGHARZ ⁸⁰⁾,
 GARNIER ⁸¹⁾, KERSEL ⁸²⁾, REY ⁸³⁾, CHRÉTIEN ⁸⁴⁾,

JUSSE-

- 66) Diss. de haemorrhagiis. Edinb. 1787.
 67) Diss. de varia haemorrhagias dijudicandi ratione.
 Helmst. 1788.
 68) Ep. de haemorrhagia pro critica evacuatione aesti-
 manda. Viteb. 1789.
 69) Diss. remedium glutinosorum in sistendis haemor-
 rhagiis vis et virtus. Hal. 1791.
 70) Diss. de haemorrhagiis. Edinb. 1791.
 71) Diss. de haemorrhagiis. Lundunae 1794.
 72) Diss. sistens pathologiae atque therapiae haemor-
 rhagiarum adumbrationem. Jen. 1795.
 73) Diss. profluvii sanguinis pathologia et therapia ge-
 neralia. Francf. ad. Viadr. 1797.
 74) Diss. de haemostaticis mechanicis. Hal. 1797.
 75) *Considerazioni patologiche intorno alle cause e feno-
 meni dell'emorragie. Venezia 1799.*
 76) Diss. pathologica haemorrhagiarum in universum
 spectata. Viteb. 1799.
 77) Diss. de haemorrhagiis. Helmst. 1800.
 78) Diss. de fluxionibus sanguinis. Gies. 1800.
 79) *Handbuch zur Kenntniss und Heilung der Blutflüsse.*
Stendal 1801.
 80) Diss. de signis haemorrhagias praesagientibus. Erf.
 1802.
 81) *Dissertation sur les hémorragies considérées en géné-
 ral. Paris 1802.*
 82) Diss. de haemorrhagiis in universum. Jenae
 1802.

JUSSERANDOT⁸⁵), MEYER⁸⁶), TRESLING⁸⁷), WOLLKOPF⁸⁸), SPANGENBERG⁸⁹), JONES⁹⁰), HELCH⁹¹), BOUX⁹²), LEGOUES⁹³), LORDAT⁹⁴), LATOUR⁹⁵), PINEL et BRICHETEAU⁹⁶), BOYER⁹⁷), W. REHM^{*}) et F. W. K. SCHULZ^{**}).

§. LXXXV.

- 83) *Essai sur les hémorragies produites par des causes externes.* Paris 1803.
- 84) *Essai sur les hémorragies actives, considérées chez l'enfant, l'adulte, et le vieillard.* Paris 1803.
- 85) *Essai sur les hémorragies actives du système muqueux.* Paris 1804.
- 86) *Systematisches Handbuch zur Erkenntniß und Heilung der Blutflüsse.* Wien 1804.
- 87) *Diss. de sistendis haemorrhagiis.* Groen. 1804.
- 88) *Untersuchungen über die Erscheinung, Bildung und Heilung der Blutflüsse.* Leipz. 1805.
- 89) *Ueber die Blutflüsse in medicinischer Hinsicht.* Braunschweig 1805.
- 90) *Treatise on the process employed by nature in suppressing the haemorrhage from divided and punctured arteries, and on the use of ligature.* London 1805.
- 91) *Ueber das Wesen der Heilung der Haemorrhagien.* Kopenhagen 1806.
- 92) *Quelques considérations sur les hémorragies par lésion physique des vaisseaux.* Paris 1807.
- 93) *Essai sur les hémorragies.* Paris 1808.
- 94) *Traité des hémorragies.* Paris 1808.
- 95) *Histoire philosophique et médicale des causes essentielles immédiates ou prochaines des hémorragies.* Orléans 1815.
- 96) *Dictionnaire des sciences médicales.* T. XX. p. 339.
- 97) *Ibidem* p. 371.
- *) *Diss. momenta quaedam ad pathologiam et nosolo-*

§. LXXXV.

*Symptomata. Autopsiae cadaverum.*Sympto-
mata pro-
droma.

1. „Dum haemorrhagiae non illico ingruunt, ad ea quae oculis patent loca, *congestio*, venarum inflatio, intumescencia levis, aut rubor longe lateque circa partem, ex qua sanguis prodibit, observantur; atque tum his in locis tum ad partes profundas ac nobiles, quae sanguinem expellent, plenitudinis, repletionis molestae, tensionis, titillationis, pruritus, caloris sensus, — interdum certus horroris gradus, cui calor, pulsus frequens, plenus, subdurus ac vere febrilis succedunt, observantur“⁹⁸⁾.

Sympto-
mata con-
stituentia.

2. „Pro ipsius vero sauciati canalis hiatu, ac fugientis vitalis undae diametro, celeritate ac impetu diversis, — pro varia partis, quae sanguinem aut rejecit, aut, effusum, coacervat, indole, functione, — pro causae, quae profluvium induxit, diversitate, — pro sexus, aetatis, constitutionis ratione, alia aliaque, sub hac *praesentis* haemorrhagiae periodo, *symptomata* nascuntur“⁹⁹⁾. Ubi gravior urget cruoris jactura;

mox.

giam haemorrhagiarum venosarum spectantis. Marb. 1816.

**) Diss. de haemorrhagiis, ischaemiam supplantibus, adnexa hist. morbi, singularem casum exhibente haemathidroseos et gastrorrhagiae vicariae. Vratisl. 1822.

98) J. P. FRANK Epitome. Lib. V. P. II. p. 95.

99) ibidem p. 97.

mox summa anxietas suboritur; succedunt visus obnubilatio, oscitationes frequentes, vomitus, tinniunt aures; lipothymiae et facile convulsiones scenam claudunt lethales. Sanguis ita amissus interdum est solito spissior, aut fluidior, quin tamen analysis chemica differentiam in partibus ejus constitutivis demonstrare hucusque potuerit ¹⁰⁰). Quanta nonnunquam cruoris copia amittatur, ex doctrina speciali haemorrhagiarum elucet ¹).

3. Ex specialibus quoque haemorrhagiarum tractatibus, phaenomena per autopsiam ^{Autopsiae} cadaverum ^{cadaverum.} emergentia, elucet. Elucet nimirum, modò arterias, modo venas, modo utrasque sanguinem largiri, et quidem saepe sine illorum vasorum erosione ²). Dari cadavera, sanguinem fundentia, fasti medici docent ³).

§. LXXXVI.

100) DEYEUX et PARMENTIER *sur l'analyse du sang.*

1) P. II. Vol. I. Sect. II. Cap. XXVII. §. CXXXV. 2. —
P. II. Vol. II. Sect. I. Cap. IX. §. XXXVIII. 1.

2) BICHAT (*Anatomie générale. T. 2. Paris 1801. p. 563.*) ait: „J'ai très souvent ouvert des sujets morts pendant une hémorragie; j'ai eu occasion d'examiner, sous ce rapport, les surfaces bronchiques, stomâcales, intestinales et utérines; jamais la moindre trace d'érosion ne m'y a paru sensible, malgré la précaution de laver exactement les surfaces, de les laisser macérer et de les examiner même à la loupe.“

3) RIEDLIN *Millenarius. N. 983. — Eph. Nat. Cur. Dec. III. A. 4. Obs. 31. — GARMANN de miraculis*

§. LXXXVI.

C a u s s a e.

Praedispo-
nentes.

1. *Disponunt* ad haemorrhagias, conditio
peculiaris corporis ⁴⁾), saepe haereditaria ⁵⁾), tem-
poral

mortuorum. — HAGENDORN Cent. III. Obs. 45. —

PELARGUS *medizinische Jahrgänge*. 3. B. p. 377.

- 4) Ex levibus vulneribus magnae haemorrhagiae descri-
buntur a FORDYCE (*Sammlung auserl. Abhandl. f. pr.
Aerzte*. 11. B. p. 477.). Sic filius quatuor annorum
Dni. KRASSOWSKI, Adjuncti universitatis Vilmensis,
quoties illi hirudo una alterave apponitur, toties in
haemorrhagias vitae insidias struentes incidit. Letha-
les a hirudinibus haemorrhagiae describuntur in *Actis*
R. Societ. Havniensis. Vol. II. Obs. 126. — in *Ephem.*
Nat. Cur. Dec. II. A. 2. Obs. 142. Cfr. etiam HEIM
in HORN's *Archiv f. med. Erfahrung*. 1810. Novembr.
p. 339. PAULET in *Journal gén. de méd.* T. XXXII.
p. 269. — Quisne infantes et feminas non cognosce-
ret, in quibus ex levissimo etiamsi attactu, haemor-
rhagiae illae cutaneae nascuntur, quae *ecchymomata*
dici solent? — Altera ex parte homines observantur,
qui ipsas graves laesiones, sine sanguinis jactura, su-
stinere valent; e. c. evulsionem manus (Nov. actae
Nat. Cur. T. IV. Obs. 51.), et brachii (*Philosophical*
Transact. N. 449. — *Mém. de la société médic. d'emu-*
lation a. V. p. 216.), laesionem arteriae (*Philosoph.*
Transact. Vol. LX.) etc.

- 5) De haemorrhagiis per plures generationes protractiss
lege OTTO *Account of one haemorrhagic disposition ex-*
isting in certain families, in the med. and physic Journ.
for 1808. July. et HUFELAND's *Journ.* 1810. May p.
116. atque Sept. p. 124. Cfr. NASSE in HORN's *Ar-*
chiv f. med. Erfahrung 1820. 1. B. p. 385 — 434.

pora aequinoctialia ⁶⁾, certae annuae constitutiones ⁷⁾, sexusque sequior. Cuique porro aetati speciales haemorrhagiae propriae sunt ⁸⁾.

2. Ex

6) FR. HOFFMANN med. rat. systema. T. IV. P. 2. §. 4.

7) Et ego observationem MELITSCHII (STARK's *Archiv f. die Geburtshülfe*. 3. B. 4. St.) haemorrhagias interdum *epidemice grassari*, confirmatam habeo. Quoties id acciderat, erat atmosphaera praeter modum aut sicca aut humida. Suspicio hinc *electricitatem* hac in re praecipuam scenam ludere. Atque hic desiderium, ut experimenta circa electricitatem sanguinis et illius cum electricitate atmosphaerica rationem, ulterius prosequantur, reticere nequeo. Si enim verum sit, quod VASALLI (v. BELLINGERI *sulla elettricità del sangue nelle malattie* — in *Annali di medicina compilati dall' OMODEI* 1819. *Aprile*) contendit: 1° sanguinem generatim habere electricitatem positivam illamque solum vigentibus inflammationibus cum negativâ commutare, — 2° sanguinem plus quam par est electricitatis possidentem corium laud formare, — et 3° sanguinem parum electricum partem fluiditatis suae amittere, ideoque magis spissum et tenacem evadere; — haec, inquam, si vera sint, amplius pro phaenomenis in congestionibus, inflammationibus et haemorrhagiis obviis, explicandis aperitur campus. Utinam ille a zizaniis, hypothesibus videlicet, liber manere possit!

8) „Sic pueris, nasus, — juvenibus, pulmones, ventriculus, — alvus, vesica, adultis, cruorem facilius, quam partes aliae fundunt. Jam senes, iterum ad nares, sed maxime ad cerebrum . . . sanguinem emittunt.“ J. P. FRANK l. c. p. 94. — Aurea verba de morbis aetatum HIPPOCRATES (Sect. III. Aph. 27. 29. 30.) protulit.

Excitan-
tes.

2. Ex speciali haemorrhagiarum doctrina palam fit illas *excitari* a caussis quae vasa sanguinea aut mechanice⁹⁾, aut chemice¹⁰⁾, aut modo mixto, laedunt; — ab obstaculis quae liberam et aequalem cruoris per universum corpus distributionem impediunt; — a plethora¹¹⁾, a potu liquorum fermentatorum¹²⁾, a calore¹³⁾ et frigore¹⁴⁾, inprimis aestuante corpore suscepto, ab aëris raritate¹⁵⁾, a cursu, saburris, bile, vermibus intestinalibus, contagiis, febribus, exanthematibus, a methodo alexipharmaca¹⁶⁾, seu.

exci-

9) E. c. *scarificationes*, lethali cum eventu institutae: (Eph. Nat. Cur. Cent. IX. Obs. 8.).

10) E. c. *arsenicum* (HILDENBRANDT in HORN's *Archiv. f. med. Erfahrung.* 1811. Sept. p. 317.).

11) Sic maxima testatur medicorum pars.

12) Vere monuit STAHL (l. c.) haemorrhagias non sub ipsa ebrietate, sed altero demum die, postquam universus impetus quorumlibet reliquorum e vino incommodorum satis requisite subsedit, contingere.

13) E. c. *balneorum* (RITTER in HUELAND's *Journal der pr. Heilk.* 7. B. 3. St. p. 67.).

14) „*Les soldats de l'armée française en Russie* (1812) étoient saisis d'hémorragies qui se montraient sur les différentes parties du corps, sur les mains, sur les jambes, sur les joues, au nez et à la bouche . . .“ KERKHOFFS *observat. médical.* Maastricht 1813. p. 50.

15) SAUSSURE *Voyage au Montblanc.* — HUMBOLDT in VOIGT *Magazin der Naturkunde.* 5. B. p. 474.

16) Ephem. Nat. Cur. Dec. III. A. 9 es 10. Obs. 108.

excitante ¹⁷⁾, a morsu serpentum ¹⁸⁾, et maxime ab animi pathematibus ¹⁹⁾.

3. Suffecerat HIPPOCRATI nosse haemorrha-Proxima-
giarum caussas praedisponentes et excitantes ²⁰⁾,
signa ²¹⁾, effectus ²²⁾, et curandi rationem ^{*)}.
Posteritas autem et *causam* haemorrhagiarum
proximam, explicare conabatur per leges hydrau-
licas ²³⁾, per conditionem acrem et corrosivam
sanguinis ²⁴⁾, per archaeum nimiam cruoris co-
piam eliminantem ²⁵⁾, per principia mechanica ²⁶⁾,
per salutare naturae conamen ²⁷⁾, per vim a
tergo ²⁸⁾,

17) Tempore methodi Brunonis, quot non observa-
bantur haemorrhagiae, quibus natura benefica, artis
maligna conamina vincere conabatur!

18) NICANDER, theriaca, versus 282. (colubri lebe-
tini).

19) NIEMANN l. c.

20) Aph. Sect. III et V.

21) Prorrhet. et Praenot.

22) Praedict. 1. 150. 152. Coacae 311.

*) Aphor. V.

23) SORANUS, ERISISTRATUS, CAELIUS AURELIANUS,
ARETAEUS et quodammodo GALENUS.

24) PARACELSUS.

25) VAN HELMONT.

26) HALLER Elem. phys. T. II. Cfr. ARNOLD GULICH
meditationes theoretico-practicae de furore haemor-
rhoidum internarum. Lugd. Bat. 1733.

27) STAHL l. c.

Frank Prax. II. 2. 2.

E o

tergo ²⁸⁾, per debilitatem vasorum ²⁹⁾, perque secretionem sanguinis morbosam ³⁰⁾.

§. LXXXVII.

D i a g n o s i s.

D. sanguinis.

1. Ne omnis humor, ob id quod ruber est, illico pro *sanguine* declaretur! Celebrata hoc sub respectu sunt sic dicta *prodigia sanguinis* ³¹⁾, fabulae scilicet solis sanguinei ³²⁾, pluviae sanguineae ³³⁾, crucium purpurearum in aëre ³⁴⁾, lapidum sanguineorum ³⁵⁾, aquarum sanguinearum ³⁶⁾, panis cruenti ³⁷⁾, plantarum sanguinearum adsper-

28) FRID. HOFFMANN l. c.

29) BROWN Elem. med.

30) Jam STAHL hujus opinionis fundamenta posuisse videtur. Illam J. HUNTER (*vom Blute*) clare exposuit. Secuti sunt J. P. FRANK et BICHAT l. c.

31) Diss. de prodigiis sanguinis, auctore STARK, praefate BECKMANN. Francf. ad Viadr. 1676.

32) CONR. LYCOSTHENIS *Prodigiorum ac ostentorum chronic.*

33) STRADA Dec. I. Lib. 7. — GASSENDUS in vita PEIRESCII. Lib. II. p. 270.

34) MICHAEL SACHSE *Kaiserchronik.* p. 4. f. 371.

35) Lavacrum conscientiae. Cap. 15. — NAUCLERUS Vol. 2. gener. 34.

36) CALVISIUS in Opp. chronol. Fol. 583. — HEROLIM in *Wunderbuche.* Fol. 349. (Fons sanguinis qui A. 938 Genuae fluxit). — JOH. PHIL. ABELIN chron. conat. ab A. 29. ad A. 33. Fol. 486. A. 1624. (Sanguis in fossis Lipsiensibus). — WALTHER *Blutpredigt.* p. 5. (Hu-

adpersarum³⁸⁾, aliâeque³⁹⁾. Praesentia sanguinis ex coagulo, quod ope caloris vel acidorum mineralium obtinetur, dignosci solet. Certitudo non nisi per analysin chemicam⁴⁰⁾ acquiritur, quam vero synthesis hucusque confirmare haud potuit⁴¹⁾.

2. *Haemorrhagiam internam*⁴²⁾ denuntiant D. haemorbi arteriarum et venarum praegressi, virium ^{morbi. internarum.} E e 2 repen-

enmi in Holsatia glacies guttis sanguineis adpersâ apparuit).

37) L. Martio et Sexto Julio Coss. cum bellum italicum consurgeret, Arretii frangentibus *paries* cruor è mediis fluxit, Op. JUL. OBSEQUENT. de prodigiis. C. 114. — Cfr. WOLFIUS lect. mem. T. I. Fol. 311. et 346. et T. II. F. 556 et 559. — WALTHER l. c.

38) STARK l. c. p. 27.

39) HUME *history of London. Vol. V. p. 275. 276. 278.*

40) Recentiores analyses chemicæ sanguinis debentur BERZELIO (*Afhandlingar i Fysik. D. 1.*), BRANDIO (*Philosoph. Transact. for the Y. 1812.*), EVER. HOME (*ibid. for the Y. 1818 et 1820.*), DAVY (*ibid. for the Y. 1814.*).

41) *Sanguinis formationem artificialem*, ex albumine, aqua, sale culinari et phosphate ferri albo, ope columnæ galvanicæ, GRINDEL promiserat (HUFELAND's *Journal* 1811. 8. St. p. 98—103. et 1812. 2. St. p. 99—114.). Ejusdem refutatio a Dr. FISCHER invenitur in SCHWEIGER's *Journal f. Chemie u. Physik.* 9. B. 4. Hefi. p. 339—400.

42) CALVERT l. c.

repentinus lapsus, pallor, pulsus exilis vel nullus, convulsionones, lipothymiae et mors ⁴³⁾).

Divisio
haemorrh.
in prima-
rias et
sympto-
matica.

3. Cavendum ne profluvium sanguinis, quatenus quammaxime attentionem nostram attrahere solet, illico pro *morbo primario* habeamus; enim vero illud saepe aliorum morborum, praecipue inflammationum, sistit *symptoma*.

Haemorrh.
traumati-
cae.

4. Inter haemorrhagias primarias illae emittuntur, quae ex cohaesione fibrarum soluta laesaque (per *diacrisin*), nunc vi mechanica externa, secante, pungente, contundente, lacerante (per *rhexin*); nunc erosione ab acribus (per *diabrosin*) oriuntur. Comprehendimus illas sub nomine *haemorrhagiarum traumaticarum*.

Haemorrh.
ex obsta-
culis me-
chanicis.

5. Accedunt *haemorrhagiae ex obstaculis mechanicis*, quibus fit ut cruor, legibus hydraulicis obediens, in partes minorem resistantiam exhibentes, forte dilatatis ostiorum diametris (per *anastomosin*), vel sejunctis ab invicem fibrillis adhuc integris, quasi per cribrum (per *diabetsin*), ruat. Spectant huc haemorrhagiae, aut ex obli-
tatione

43) Doctrina haemorrhagiarum internarum quoad encephalum — in tractatu de apoplexia; quoad pectus — in illo de pneumorrhagia; quoad abdomen et pelvim in tractatibus de haemorrhagiis cavitatum peritonaei et uteri, exponitur.

tione ipsorum vasorum sanguiferorum; aut ex obstructione aliorum viscerum, ortum ducen-
tes. — Interdum agitur minus de *obstaculo*,
quam potius de *stimulo*, qui nervos, partem san-
guinem fundentem adeuntes, in loco dissito
irritat ⁴⁴⁾; — tunc *haemorrhagia* dicitur *ex con-*
sensu.

6. Sequuntur haemorrhagiae ex nimia san-
guinis copia, forte ex ejus potestate plus quam
par est irritante, venientes, quaeque statum in-
flammativum cordis, arteriarum venarumque
socium agnoscunt. Tali statu inflammatorio vi-
gente, *cruor* non aliter quam *lymph*a coagulabi-
lis *secerni* videtur. *Haemorrhagiae* istiusmodi a
nobis *inflammatoriae* dictae, ab aliis *activae*,
hypersthenicae, vocantur.

7. Magnam cum illis alunt affinitatem *hae-*
morrhagiae, quibus transspiratio suppressa ansam
porrigit, *rheumaticae* dicendae.

8. *Haemorrhagiae gastricae* amplectuntur
profluvia cruenta, a saburris, a bile, a vermi-
bus, a flatibus intestinalibus et a morbis visce-
rum abdominalium, excitata. Aliae hujusmodi
haemorrhagiarum ex consensu nervorum, aliae
ex obstaculis mechanicis pullulant.

9. Quivis imperii diatheseos arthriticae in
cor, arterias et venas memor, non mirabitur,
non

⁴⁴⁾ Vide infra N. 8.

nos quoque *haemorrhagias arthriticas* agnoscere.

Haemorrh. scorbuticae. 10. *Scorbuticam diathesin* haemorrhagiis an-
sam porrigere neminem latet. Doctrinam ejus-
modi haemorrhagiarum in tractatu de scorbuto
exponemus, quo loco et *morbum maculosum haemorrhagicum* WERLHOFFII ad trutinam voca-
bimus.

Haemorrh. atonicae. 11. Et meram vasorum *atoniam* sanguinis
profluvia excitare posse, exempla haemorrhagia-
rum ex inanitione pullulantium, probant. *Haemorrhagiae* hujus generis sine scrupulo *passivae*,
aut *asthenicae* vocari possunt. Ne vero atoniae
ea symptomata adscribas, quae *ex terrore* pro-
pter conspectum sanguinis oriuntur! Ex animi
etenim isto pathemate in qualicunque haemor-
rhagia pallor faciei, frigus et sudor extrema-
tum, tremor membrorum, palpitatio cordis, pul-
sus exilis, aliaque debilitatis summae signa ob-
venire possunt.

Haemorrh. nerveae. 12. Quae singula iterum docent, quantum
sit imperium, quod systema nervosum in cor et
vasa sanguinea exercet. Quoties *haemorrhagiae*
ex tali nascitur fonte, illa *nerveae* dicenda.

Monitum. 13. Divisio haemorrhagiarum hucusque tra-
dita, illam quae ab origine profluvii aut ex ar-
teriis,

teriis, aut ex *veris* ⁴⁵⁾, aut ex *vasis capillari-*
bus ⁴⁶⁾, non excludit.

§. LXXXVIII.

P r o g n o s i s.

1. Bonos multarum haemorrhagiarum, omni ^{Boni effe-}
aero observatos effectus ^{ctus.} ⁴⁷⁾, et nostra, potissi-
mum

45) Saepius certe venae quam arteriae rumpuntur (HAL-
LER Elem. Physiolog. T. I. p. 129.). Ast, quamvis
venae eo loco ex quo sanguis fluit maxime soleant
esse extensae, cruor tamen non semper ex his, sed
saepe ex *arteriolis* venarum membranas superscanden-
tibus (*vasa vasorum*) et per tunicas mucosas distributis
pullulat.

46) Hujusmodi vasorum doctrinam pulchre exposuit
LORDAT l. c.

47) Legi de hoc argumento merentur dissertationes cita-
tae HEBENSTREITII, ALBERTII et BÜCHNERI. Jam
HIPPOCRATES de quadam constitutione epidemica lo-
quens, inquit: „In ista constitutione epidemica,
signis maxime quatuor convaluerunt. In quibusdam
enim aut illud erat, ut *sanguis ex naribus flueret*;
aut ex vesica urinae multae et copiosum sedimentum
et bonum habentes; aut per alvum tumultuosa, bi-
liosa, tempestive veniebant; aut dysenterici uno ho-
rum solo judicarentur.“ (De morbis vulgar. Lib. I.).
STANLIUS „moderata, inquit, haemorrhagia non
solum non debilitat, sed trahit potius post se veluti
sensilem corporis alacritatem et agilitatem: cum ante
tales eruptiones, in constitutione corporis ad illas
idonea, peculiaris quaedam gravitas et fatigatio atque
lassitudo revera impotens, familiariter sentiatur.“
l. c.

mum respectu ad haemorrhagias inflammatorias, rheumaticas aliasque habituales ⁴⁸⁾, confirmat experientia.

Obstacula. 2. Quod vero frequenter bonis haemorrhagiarum effectibus *obstat* „est sanguinis ex viscere nobili, vel in cavum istius, vel in telam cellulosa vicinam, effusio, infiltratio, coagulum, impedita rejectio, corruptio, corrupti resorptio et inducta ex illis, partium compressio, irritatio, functionis necessariae suppressio“ ⁴⁹⁾.

Mali effectus.

3. „Si talis est (profluvii) causa aut auferri non queat; si sanguis multus in cavum corporis, quo educi haud possit, aut in visceris parenchyma effunditur; si subito ⁵⁰⁾, ex vase conspicuo ⁵¹⁾, aut majore quantitate, aut longum per-

48) „Qui statis temporibus sanguinem fundere debent, nisi fundant, epileptici fiunt.“ HIPPOCRATES Pro-rhet.

49) J. P. FRANK l. c. p. 107.

50) Clari viri „collegerunt ex historia medica exempla hominum, qui maximam sanguinis de naribus, aut alia corporis sui parte, amiserunt. Nunc, si lenta haemorrhagia fuerit, multo eo major est, quam in subitis illis sanguinis jacturis, quae de violato majore vase erumpunt.“ HALLER l. c. T. II. §. 3.

51) Aut arteria, aut vena: „L'hémorragie produite par l'ouverture d'une grosse veine, peut cependant devenir très dangereuse; lorsque cette veine est unique dans un membre; car alors la compression ou la ligature neces-

per tempus, vel in viribus exhaustis, in gravidis, in sene, vel tenero infante haemorrhagiae contingunt; tunc majora ex hoc phaenomeno rerum imminebunt discrimina: sanguis, rubris particulis amissis, aquosum vix non in laticem resolvetur, fibras cordis motrices efficacia minori stimulabit, secretiones quae sat valido cordis a motu pendent, imminuet, ac praeter pallorem, languorem corporis universi, facile vel hydrops⁵²⁾, vel febris lenta cum tabe, vel lethalis aliquando convulsio⁵³⁾, praedicenda sunt⁵⁴⁾. Illa, aut lipothymia, timeri maxime debent, dum tantum sanguinis prorumpit, ut visus obscuretur, ut anxietas major nascatur, aures ut tinniant, utque extremitates frigeant.

4. Verum et hac sub deterrima rerum positione *natura* interdum *succurrit*, tum cordis et arteriarum actionem per temporis punctum ope
Succur-
rens na-
tura.
lipo-

saire pour arrêter le sang, empêchant le retour de ce liquide envers le coeur, le membre s'engorge excessivement et la gangrène peut s'en emparer." BOYER l. c. p. 273.

52) Non haec ignorabat HIPPOCRATES dicens: „cui autem plurimus sanguis fluxerit desuper et infra, et febris superveniat, *aquis repleti*, multa est suspicio.“

53) „Quibus fluunt impetuosa et multa; apta sunt ad convulsiones deduci.“ HIPPOCRATES Proorrh. II.

54) J. P. FRANK l. c. p. 109.

lipothymiae suspendendo ⁵⁵), — tum arteriae contractionem et retractionem ⁵⁶), efficiendo ⁵⁷), — tum coagulum inter arteriam et illius vaginam generando ⁵⁸), — tum ambientis cellulosa tumorem inducendo ⁵⁹), — tumque inflammationem adhaesivam excitando, qua vigente, vasa vasorum lympham coagulabilem, in pseudomembranas, vices parietum vasorum destructorum agentes, desinentem, secernunt ⁶⁰).

§. LXXXIX.

C u r a.

Quando
haemorrh.

1. Haemorrhagiae salutares coërceri non debent.

55) GMELIN diss. de lipothymia haemorrhagiam sistente. Altd. 1767.

56) „Vena dissecta collabitur; arteria se retrahit et cava manet, nihilo arctior. Neque quidquam ultra requiri crediderim ad plicas illas faciendas, in quas dissecta arteria in vulneribus collabitur, et ad quas non minima pars pertinet ejus curae, qua natura haemorrhagias compescit.“ HALLER op. c. T. I. p. 7.

57) MORAND *Mém. de l'acad. R. des sciences* a. 1736. — SHARP *Operat. in surgery*. 3. edit. *Introduct.* p. 2. — GOOCH *Cases and pract. remarks in surgery*. Vol. 2. p. 352. — WHITE *Cases in surgery* p. 171. — KIRKLAND l. c.

58) PETIT *Mém. de l'acad. R. des sciences*. a. 1735.

59) POUTEAU *Mélanges de chirurgie*. p. 331. — J. BELL *Principles of surgery*. Vol. I. p. 179.

60) J. HUNTER *Versuche über das Blut, die Entzündungen u. s. w.* 1. Th. — SENES l. c. HODGSON l. c. p. 474—483.

debent. Quod tamen praeceptum non impedit ^{sistendae} quominus illarum fons non solum destrui possit, ^{sint, nec} ^{ne.} sed immo destrui debeat. Aliud enim est haemorrhagias vi et praemature coërcere, aliud est illis blande et prudenter occurrere ⁶¹).

2. Quomodo *haemorrhagiis traumaticis* ope ^{C. haem. traumaticarum.} adstringentium, absorbentium, stypticorum, causticorum, compressionis et ligaturae, prudenter ⁶²) occurrendum sit, chirurgia docet.

3. In *haemorrhagiis ex obstaculis mechanici* ^{C. haem. ex obst. mechanici et ex consensu.} *et ex consensu* indicationes generales sunt: sanguinem a parte affecta per phlebotomiam revulsoriam, hirudines, cucurbitulas tum cruentas tum siccas ⁶³) deducendi; — stimulus ex longinquo agentem, per idonea auxilia (e. c. vermes et

61) Recte monet CULLEN (*First lines*. §. 741—747.) in plethoricis necessitatem haemorrhagiae ex eo elucere, quod illius suppressio videatur varios morbos producere. Nihilominus defendis in genere, praeter menstrua, omnem evitandam esse haemorrhagiam: 1° quia ista non semper ad partes succedat, in quibus satis secure incedat; — 2° quia saepe, dum plethoram delet, morbum periculosum simul inducit; — 3° quia facile excedit limites, atque, vel vitam periculo exponit, vel aegrum in periculosum morbum conjicit; et 4° quia plethoricum statum adauget.

62) BÜCHNER de damnis ex praematura suppressione haemorrhagiarum. Hal. 1767.

63) HOME *Klinische Versuche*. p. 513. (Multum iis utor).

et saburras ope anthelminthicorum et purgantium) auferendi, aut per maiorem irritationem (e. c. sinapismos) vincendi; — obstacula in locis dissitis (e. c. obstructions viscerum, glandularum) per resolventia removendi; — atque erythysmum, sensibilitatem morbosam debilitatemque partis affectae, applicatione frigoris ⁶⁴⁾, narcoticorum ⁶⁵⁾, et adstringentium ⁶⁶⁾ tollendi.

C. haem.
inflamma-
toriae.

4. *Haemorrhagiae inflammatoriae* veluti inflammationes curantur. Ex therapia specialium haemorrhagiarum elucet, quantum hic conducantur modicae evacuationes sanguinis tum universales tum locales, temperatura frigidiuscula, eccoprotica ⁶⁷⁾, diaeta severa, vegetabilis, potus aqueus, multus, subacidulus, folia digitalis purpureae, et quies cum necessaria patientia, ut natura salutaria sua conamina perficere possit; — quantumque noceant adstringentia ⁶⁸⁾, irritantia, cale-

64) Cfr. N. 5.

65) Cfr. N. 8.

66) Cfr. N. 7.

67) NONNE diss. an in haemorrhagiis lenia purgantia prosint? Erford. 1768.

68) QUARTIER non ergo in quavis haemorrhagia admovenda adstringentia. Paris. 1685. — SCHMIDT de haemorrhagiis aliisque fluxibus, adstringentibus non sistendis. Helmst. 1727. — WALLERIUS diss. de abusu adstringentium in haemorrhagiis. Lund. 1735. — ALBERTI diss. est de adstringentium perverso usu. — NUNN diss. de cautelis quibusdam circa usum adstringentium in haemorrhagiis. Erf. 1765.

calefacientia et tumultuaria medendi, seu potius necandi, ratio.

5. *Cura haemorrhagiarum rheumaticarum et arthriticarum* quoque antiphlogistica est; solum ^{C. haem. rheumaticarum et arthriticarum.} transpirationis operi, magis quam in simplici haemorrhagia inflammatoria studendum. Quamobrem et frigoris ⁶⁹⁾ hic applicatio locum non obtinet. Praemissis antiphlogisticis, si pars sanguinem fundens doleat, vesicatorium, quo propius fieri potest, illi admovendum. Podagrae evolutio quoque in arthriticis sollicitanda.

6. Quae ex *scorbuto* proficiscuntur haemorrhagiae, methodo specifica aggrediendae sunt ^{C. haem. scorbuticae.} ⁷⁰⁾. Aër purus, acida vegetabilia et succus ex herba recente *urticae dioicae* ⁷¹⁾ expressus, cum congrua diaeta, certissima sistunt auxilia.

7. *Haemorrhagiae atonicae*, pro vario aegroti sensibilitatis gradu, variam quoque ^{C. haem. atonicae.} ex-⁷²⁾poscunt medendi rationem. Exhaustum enim a haemorrhagiis corpus, interdum adeo sensile evadit, ut stimulo paululum majore irritetur; — hic, nulla obstante complicatione ⁷²⁾, cura ope *frigoris* ⁷³⁾ inchoanda. Debet vero illius ad-
mini-

69) Cfr. N. 7.

70) P. III. Vol. II. Caput de scorbuto.

71) GAELICKE diss. cit.

72) e. c' metu inflammationis pulmonum, uteri, peritonaci.

73) GERVASIUS A MONTEFALISCO de usu frigidae in haemoptysi et quocunque sanguinis profluvio. Ro-

ministratio esse brevis, transitoria et cautae. Porro *acida* jure celebrantur et quidem, in haemorrhagia venosa, illa *vegetabilia*, e. c. succus citri, acetum, acidum tartarosum; — in haemorrhagia, *acida mineralia*, e. c. acidum sulphuricum, tum simplex, tum compositum, uti in *elixirio acido* HALLERI, in *elixirio vitriolico* MYNSICHTII, in *alumine*, invenitur. In haemorrhagiis originis mixtae, *acidum phosphoricum* ⁷⁴⁾ omni alio anteponendum est. Haemorrhagiis venosis rebellibus cum debilitate ita *plumbum*, sicuti arteriosis *digitalem* opponimuss. Quo magis debilitas universum detinet corpus, eo magis cortex *cinchonae*, radices *acori calami* et *ratankiae* ⁷⁵⁾, maxime vero *ferrum* et *vinum* locum obtinent.

C. haem.
nervosae.

8. *Nervorum systematis in haemorrhagiis* exaltationem — *opio*, *hyoscyamo*, *pruno lauro-ceraso*, temperare; dejectionem autem — *ammonia* ⁷⁶⁾,

mæ 1756. — HAHN *Von der Kraft u. Wirkung d. fri-schen Wassers*. — MAYER diss. saluberrimus usus aquae frigidae externe applicatae in sistendis haemorrhagiis internis. Francf. 1783.

74) Drachma semis in libra aquae et syrupi rubi idaeii q. s. ad gratum vaporem.

75) *Krameria triandra*. v. HURTADO in *Bulletin de la société d'émulation*. N. 4. Novembre 1816. — *Abhandlung von der Ratanhia von Dr. KLEIN*. Stuttg. 1818.

moniâ ⁷⁶⁾, *ippecacuanha* ⁷⁷⁾, et *cinnamomo*, debellare studemus. Nec aegrotis animum addere negligimus. Quantam enim in haemorrhagiis scenam ludat imaginatio, virtus amuletorum ⁷⁸⁾, remediorumque sympathicorum ⁷⁹⁾, in sanguine sistendo, docet.

9. *Fasciae* ita adhibitae circa artus, ne *Fasciae*. arterias majores simul comprimant, non exigua in haemorrhagiis, quae ex venis contingunt, sistendis, virtute, transitoria licet, pollent ⁸⁰⁾.

10. De

76) LA PIRA *Memorie sulla forza dell' alcali fluore per fermare l'emorragie de' vasi arteriosi e venosi. Napoli* 1790.

77) Putarem *ippecacuanham* in parva dosi exhibitam, nervos ventriculi stimulando, indeque plexibus cardiacis salutarem irritationem inferendo, vires partis illius systematis nervosi, quae circuitui sanguinis imperat, restaurare, sicque haemorrhagias interdum compescere. Est vero ista opinio mera hypothesis.

78) RIEDLIN *lin. med.* 1696. p. 626. (ex haematite). — *Ephem. Nat. Cur.* Dec. III. A. 5. et 6. Obs. 86. (radix cichorei in manu detenta).

79) *Acta erndita Lips.* 1712. p. 347. (haemorrhagia intuitu curata). — *Eph. Nat. Cur.* Dec. II. A. 1. Obs. 108. Schol. — A. 4. Obs. 11. (verbis). — *Cent. I. et II.* Obs. 25. (aspectu fixo).

80) SLEVOOT *diss. ligaturam artuum antiquum, necessarium, utile atque tutum haemorrhagiarum esse remedium. Jen.* 1697.

Transfusio sanguinis. 10. De *transfusione sanguinis*, auxilio, in hominibus ab haemorrhagiis in animi deliquia conjectis, tentando, in capite sequenti mention fiet.

DE

DE
ANIMI DELIQUIIS.

CAPUT XXI.

De animi deliquiis in genere.

§. XC.

Definitio. Varii morbi gradus.

1. *Animi deliquium* ¹⁾ adesse dicitur, dum Definitio. homo se ita viribus repente destitui sentit, ut pallescat, frigeat, pulsibusque arteriarum evanescentibus morituro, aut mortuo similis evadat.

2. Hujus morbi variis sunt gradus. Levissimus omnium est *Eclysis* ²⁾, sive *virium resolutio* ³⁾. Hunc subsequitur *Lipothymia* ⁴⁾, subitanea scilicet et brevis virium dejectio, cum pallore, frigore corporis, superstitie pulsu et respiratione. His omnibus adhuc gravior est *Syncope* ⁵⁾, nimirum subitanea sensuum, motuum ac respirationis abolitio. Omnium denique

Ff 2 gravis-

1) GERM. In Ohnmacht fallen. GALL. S'évanouir, tomber en défaillance.

2) A GRAEC. Ἐκλύω, exsolvo.

3) GERM. Anwandelnde Schwachheit. GALL. Eblouissement, se trouver mal. ITAL. Trovarsi male.

4) A GRAEC. Λείπω, deficio, et Θυμός, animus.

5) A GRAEC. Σύν, cum, et Κόπτω, labor, caedo.

gravissima habetur *Asphyxia* 6), mortis imaginem referens, ideoque rectius 7) *Mors putativa* dicenda.

§. XCI.

Literatura. Rerum ordo.

Literatura 1. *Lipothymiae* et *syncope* doctrinam illustrant, praeter medicorum Principes 8); SEILER 9),

6) A GRAEC. α, negativo, et σφύξις, pulsus.

7) Cum *pulsus defectus* non solum per diem unum et alterum, sed et per plures hebdomadas vel menses locum habere possit, quin homo ob id respirare, loqui, sentire, seseque movere cesset, uti apud LANCISIUM (Opp. T. I. Lib. I. de subitaneis mortibus), RAMAZZINUM (constitutio epidemica. A. 1692. 1693.) et HALLERUM (Opp. minora. T. III. p. 306.) videre est; patet vocem *Asphyxiae* immerito pro synonymo *mortis putativae* usurpari. Interea consuetudo haec nomina confundendi ita invaluit, ut illi, praemissa allata declaratione, me quoque submittere minime haesitem.

8) AETIUS Tetrab. II. Sect. I. C. 96. Tetrab. III. Sect. I. C. 7. — PAULUS AEGINETA Lib. II. C. 36. — AVICENNA Canon. Lib. III, Fen. 2. Tract. 2. C. 6. — ORIBASII Synopsis Lib. VI. C. 26. 28. 45. 46. — ZACUTUS LUSITANUS med. pract. histor. T. I. Lib. 2. Hist. 45. Prax. admirab. Lib. I. Obs. 144. — MERCURIALIS Consil. N. 122. — FABRICIUS HILDANUS Cent. VI. Obs. 33. — BALLONIUS Consil. I. N. 9. III. p. 32. — FORESTUS Lib. XVII. Obs. 8. — FR. HOFFMANNUS med. rat. system. — BURSERIUS Institutiones Vol. IV. Cap. 7.

LER ⁹⁾, JUSTI ¹⁰⁾, SCHROETER ¹¹⁾, SCHNEIDER ¹²⁾,
 SCHALIER ¹³⁾, MAGIRUS ¹⁴⁾, MEIBOMIUS ¹⁵⁾, HEIN-
 TZE ¹⁶⁾, MEISNER ¹⁷⁾, MICHAELIS ¹⁸⁾, COOLS ¹⁹⁾,
 POLISIUS ²⁰⁾, WILDHOLTZ ²¹⁾, GRAMM ²²⁾, CON-
 RINGIUS ²³⁾, HAFENREFFER ²⁴⁾, PAZ ²⁵⁾, SEBIZ ²⁶⁾,
 FREYTAG ²⁷⁾, ROLFINK ²⁸⁾, METZGER ²⁹⁾, COEN ³⁰⁾,
 STRAUCH ³¹⁾, GIGAS ³²⁾, LIEVENS ³³⁾, RUPERT ³⁴⁾,
 DECHT ³⁵⁾,

9) Diss. de syncope. Francf. ad Viadr. 1600.

10) Diss. de syncope seu animi deliquio. Basil. 1601.

11) Diss. de syncope. Lips. 1606.

12) Diss. de syncope. Basil. 1608.

13) Diss. de syncope. Viteb. 1618.

14) Diss. de syncope. Hal. 1620.

15) Diss. de syncope. Helmst. 1622.

16) Diss. de syncope. Lugd. Bat. 1628.

17) Diss. de syncope. Vitemb. 1629.

18) Diss. de syncope. Lips. 1636.

19) Diss. de syncope. Lugd. Batav. 1642.

20) Diss. de gravissimo cordis affectu, syncope. Francf.
 1642.

21) Diss. de syncope natura et cura. Argent. 1651.

22) Diss. de syncope. Leid. 1652.

23) Diss. de gravissimo cordis affectu, syncope. Helmst.
 1652.

24) Diss. de corde ejusque affectu gravissimo, syncope.
 Tübing. 1658.

25) Diss. de syncope. Lugd. Bat. 1658.

26) Diss. de syncope. Argent. 1659.

27) Diss. de lipothymia. Alt. 1660.

28) Diss. de syncope. Jen. 1662.

29) Diss. de syncope. Tüb. 1665.

30) Diss. de syncope. Lugd. Bat. 1665.

31) Diss. de syncope. Wittemb. 1667.

BECHT ³⁵⁾, KOLB ³⁶⁾, WEDEL ³⁷⁾, LESLAAN ³⁸⁾, KOERBER ³⁹⁾, CAMERARIUS ⁴⁰⁾, BERGER ⁴¹⁾, ALPINUS ⁴²⁾, LEPNER ⁴³⁾, MOSSEDER ⁴⁴⁾, DECKERS ⁴⁵⁾, BALEN ⁴⁶⁾, WINTER ⁴⁷⁾, LUDOLFF ⁴⁸⁾, VATER ⁴⁹⁾, HEISTER ⁵⁰⁾, MÜLLER ⁵¹⁾, HILSCHER ⁵²⁾ aliique.

Literatura
de morte
putativa,

2. De morte putativa, vulgo asphyxia,
scri-

- 32) Diss. de lipothymia. Lugd. Bat. 1668.
- 33) Diss. de syncope. Lugd. Bat. 1669.
- 34) Diss. de syncope. Erford. 1675.
- 35) Diss. de syncope. Gies. 1680.
- 36) Diss. de aegro syncope laborante. Erf. 1682.
- 37) Diss. de syncope. Jen. 1680. — Diss. aeger laborans syncope. Jen. 1682. — Diss. de syncope et lipothymia ex epitome praxeos clinicae. Jen. 1715. — Miscell. Nat. Cur. Dec. I. A. 2. p. 298.
- 38) Diss. de syncope. Ultraj. 1684.
- 39) Diss. Eclipsis Microcosmi. Erf. 1685.
- 40) Diss. tensio cordis, lipothymiae caussa. Tüb. 1686.
- 41) Diss. de deliquiis animi. Wittemb. 1689.
- 42) Diss. de syncope. Alt. 1690.
- 43) Diss. de syncope cardiaca. Regiom. 1690.
- 44) Diss. de deliquio animi. Argent. 1692.
- 45) Diss. de syncope. Lugd. Bat. 1694.
- 46) Diss. de syncope. Lugd. Bat. 1699.
- 47) Diss. de syncope, ejusque origine, indiciis et curatione. Rintel. 1716.
- 48) Diss. de syncope. Erf. 1722.
- 49) Diss. de affectu magno, mortique proximo, syncope ejusque causis et cura. Witeb. 1723.
- 50) Diss. de animi defectione. Helmst. 1726.
- 51) Diss. de syncope. Argent. 1731.
- 52) *Nouvelle théorie de la syncope.* Paris 1802.

scripserunt praeter antiquos ⁵³⁾, BARSCHER ⁵⁴⁾, HENSLER ^{*}), SCHOSULAN ⁵⁵⁾, ESSIG ⁵⁵⁾, THYERY ⁵⁷⁾, KITE ⁵⁸⁾, PRÉVINAIRE ⁵⁹⁾, G. S. HOFMANN ⁶⁰⁾,

LEO-

53) KÜHN diss. de caussa mortis hominum aqua submersorum, eosque in vita revocandi methodo Graecis observata. Lips. 1778. Cfr. Opp. AETII, ORIBASII, HALY ABBATIS, DIOSCORIDIS, AVICENNAE ubi de cura mortis putativae quaestio fit. Item ALEXANDER BENEDICTUS, BAPT. CONDRONCHIUS, GUIL. FABRICIUS, PETR. FORESTUS, DAN. SENNERTUS, PETRUS A CASTRO, BARTHOLINUS, de quibus vide ALBERTI praxis medica extemporanea, Casus VII. p. 994.

54) Disp. de reviviscentibus iis qui mortui credebantur.

*) *Anzeige der hauptsächlichsten Rettungsmittel derer, die auf plötzliche Unglücksfälle leblos geworden sind. Altenb. 1770. Umgearbeitet von SCHERF, unter dem Titel: Anzeige der Rettungsmittel etc. 1787.*

55) *Gründlicher Unterricht für das Landvolk, wie und auf was für Weise Jedermann seinen ertrunkenen, erhenkten, erstickten, erfroren, von Hitze verschmachten, und vom Blitz berührten unglücklichen Nebemenschen Hülfe leisten, der Retter aber für sein eigenes Leben sich selbst sicher stellen solle. Wien 1786.*

56) *Bewährte Rettungsmittel für Selbstmörder und andere Gattungen schnell verunglückter Personen. Augsb. 1788.*

57) *La vie de l'homme respectée et défendue dans les derniers moments.*

58) *Ueber die Wiederherstellung scheinbar todter Menschen und die Erhaltung der aus sterbenden Müttern lebendig genommenen Kinder. A. d. E. von MICHAELIS. Leipz. 1790.*

59) *Abhandlung über die verschiedenen Arten des Scheintodes und über die Mittel, welche die Arzneykunde und*

LEOPOLD Comes a BERCHTOLD ⁶¹⁾, STOLL ⁶²⁾,
ZARDA ⁶³⁾, STRUVE ⁶⁴⁾, WIDEMANN ⁶⁵⁾, POR-
TAL ⁶⁶⁾,

*Polizey anwenden können, um den gefährlichen Folgen
- allzufrüher Beerdigung zuvor zu kommen. A. d. Franz.
von SCHREGER. Leipz. 1790.*

60) *Ueber den Scheintod, und über gewaltsame Todesarten
überhaupt; nebst den Mitteln zur Wiederbelebung der
Verunglückten und zur Verhütung, daß Niemand leben-
dig begraben werde. Coburg 1790.*

61) *Kurzgefaßte Methode, alle Arten von Scheinbartodten
zu beleben. Wien 1791.*

62) *Rettungsmittel in plötzlichen Unfällen; nach dem La-
teinischen mit Zusätzen von A. D. C. Leipz. 1795.*

63) *Alphabetisches Taschenbuch der hauptsächlichsten Ret-
tungsmittel für Todscheinende. Dresd. 1796. — Ta-
bellarischer Auszug aus dem alphabetischen Taschen-
buche. 1798. — Zuschreiben an meine Landsleute, die
Rettungsanstalten plötzlich verunglückter Menschen be-
treffend. Prag 1799.*

64) *Neue Noth- und Hülfsstafel für den Bürger und Land-
mann von den Rettungsmitteln in den größten Lebens-
gefahren. Hannover 1799. — Uebersicht der Rettungs-
mittel zum Gebrauche für Wundärzte. Hannov. 1799.
— Versuch über die Kunst Scheintodte zu beleben, und
über die Rettung in schnellen Todesgefahren; ein tabel-
larisches Taschenbuch. Braunschw. 1797. — Gesund-
heitslehre; nebst einer faßlichen Anleitung, Verun-
glückte ins Leben zu rufen, und Vorsichtsregeln zur
Verhütung der gewöhnlichen Lebensgefahren. Braun-
schweig 1799.*

65) *Anweisung zur Rettung der Ertrunkenen, Erstickten,
Erhenkten, vom Blitze Erschlagenen, Erfrorenen und
Vergifteten. Braunschw. 1804.*

TAL ⁶⁶⁾, WELZER ⁶⁷⁾, ACKERMANN ⁶⁸⁾, VIETZ ⁶⁹⁾,
HUFELAND ⁷⁰⁾, BARZELLOTTI ⁷¹⁾, POPPE ⁷²⁾, CUR-
RY ⁷³⁾, J. P. FRANK ⁷⁴⁾, BERNT ⁷⁵⁾, CALOVINI ⁷⁶⁾,

ORFI-

66) *Unterricht über die Behandlungsart der Erstickten, der Ertrunkenen, des Scheintodes bei Neugeborenen, der von einem wüthenden Thiere Gebissenen, der Vergifteten und der Erfrorenen.* A. d. Franz. mit Zusätzen von HEMPEL. Wien 1798.

67) *Ueber das Fehlerhafte der zeitherigen Methode, Scheintodte zu behandeln.* Landshut 1801.

68) *Der Scheintod und das Rettungsverfahren: ein chemiatrischer Versuch.* Frankf. am Main 1804.

69) *Program zu den Vorlesungen über das Rettungsgeschäft scheidtoder, und in plötzliche Lebensgefahr geruthener Menschen.* Wien 1834.

70) *Der Scheintod, oder Sammlung der wichtigsten That-sachen und Bemerkungen darüber; in alphabetischer Ordnung.* Berlin 1808.

71) *Memoria per servire di avviso al popolo sulle asfissie o morti apparenti, e su i mezzi più facili, pronti ed efficaci per vincerle, o distinguerle dalla vera morte.* v. Giornale dellu soc. med. chirurgica di Parma. 1808.

72) *Noth- und Hülfsexikon zur Behütung des menschlichen Lebens vor allen erdenklichen Unfällen.* Nürnberg 1811.

73) *Observations on apparent death.* Lond. 1715.

74) *System einer vollständigen medicinischen Polizey.* 5. B. Tübing. 1813.

75) *Vorlesungen über die Rettungsmittel beim Scheintode und in plötzlichen Lebensgefahren.* Wien 1819.

76) *Sulle varie morti apparenti e su i pronti e validi soccorsi che amministrar debbonsi.* Memoria medico-politica. Pavia 1820.

ORFILA 77), P. GERBER *), SAL. JAC. LEVY **), TROUSSEL ***), aliique 78) in tractatibus specialibus commemorandi.

Ordo rerum.

3. Priusquam autem ad tractatus speciales perveniamus, *notiones generales de diagnosi, prognosi et cura animi deliquiorum* praemittere juvabit. Quo opere peracto, morbi illud genus, quatenus id prime ex intercepta actione aut systematis nervosi, aut respirationis, aut circuitus sanguinis originem trahit, ita explanabitur, ut, non neglectâ ratione nexus perpetui inter istas functiones, quaestio fiat de *animi deliquiis* 1^o *nerveis*, 2^o *pneumaticis* et 3^o *cardiacis*. Hae

ini

77) *Secours à donner aux personnes empoisonnées et asphyxiées. Paris 1821.*

*) *Diss. de vulneratorum asphyxia, in acie et nosocomiiis castrensibus justo minus aestimata. Landish. 1819.*

**) *Diss. introductio in commentat. de asphyxia et morte apparente. Kil. 1821.*

***) *Des premiers secours à administrer dans les maladies et accidens, qui menacent promptement la vie. Paris 1823.*

78) HAWES *Abhandlung der Londner Königl. Gesellschaft zur Rettung Verunglückter und Scheintodter v. Jahre 1774—84; nebst Zusätzen vom Jahre 1794. Breslau 1798. Annual report 1802. By W. HAWES. — Kurzgefaßte Methode, alle Arten von Scheintodten wieder zu beleben und der allergrausamsten Mordthat, lebendig in das Grab zu legen, vorzubeugen. Von einem reisenden Deutschen. — Allgemeines Rettungsbuch. Eine gekrönte Preisschrift. Grätz 1807.*

in doctrina exponenda, confinia politiae medicae, medicinae forensis et toxicologiae, quantum fieri licet, evitabimus.

§. XCII.

D i a g n o s i s.

1. Non solum animi deliquia sed et ipsa ^{Mors si-}
mors simulari potest. Dantur etenim vaferrimi ^{mulata.}
 homines, qui, „ut facile ex commeritis evadant
 suppliciis, inducto per sulphuris halitum squal-
 lore, injectis itidem validis ad brachia vinculis,
 tandemque blando epoto narcotico, aut sponte
 parumper coacta respiratione, subito *mortuos se*
fingunt, quod ut expeditius patrent, custodem,
 amicum, vel servum, quo ex pacto, et conventu
 rem agant, sibi adsciscunt“ 79).

2. Ut fraus detegi aut *animi deliquium a* ^{Distinctio}
morte distingu possit, *istius signa* *) ^{a morte.} perpen-
 denda

79) LANCISIUS Opp. T. I. Lib. I. — IGNAZ MONTI
Medicinische Dictata. A. d. Italianischen. Stuttgart
 1781. p. 1.

*) WINSLOW an mortis incertae signa minus incerta a
 chirurgicis quam ab aliis experimentis? Paris. 1710.
 — BRUHIER *dissertation sur l'incertitude des signes*
de la mort et de l'abus des enterremens et embaume-
mens précipités. Paris 1742. — J. G. JANKE *Abhand-*
lung von der Ungewissheit der Kennzeichen des Todes
Leipz. 1749. BRINKMANN's *Beweis der Möglichkeit,*
daß einige Leute lebendig begraben werden können.
Düsseldorf 1772. — CAMERER *de signis mortis dia-*
gnosticis. Argent. 1785. — GRUNER *semiotices P.*

denda sunt, nimirum: cessatio circuitus sanguinis, ita ut sauciato vase nec gutta cruoris effluat, — defectus respirationis, ita ut flammatori admoventi et vas aqua repletum pectori imponi possint, quin minima fluctuatio in illis percipiatur; — extinctio caloris animalis, ita ut corpus humanum temperaturae ambientis particeps fiat; — illius pallor cadaverosus **); cutis a frictione non rubra sed flava simulque veluti cornea facta ***), — planities locorum qui a decubitu comprimuntur ⁸⁰⁾; sphincterum officinae abolitum, — rigor membrorum ****), — abolitio splendoris corneae, foveam impressam retinentis; —

II. Cap. XII. §. 925. — HUFELAND *Die Ungewissheit des Todes und das einzige untrügliche Mittel, sich von seiner Wirklichkeit zu überzeugen, und das Lebendige begraben unmöglich zu machen.* Frankf. 1791. — METZGER *Ueber die Kennzeichen des Todes.* Königsb. 1792. — Врачебныя извѣстія о преждевременномъ погребеніи мертвыхъ, собранія Елизеномъ въ Санктпетербургѣ. 1801.

**) Caeterum et rubor faciei in cadaveribus observatus est v. MORGAGNI de sed. et caus. morbor. Epist. XXVI. N. 33. Ep. XIV. N. 3.

**) MAGENDIE et FINE in *Repertorio medico-chir.* da Torino 1822. Agosto.

80) *Der Arzt als Rathgeber und Hausfreund.* Von J. A. PITSCHAFT. Heidelb. 1817. p. 43.

****) Verum observatur et in aegris tetano affectis et in asphyxia a gelu.

tis; — inaequalis pupillarum dilatatio ⁸¹⁾; — depressio maxillae inferioris; — caput pendulum, — sensus, stimulis suis specificis non respondentibus ⁸²⁾, — denegata contractio fibrae muscularis etiamsi illi moxa ⁸³⁾, ammonia ⁸⁴⁾, electricitas ⁸⁵⁾, galvanismus ⁸⁶⁾ admoveantur; — maculae lividae ⁸⁷⁾, foetor aliaque putredinis indicia, quibus ultimis unice fides tribui potest ⁸⁸⁾.

3. Quaeritur tandem quo pacto *animi deliquia* ab *apoplexia* distingui possint? Inter hos ^{Distinctio animi deliquii ab apoplexia.} morbos

81) BERNT l. c. p. 4.

82) e. c. oculus, luci, aures sono grato, ut compellationi nominis objecti amati, si agatur de avaro, auri etc.

83) ROMERO in *Medical transactions, published by the College of Physicians in London. Vol. I.* (Suadet mortem ad caput ossis peronei, ubi nervus popliteus cutaneus exit).

84) Idem, ibidem. (Lintea carpta ammoniâ imbutâ in nasum introducenda esse docet, atque spumam oris inde ortam, pro certo mortis indicio habet!)

85) NICOLAS de variis vaporibus mephiticis et novo quo suffocati ad vitam revocentur auxilio. Nanceji 1781. — KITE l. c.

86) KLEIN *Neues Journal der Physik* 1795. 1. B. p. 54. — CREVE *Vom Metallreize, einem neuentdeckten, untrüglichen Prüfungsmittel des wahren Todes.* Leipz. 1798. — HEIDEMANN *Zuverlässiges Prüfungsmittel des wahren und des Scheintodes.* Wien 1804. — STRUVE infra citando.

87) Ab ecchymomatibus viventium distinguendae.

88) HUFELAND l. c.

morbos sane maxima animadvertitur affinitas, praecipue dum animi deliquia ex vitio systematis nervosi, potissimum cerebri, ortum ducunt. Verum apoplexiis proprium est, quod vestigia paralyseos aut saltem torporem in exercitio animi facultatum relinquunt⁸⁹⁾, quod ab animi deliquiis alienum est.

§. XCIII.

Prognosis. Cura.

Prognosis. 1. Quoniam ingruens putredo unicum certum mortis indicium sistit⁹⁰⁾, sequitur inde, quod ad illud tempus usque (illaesâ caeterum corporis fabricâ), spes latentis adhuc vitae scintillae ali potest. Spem istam nil magis sustinet, quam exempla animi deliquiorum ad plures horas pluresque dies protractorum⁹¹⁾, ac successus, quo conamina societatum philanthropicarum, in asphycticis salvandis, coronata fuere⁹²⁾.

2. Suc-

89) ROCHOUX *Recherches sur l'apoplexie.*

90) §. XCII. N. 2.

91) „In filia Principis R. . . a. 1802. lipothymias vidi, ad 140 sexagesimas horae partes protractas.“ Ex Schedis Patris mei. SCHENK Obs. Lib. II. N. 219. 226. (24 horarum). — *Journal des sçavans* 1740. (8. dies in uxore praefecti militum ROUSSEL). — SAILLANT in *Hist. de la soc. R. de méd. a. 1776.* p. 318. (audiens praeparationem ad sepulturam) et HUFELAND *Wiederauflebensgeschichteu scheinodter Menschen.* in op. c.

92) §. XCI. N. 2. (78). JOS. FRANK's *Reise nach Paris, London u. s. w. Wien* 1805. 2. B. p. 3—8. — J. P.

2. Successus autem *curae* aliter expectari Cura. nequit, nisi tempestivâ administratione auxiliorum requisitorum. Haec ut semper in promptu sint, *apparatus* ⁹³⁾, illa includens, requiritur ⁹⁴⁾. Quo simplicior ille, eo melior. Minimum amplexi debet: vasa alcohol, acetum, ammoniam, aetherem, semina sinapis, folia nicotianae, flores matricariae chamomillae, sal culinare, tartarum emeticum, radicem ipecacuanhae et sulphatem zinci continentia; — syringas pro clysteribus aliisque injectionibus; — instrumenta ad aërem in pulmones introducendum*); — pannos laneos, lintea,

FRANK l. c. p. 49. ubi ait: „In Zeit von 25 Jahren hatte die Amsterdamer Gesellschaft 990 Menschen wieder hergestellt. Durch die eben erwähnte humane Society wurden vom Jahre 1774 bis 1779 an 2319 Verunglückte gerettet. Nach neuen Nachrichten hat eben diese Gesellschaft zwey Drittel ihrer Verwendungen bei Verunglückten und Scheintodten mit Erfolg gekrönt gesehen. Unter 115 Verunglückten hat die Hamburgische Gesellschaft zur Beförderung nützlicher Künste und Gewerbe vom Jahre 1790 — 1793 fünf und siebenzig wieder zurecht gebracht.“

93) GERM. Rettungs-Apparat, Rettungskasten, Nothkasten.

94) POPPE l. c. p. 430 — 433. — J. P. FRANK l. c. p. 82. — BERNT l. c. §. 75. — RUDTORFER Abhandl. über die Verbesserung der zur Wiederbelebung der Scheintodten erforderlichen Instrumente, Geräthe u. Nebenerfordernisse. Wien 1821.

*) Cap. XXIII. §. CI. N. 8 (64 — 75).

lintea, fascias, pennas, pectines setaceos, spon-
gias, pyrithecam, foculos et galvanodesmum ⁹⁵⁾.
— Machinas, quae salvationi submersorum alio-
rumque asphycticorum dicata sunt, quatenus
politiae medicae obiectum sistunt, silentio prae-
terimus. — Cura illorum debet esse prompta ⁹⁶⁾,
debito in loco suscepta ⁹⁷⁾, placida ⁹⁸⁾ et con-
stans ⁹⁹⁾.

95) STRUVE: *Der Galvanodesmus, ein besonders in Krank-
heiten nützlicher, leicht transportabler u. vorzüglich an-
wendbarer Apparat. Hannov. 1804.* — Ejusdem: *Der
Lebensprüfer, oder Anwendung des von mir erfundenen
Galvanodesmus zur Bestimmung des wahren vom Schein-
tode, um d. Lebendigbegraben zu verhindern. Hannov.
1805.*

96) „Die großen Rettungsinstrumente sammt den Trag-
bahren sowohl, als auch die Rettungsgeräthe, welche
der Nothkasten umschließt, müssen an solchen Oertern
aufbewahrt werden, wo möglicher Weise das größte Un-
glück zu besorgen steht. Dies wäre nun hauptsächlich
in der Nähe eines Flusses, Hafens u. s. w., in Wach-
häusern, Brückenhäusern, Mühlen u. s. w.“ KOPPE l.
c. p. 433.

97) „In den meisten Fällen ist es unmöglich, einen im
Wasser Verunglückten, einen in einer Grube Erstickten
u. s. w. nach seiner eigenen Wohnung zu bringen, und
doch ist es nöthig, daß er möglichst schnell an einen
gesunden, geräumigen, im Winter leicht zu erwärmen-
den Ort gebracht werde.“ KOPPE l. c. p. 437.

98) „Ein übereiltes zu ungestümes Verfahren ist nicht sel-
ten Schuld an dem Mißlingen unserer Versuche, und
nur zu oft hat solches den unglücklichen Ausgang noch
gar beschleunigt. So wie die allzu große Thätigkeit

stans⁹⁹). Si illius conamina succedant, conceditur subinde necessaria, ut natura ipsa operari possit, quies¹⁰⁰). Ne spectatores impedimento sint *)! Peracta vitae restauratione convalescens sedulo curandus est **); nova enim illum circumdant pericula ***).

CAPUT

der Aerzte in Krankheiten, die sich einmal von ihrem natürlichen Laufe nichts abbrechen lassen, oft zur Ursache ihres tödtlichen Ausganges wird; eben so ist es auch bei der Behandlung des Scheintodes.“ J. P. FRANK l. c. p. 108.

99) „Sind so viele, so ganz vernachlässigte Scheintodte, selbst nach mehr denn 24 Stunden wieder zurecht gekommen; wie könnte man es ohne Verantwortlichkeit, was auch lieblose, müßige und unwissende Zuschauer dafür sprechen möchten, bei einêr oder der andern Stunde Verwendung beruhen lassen?“ J. P. FRANK l. c. p. 111.

100) „... wenn man eine geringe Bewegung der Augenlieder, ein Zucken der Gesichtsmuskeln, ein Erbrechen, einige leichte Athemzüge bemerkt; muß man durch Aussetzen der Reitzmittel dem Scheintodten, oder dem zum Leben schon Zurückkehrenden die nöthige Zeit lassen, und während kleinen Pausen in der Arbeit, die Wirkung derselben, und jene der Natur aufs genaueste beobuchten.“ STRUVE l. c. p. 51.

*) J. P. FRANK l. c. p. 72.

**) Idem, ibidem p. 113.

***) *Verhandeling over de Oorzaken, waarom Drenkelingen, Verstikte, en Verhangenen, na uit den Schyndood tot het leven terug gebragt te zyn, dikwerfkort daarna eene prooi van den wezenlyken dood worden. Door H. S. SCHOUTEN. Amst. 1822.*

CAPUT XXII.

De animi deliquiis nerveis.

§. XCIV.

*Ex violentiis mechanicis systemati nervoso illatis.*Violentiae
externae.

1. **M**ora diuturna, vel positio obliqua capitis infantilis, inprimis praemagni, in pelvis potissimum angustâ, tumoribus obsessâ, extra modum profundâ, verbo male constructâ, — encephali rudis pertractatio per instrumenta obstetricia aut sub versionis opere; — extensio colli, in partu praevia facie, subsequente inde expansione et pressione medullae spinalis ¹⁾; — luxatio vertebrarum cervicalium orta in evolvendo capite extremo ²⁾; — haec, inquam, singula saepe recens natos asphycticos reddunt ³⁾. Praeterea nutri-

1) PLOUCQUET *Abhandlung über die gewaltsamen Todesarten.* p. 140. N. 7.

2) WIGAND *Die Geburt des Menschen.* Berlin 1820. 2. B. p. 179.

3) EHRHARD *Diss. de asphyxia neophytorum.* Erlang. 1786. — REGNIER *diss. de asphyxia neonatorum.* Regiom. 1789. — LOEFFLER *Ueber d. Scheintod neugeborner Kinder u. ihre Wiederbelebung* in STARK'S *Archiv f. d. Geburtshülfe.* 4. B. 1. St. p. 85. — FRO-

nutrices et matres haud raro infantes in lecto obterunt. Quacunque demum in aetate omnes animi deliquiorum gradus observati fuere, a concussione ⁴⁾, nisu ⁵⁾, alapa ⁶⁾, hernia ⁷⁾, ictu insecti ⁸⁾, scarificatione ⁹⁾, constrictione thoracis ¹⁰⁾, pugilatu ¹¹⁾, aliisque violentiis regioni epigastricae illatis ¹²⁾.

G g 2

2. Non

RIEP de methodo neonatis asphycticis succurrendi. Vinariae 1801. — HERHOLDT *Commentation über d. Leben, vorzüglich der Frucht im Menschen u. über den Tod unter der Geburt. Kopenhag. 1803.* — FRÉTEAU *Essai sur l'aphyxie de l'enfant nouveau né. Paris 1804.* — LEBRETON *Recherches sur les causes et le traitem. des plusieurs maladies des nouveau-nés. Paris 1819.* — GNOINSKI de asphyxia neonatorum. Vilnae 1823.

4) STOLL l. c. p. 64. et ratio medendi. P. III. p. 48. — J. P. FRANK l. c. 3. B. 4. *Abth. 2. Absch.* p. 822. — 4. B. 1. *Abth. 1. Absch.* p. 32. et l. c. p. 25. 304.

5) J. P. FRANK l. c. p. 307.

6) Ephem. Nat. Cur. Dec. I. A. 2. Obs. 122.

7) Miscell. Nat. Cur. Dec. I. A. 6. et 7. p. 79. — SAX in *Mem. of the medical society of London. Vol. III.* — Operis nostris P. II. Vol. I. Cap. V. §. XXVII. 2 (55).

8) FABRICIUS HILDANUS Cent. I. Obs. 96.

9) RIEDLIN lin. med. 1700. p. 283.

10) Dum in congregationibus feminarum elegantium, una alterave animo linquit, sociae perfecte sciunt, illis ope relaxationis *indumenti fibularii* succurrendum esse. Miratus sum quanta tunc cum vi thorax, a vinculis suis liberatus, prosilit.

11) *Pugilatio*, graece *πυγμή* dicitur, a voce *πύξ*, quae pugnum denotat. Pertinebat illa ad magnos Graeco-

Violentiae
internae.

2. Non solum violentiae mechanicae plexui coeliaco nervisque diaphragmatis et ventriculi *extrinsecus* illatae, sed et illae quae *intrinsecus* locum obtinent, animi deliquiis et morti improvisae ansam porrigunt. Loquimur de vi, quam illo plexui illisque nervis inferre possunt scirrhus hepatis ¹³⁾, et pancreatis ¹⁴⁾, distensio ventriculi

a sa-

rum ludos. Inter nostri aevi Europaeas gentes, Angli praebent nobis hujus antiqui exercitationis vestigia, ac aliqua similitudo inter anglicum *Box* atque Πύξ graecum vocabulum intercedit. V. *Ephemerides Vilmens.* A. 1816. et de pugilatu apud antiquos. *Vilnae* 1818.

12) „Sic olim vidimus, inflicto vehementer pugno, sub cartilagine mucronata, vitae nodum ex tempore solum.“ LANCISIUS l. c. — CURRY l. c.

13) Mense Decembris 1810. matronam Vilmens. (LISANIEWICZ), quinquaginta annorum, ictero ex hepatis scirrhus laborantem curavi. Morbus quidem conclamatus erat, ast mors adhuc procul apparebat. En aegram de magno cruciatu et *sensu distensionis* in regione epigastrica conquerentem, subsequentibus lipothymiis. Adducor noctu, aegramque cum morte luctantem invenio. Curo ut mox et alter medicus advocetur, qui adveniens totam scenam ab affectione spasmodica accidentali repetiit. Verum post quartam horae partem, aegra, mentis compos, obiit. Secto cadavere invenimus, quod lobus sinister hepatis scirrhosus et maximus, ventriculum adeo deorsum premebat, ut hujus visceris positio fere perpendicularis evaderet. Quanta nervorum distensio ex hac ventriculi depressione oriri debuerit facile intelligitur.

a saburris ¹⁵⁾, a flatibus aut vermibus ¹⁶⁾, a corporibus extraneis ¹⁷⁾, et a sanguine ^{*)}).

3. In animi deliquiis, excitatis a violentiis Cura. mechanicis s temati nervoso illatis, sese commendant *venae sectio*, *hirudines* circa loca maxime affecta, *cucurbitulae scarificantes* ad partes, quae illis cum locis maximum alunt consensum, *affusio aquae frigidae*, *clysteres ex aqua*, *salo* et *aceto*, *emetica*, *arnica* et *electricitas* ¹⁸⁾).

§. XCV.

14) Comitissa T...cz A. 1814. scirrho pancreatis laborabat. Videbatur vitam adhuc per unum alterumve mensem protrahere posse. Quodam vespere dolor epigastrii plus solito urgebat, ac tandem intolerabilis redditur. Quo facto en lipothymia, aliquoties repetita, subsequente brevi post morte. Sectio cadaveris recusata est. Putarem pancreas tumens plexibus nervorum propinquis vim intulisse. — Ex apostemate pancreatis in abdominis cavum rupto, lipothymia jam dudum observata est. V. BONET Sepulchr. L. II. Sect. 10. Obs. 19.

15) RIEDLIN lin. med. 1700. p. 97. — Innumerabiles lipothymias ex erroribus in diacta, praecipue inter infantes vidi.

16) BONET Sepulchr. Lib. II. Sect. 10. Obs. 21.

17) Pruni nuclei (Eph. Nat. Cur. Dec. I. A. 10. Obs. 109) — acus deglutita (ibid. A. 4. et 5. Obs. 86.).

*) Ex tractatu de *haematemesi* (P. III. Vol. I.) palam fiet, morbum istum arcissimum cum lipothymiis nexum habere.

18) W. HUFELAND diss. sistens usum vis electricae in asphyxia. Goett. 1783. — STRUVE l. c. p. 117.

§. XCV.

Ex idiosyncrasia, imaginatione, animi pathematibus, doloribus, voluptate et inanitione.

Idiosyncrasia.

1. Systematis nervosi unicuique homini peculiaris sentiendi ratio, verbo *idiosyncrasia*, efficere potest, ut animi deliquia, sine omni praegressa violentia mechanica, ex rebus alias innocentissimis producantur e. c. ex odore rosarum¹⁹⁾, pomorum²⁰⁾, aceti²¹⁾, casei²²⁾, anguillae assatae²³⁾, — ex intuitu raparum rubrarum²⁴⁾, coloris qualiscunque coccinei²⁵⁾, sanguinis²⁶⁾; — ex ranarum coaxatu²⁷⁾; — ex pectinatione et pressione capitis²⁸⁾, ex praesentia felis²⁹⁾ etc.

2. Jam

19) AMATUS LUSITANUS Cent. II. Cur. 36. — BOHN de officio medici duplici p. 642. — CASTELLI de morbis pectoris p. 114. — Ephem. Nat. Cur. Dec. II. A. 8. Obs. 169.

20) Ephem. Nat. Cur. Dec. I. A. 1. Obs. 125.

21) FABRICIUS HILDANUS. Opp. p. 990.

22) Ephem. Nat. Cur. Dec. I. A. 1. Obs. 125.

23) Miscell. Nat. Cur. Dec. II. A. 3. p. 412.

24) BRAMBILLA vom Phlegmone.

25) Miscell. Nat. Cur. Dec. II. A. 5.

26) BRAUSER an lipothymia venae sectioni semper sine aliqua probabili caussa superveniens ab ea abstinere jubeat? Goett. 1756. — Vidi plurimas feminas plicâ detentas, quae intuitum sanguinis, quin in lipothymiam inciderent, perferre nequibant.

27) AB HEER Obs. 29.

28) FABRICIUS HILDANUS Obs. Cent. VI. N. 33.

2. Jam una *imaginatio* ad animi deliquia excitanda valet ³⁰⁾. Eundem effectum producere ^{Imaginatio, animi pathemata, dolor et voluptas.} queunt *mentis intentio* ³¹⁾, *animi pathemata* ³²⁾, *dolores* ³³⁾, *voluptas*, inprimis a *coitu* ³⁴⁾, quod uteri in animi deliquiis excitandis *vim*, aliunde in *hysteria* ³⁵⁾, *graviditate* ³⁶⁾ et *partu* ³⁷⁾ obviam, probat.

3. Ve-

29) BORELLUS Cent. I. — Ephem. Nat. Cur. Dec. I A. 2. Obs. 50.

30) Eph. Nat. Cur. A. 3. Obs. 35. (In viro caseum abhorrente). J. P. FRANK l. c. p. 313. Not. ***.

31) PLATER Obs. Lib. I. p. 29

32) e. c. *commiseratio* (ab intuitu tum aegrorum operationibus chirurgicis, tum nefariorum executioni criminali subditorum); — *moeror* (AMATUS LUSITANUS Cent. VII. C. 1.); — *zelotypia* (et quidem haud raro); — *timor* (pro prima vice scenam theatralem ascendendo, examina pro gradu absolvendo etc.).

33) RIEDLIN lin. med. 1700. Spec. 2. (Nephritici). — SAUVAGES Class. VI. Gen. XXIII. Spec. 2. (Colici). — Vidi lipothymias ex atrocissima odontalgia; item sub extirpatione mammae canerosae, aegrâ dumtaxat absoluta operatione animi compote redditâ.

34) TIMAEUS Cas. p. 106. — DOLAEUS Encyclopaed. med. p. 364. — Eph. Nat. Cur. Dec. I. A. 3. Obs. 232.

35) P. II. Vol. I. Sect. II. Cap. XIV. §. LXX. 3. (89).

36) VALLISNERI Opp. T. 3. p. 521. — SCHENK Obs. Lib. II. p. 227. — LANGIUS Opp. Vol. III. p. 548. — A. 1806. puellam curavi clandestine gravidam, quae, quoties positionem supinam in lecto derelinquebat, toties in lipothymiam incidebat. Venae sectio illam sanavit.

37) Ex placenta, maxime vero ex grumis sanguineis in

Inanitio. 3. Verum et *inanitio* ex partu cito nimis absoluto, imprimis si infans fuerit corpulentus, aquae copiosae et metrorrhagia conspicua, animi deliquiis ansam porrigere solet. Idem effectus ex inanitione, cui aliae haemorrhagiae ³⁸⁾, seminis jactura ³⁹⁾, diarrhoea ⁴⁰⁾, sudor ⁴¹⁾, aquarum in hydrope ascite repentina eductio ⁴²⁾, fames ⁴³⁾, morbi-

utero retentis. Et *menstruorum suppressionem* lipothymiam producere posse, docent observationes TIMAEI Epist. LII. N. 21., — BINNINGERI Obs. Cent. III. N. 99., — DEKKERI exercitat. pract. p. 528.

38) FORESTUS Lib. XVII. Obs. 8. 9. — Cap. XXXV. §. CLV. 2. — A. 1814. vir in cubiculum meum vix intraverat, cum jam animi deliquio correptus humum ceciderit. Corpore illius prope examinato, caligae sanguine e vasis intestini recti exulceratis veniente, repletae detectae fuerant.

39) TIMAEUS Cas. p. 106. — Onanistici prae omnibus ad lipothymias dispositi sunt.

40) RIEDLIN Observat. Cent. II. N. 46. — Saepe in hystericis a quinque vel sex alvi evacuationibus sibi repenter succedentibus lipothymias observavi.

41) FORESTUS l. c. Obs. 10.

42) P. III. Vol. II. Cap. de hydrope peritonaei.

43) RHAZES AD ALMANS. Tr. VI. C. 6. — RIEDLIN Millenar. N. 43. — Vacuitatem ventriculi ad lipothymias disponere, in iudaeis Lithuanis, jejuniis severe indulgentibus, atque in militibus, exercitiis militaribus stomacho jejuno intervenientibus, quotidie observamus.

morbique praegressi ⁴⁴⁾, ortum praebent, observatur.

4. Praeter remotionem caussarum, condu- Cuius.
cunt: — in animi deliquiis hystericarum — *odora-*
ramenta et subfumigia ⁴⁵⁾; in illis gravidarum —
venae sectio; in illis parturientium — exclusio
foetus, secundinarum, grumi sanguinis retenti,
forte *sanguinis transfusio* ⁴⁶⁾, et in illa ex inani-
tione — *lenta restauratio*. Nutrimenta enim et
pharmaca ad vitam sufflammandam idonea, ita
exhiberi debent, ut a minimo stimulo sensim
sensimque ad validiorem ascendatur.

§. XCVI.

E x g e l u.

1. Haec quoque regula in illis valet animi Notio.
deliquiis, quibus *subtractio caloris*, systemati
nervoso admodum inimica ⁴⁶⁾, ansam praebet,
quaeque in regionibus septentrionalibus commu-
nissima sunt ⁴⁷⁾.

2. Gelu

44) Convalescentes minima porrecta occasione in lipo-
thymias incidunt. Jam ipse illorum *situs erectus* id
efficere potest. V. FR. HOFFMANN de animi deliquiis.
Obs. 2. Opp. T. III. p. 274. — DE MAN *Abhandl.*
vom böartigen Faulfieber p. 130.

45) P. II. Vol. I. Sect. I. Cap. I. §. VI. 47. (81. 83.).

46) PLOUCQUET *Literatura medica digesta*. T. V. art.
chirurgia infusoria et transfusoria.

46) KLOECKHOF *diss. de frigidis, nervorum systemati*
inimicis, ad ductum aphorismi HIPPOCRATIS. Lugd.
Bat. 1736.

Sympto
mata.

2. Gelu expositus homo (inprimis si fuerit debitis vestibus orbatus, quietus, ebrius) primum famem ⁴⁸⁾, dein dormiendi desiderium experitur. Quodsi desiderio isto cedatur, de vita actum est. Praevio enim cutis pallore, cruoris circuitus magis magisque languet, donec tandem ipse humor vitalis, omnisque alius in corpore et praecipue in textu celluloso cutis contentus in glaciem convertatur. Partes solidae substantiam duram, fragilem, elasticam, efformant, ex quo universi corporis rigor. — Interdum asphyxia ad unam dumtaxat corporis partem, sub forma *gangraenae* circumscribitur. Praecedit tunc macula alba, indolens, cui pruritus, rubor, calor, dolor, succedunt, superveniente tandem vesicula, in ulcus mali moris, et, nisi recta adhibeatur cura, ut diximus, in gangraenam transitura.

Cura.

3. Est autem *cura congelatorum* (saepe successu coronata ⁴⁹⁾) sequens: corpus asphyctici spoliatur caute vestibus, cultro et forficibus levi manu solvendis, non vi detrahendis, ne membra rigida frangantur. Ad hoc periculum avertendum aegrotus in illa ipsa corporis positione,

47) Vilnae fere omni anno contingit, ut rustici trahae congelati insidentes, ab equis suis, mercatum adire solitis, ad urbis portas ducantur.

48) „ qui per nives multas incedunt intensissima fame et prae hac saepe *lipothymia* corripiuntur.“ PLUTARCH. Symph. VI. Cap. 8.

49) EL. CAMERARII diss. Taurinenses. p. 66—199.

sitione, quam ei gelu conciliavit, servandus est. Praeterea circumdatur universum corpus, ore et naribus exceptis, *nive*, cum qua et lenes instituuntur frictiones ⁵⁰). Regelato sic quodammodo corpore, *lavatio* ope *aquae frigidae*, primum simplicis, dein vino aut alcohol mixtae, institui debet. Detersum postea corpus pannis laneis, lecto frigido, in cubiculo frigido locato committitur. Possunt et *clysteres frigidi* ex aqua et aceto injici. In malo rebelli, pulmonibus aër, dummodo non calidus, introducendus est ⁵¹).

§. XCVII.

Ex calore et electricitate.

1. Et hìc extremitates oppositae se tangunt. Calor. *Calor* anim ex balneo ⁵²), inprimis vaporis ⁵³),
vel

50) De curationibus tali pacto peractis lege BECKERSCHE *Noth- und Hülfsbüchlein*. 1. Th. Frankfurt 1790. p. 22. — J. P. FRANK l. c. p. 277. — Memorabilis quoque casus a SAUVAGES (Nosologia method. Cl. VI. Gen. XXIII. Spec. 5.) narratur. Miles, inquit, quidam sub plaustro jacens nive tectus erat, alter eundem locum dormiturus occupat et priori inscius incumbibat; calore superincumbentis inferior reviviscens alterum excitat, et sic ambo evadunt, secus somno perpetuo premendi.

51) Cap. XXVII. §. CI. N. 8. (64—75.).

52) AETIUS Tetrab. III. S. I. C. 8. — Plura exempla lipothymiarum in balneo nimis calido ortarum vidi; his gravissimi morbi acuti subsequebantur.

53) Qui balnea vaporum in Rossia pro prima vice ingrediuntur, saepe in lipothymias incidunt.

vel ex congregationibus ⁵⁴⁾ evolutus, saepe lipothymias, ope aerae frigidae non nisi caute profligandas ⁵⁵⁾, producit.

Electrici-
tas.

2. Eundem effectum praestat *electricitas atmosphaerica* ⁵⁶⁾, potissimum *fulmen*.

Literatura.

3. De *asphyxia sideratorum* legi merentur: CHARLETON ⁵⁷⁾, MAJOR ⁵⁸⁾, CRAUS ⁵⁹⁾, ROESER ⁶⁰⁾, VALENTINI ⁶¹⁾, JUCH ⁶²⁾, MÜNNICH ⁶³⁾, VOLMAR ⁶⁴⁾, MARKER ⁶⁵⁾, BÜCHNER ⁶⁶⁾, BIEDERMANN ⁶⁷⁾,

54) In ecclesiis, comitiis, theatris a magno congregationum hominum numero excaefactis, quin aer jam inquinatus dici possit, plurimi animo linqui solent.

55) Gravissimos morbos pulmonum aliorumque viscerum ex incauta hominum lipothymia correptorum frigori expositione, observavi.

56) Uxor Nuntii Hispanici A. 1799. Vindobonae degentis, appropinquante tempestate cum tonitru animo linquebat.

57) De cerebro et fulmine. Lond. 1665.

58) Diss. de tactis fulmine. Kil. 1673.

59) Diss. de fulmine tactis. Jen. 1694.

60) Diss. de fulminatis. Regiom. 1704.

61) De ceraunia et de fulmine tactis. Gies. 1717.

62) Diss. de eo quod medicum decet circa fulmine tactos. Erf. 1737.

63) Relatio physico-medica von zwei durch einen Donnerschlag in Osterwyk verunglückten Personen, deren eine gerettet wurde. Halberst. 1742.

64) Diss. de fulmine tactis. Argent. 1765.

65) Progr. de electricitatis aëreae in corpus humanum actione. Pragae 1766.

66) Diss. de morte in fulmine tactis. Hal. 1766.

MANN ⁶⁷⁾, ACKERMANN ⁶⁸⁾, NIETZKI ⁶⁹⁾, RETZ ⁷⁰⁾, LYON ⁷¹⁾, STADTHOFER ⁷²⁾, VAN MARUM ⁷³⁾, aliique ⁷⁴⁾.

4. Fulmine tactus modo in lipothymiam, Symptomo- modo in asphyxiam incidit. In *lipothymia* facies ^{niata.} tumet, rubet, oculi fixi sunt, sanguine suffusi, lacrymantes; os, nares et aures ⁷⁵⁾ cruorem fundunt;

67) Diss. caussae subitae mortis fulmine tactorum. Lips. 1768.

68) De morbo et sectione fulmine nuper adusti. Kil. 1771.

69) Diss. de methodo morbos inflammatorios a fulmine ortos curandi. Hal. 1771.

70) *Fragmens sur l'électricité humaine.* Paris 1785.

71) *Account of the phaenomena discovered in examining bodies killed by lightning.*

72) *Von der tödtlichen Wirkungsart des Blitzes.* Dresd. 1791.

73) *Beschreibung einer ungewöhnlich grossen Elektrisirmaschine.* Leipzig 1798.

74) Ephem. Nat. Cur. Dec. I. A. 2. Obs. 37. — Dec. II. A. 10. Obs. 136. A. 9. et 10. Obs. 58. — Cent. I. et II. Obs. 28. — *Commercium literar.* Norimberg. 1732. p. 402. p. 739. p. 13. — *Journal des sçavans* 1684. N. 24. — *Histoire de l'académie des sciences à Paris* 1772. p. 14. — *Histoire de la société de médecine* 1776. p. 351. — *Memoirs of the med. society of London.* Vol. VI. Append. — *Journal de medecine.* T. XI. p. 27. T. XXIV. T. LXI. p. 606. — *Philosophical Transact.* Vol. 49. P. 2. Vol. 80. P. 2.

75) HEMMER *Commentaria Academicae Theodoro-Palatinae.* Vol. V. p. 150.

dunt; muscoli, praesertim extremitatum, resoluti cernuntur; respiratio cohibetur; pulsus aut plane desideratur, aut parvus et irregularis fit, deletis simul animi facultatibus ⁷⁶⁾. Praesente *asphyxia*, homo, aut in ea, qua a fulmine tactus fuit, positione manet ⁷⁷⁾, aut dormienti similis invenitur. Hujusmodi asphyctici diutius quam alii calorem retinere solent. Plurimi illorum odorem sulphuris ⁷⁸⁾, aut phosphori ⁷⁹⁾, spirant. Corporis superficies alias intacta, saepius strias rubras, serpentiformes, praesertim ad brachia et ad pectus, exhibet ⁸⁰⁾. Interdum cutis adspectum, ac si a ferro candente tacta fuisset, refert. Nonnunquam illa a vesicis notatur. Crines fere semper adusti.

Autopsiae
cadaverum.

5. Sectis *cadaveribus*, citissime putrescentibus ⁸¹⁾, suffocatisque similibus ⁸²⁾, nec ossa, nec:

76) SPRENGEL *Handbuch der Pathologie*. 3. Th. §. 364, p. 218. 3. Edit.

77) P. II. Vol. I. Sect. I. Cap. XIV. §. LXI. 2. (33). BEAULIEU tractatus de tonitru et fulmine.

78) „Omnibus fulguritis odor sulphuris est.“ SENECA. Nat. Quaest. II. 2. — ROESER l. c. §. XVI. p. 16.

79) BERNT l. c. p. 119.

80) STRUVE *Versuche über die Kunst Scheintodte u. s. w.*

81) Jam EURIPIDES dixerat: *Phaetontem* a fulmine tactum in putredinem abivisse. Poetam errasse contendit BULENGERIUS (De terrae motu et fulmine. L. V. Cap. 11.), propterea quod PLUTARCHIUS (Cap. II. Synipos.) asseruerit: „eorum, qui de coelo tacti sunt, corpora non putrescunt.“ Verum et BRANDESII (*Versuch*).

nec vasa sanguinea (exceptis iis cerebri, utpote interdum dilatatis et disruptis ⁸³⁾) morbosì quid exhibent ⁸⁴⁾. Visa tamen sunt medulla oblongata lacerata, et tympanum evulsum ⁸⁵⁾. Pulmones ut plurimum sunt collapsi et cor sanguine turgidum ⁸⁶⁾.

7. Quì memor est, dari homines adeo ad *Caussac.* combustionem dispositos, ut sponte comburi possint ⁸⁷⁾; ille minime inficias ibit, dari etiam homines, qui prae aliis fulminis imperio subijciuntur. Illius periculum maxime incurritur in *cubiculis* humilibus, angustis, moram faciendo prope parietes, caminum, hypocaustum, specula, candelabra, aliaque utensilia metallica, in lectis ferro munitis, locisque per quae fulmen jam prius sibi viam paraverat; — in *ecclesiis* prope turrim, campanas, organum, imagines sanctorum auro vel argento obductas, portas ferreas elathratas; — in *plateis* prope domus, stillicidia, rivos; — et in *campis* prope arbores, flumina, lacus,

über die Lebenskraft. Hannov. 1796. §. 30) et WENDTII (*LODER's Journal f. die Chirurgie. 1. B. p. 245.*) observationes, de cita cadaverum fulmine tactorum putredine abunde testantur.

82) LESKE *Auszüge aus den Transactionen. 4. B. p. 231.*

83) *Histoire de l'académie R. des sciences. l. c. p. 308.*

84) REIMARUS *Vom Blitze. p. 200.*

85) CHARLETON *l. c.*

86) *Histoire de l'académie l. c.*

87) P. I. Vol. II. Cap. XLIII. §. CLVII.

lacus, frumentum, foenum, equitando curruque vehendo. — Causa proxima sideratorum in suffocatione per vapores sulphureos, in concussionem systematis nervosi per ictum, et in compressionem cerebri a cruore effuso locata est. Illam potissimum in stimulum electricum principium vitae exhaurientem, aliis praeceuntibus⁸⁸⁾, locamus.

Diagnosis. 8. Cognoscitur quod asphyxia, aut mors, fulmini tribuenda sit⁸⁹⁾, dum tempestas cum tonitru vehemente praeiverat; dum cubiculum et vestes miseri odorem sulphureum aut phosphoreum exhalant; dum corpus, vestes, parietes cubiculi, arbores propinqui fulminis praegressi vestigia prae se ferunt, dumque metalla fusa inveniuntur. Posset *combustio spontanea*, in errorem ducere.

Prognosis. 9. Fulminis ictus interdum effectus salutares exerit⁹⁰⁾. Nec ubi ille diuturnam inducit asphy-

88) *Tübingische Anzeigen* 1799. p. 758. — PARKINSON *Merkwürdige Abhandlungen von London*. 2. B.

89) „Hier kann es sich allerdings leicht zutragen, ait BERNT (l. c. p. 120.), was drey Reisegefährten begegnet ist, von denen der eine während eines Gewitters vom Blitze erschlagen wurde, die andern von den Verwandten als des Mordes verdächtig vor Gericht gezogen, jedoch nach der ärztlichen Leichenuntersuchung von allem Verdachte frei gesprochen worden sind. (FORT. FRIDELIS p. 594.)“

90) De morbis rebellibus a fulminis ictu sanatis lege-

asphyxiam ⁹¹⁾, necessario semper interficit ⁹²⁾. Visa est mater fulmine perempta salva prole tum brachiis insidente ⁹³⁾, tum utero inclusa ⁹⁴⁾, et vice versa ⁹⁵⁾. Siderati, qui convalescunt, exhibere solent desquamationem epidermidis ⁹⁶⁾, anæsthesiam ⁹⁷⁾, impotentiam electricitatem atmosphaericam perferendi ⁹⁸⁾, dolores, tumores, paralyses in variis corporis partibus, præsertim vero in extremitatibus inferioribus.

10. Si-

CARTHEUSERUM diss. de singularibus quibusdam morborum curationibus. Francf. 1777. p. 17.

91) Duas horas asphycticus erat aeger fulmine tactus ac sanatus, de quo legitur in *Abhandlungen aus der Naturgeschichte u. s. w., aus den Schriften der Harlemer und andern Holländischen Gesellschaften. 2. B. p. 330.* — ROESER l. c. §. 14.

92) BENE elementa politiæ medicæ. Budæ 1807. p. 278.

93) SCHENK Obs. Lib. I. p. 89. (Exemplum celeberrimi FRACASTORII).

94) *Repliques à VEYRAS sur la nature des arquebusades.* Lyon 1590.

95) De infante mortuo per abortum excluso, matre fulmine tactâ salvâ, narrat HOPPEL (Relat. cur. T. II. p. 42.).

96) ZACCHIAS quaest. med. legales. Lib. II. p. 89.

97) BENEVIENIUS de abdit. Cap. 13.

98) Hoc phaenomenon per notas hucusque stimulatorum leges non explicatur; deberet enim exhausta a fulmine excitabilitas, ad minorem electricitatis stimulum viæ sensilis esse.

Cura. 10. Sideratus illico ex loco recluso ⁹⁹⁾ removendus et vestibus spoliandus est. Porro si indicia inflammatoria adsint, mox *vena*, aut jugularis aut mediana, *sauciari* debet. Copiosae dein *hirudines* ad tempora, et *cucurbitulae scarificantes* ad nucham applicantur. Adspergitur interea aeger *aqua frigida*, foveturque caput epithemate ejusdem temperaturae, non neglectis *clysteribus* ex aqua tepida, aceto et sale. A remediis calefacientibus et a frictionibus abstinendum ¹⁰⁰⁾. Illis dumtaxat locus est, si aegri habitus fuerit gracilis, pallidus, pulsusque nullus; tunc quoque *calor*, *vinum*, *electricitas* ¹⁾, et auxilia respirationis opus restituentia ²⁾, indicantur. Summam laudem in asphyxia sideratorum sibi promeruit *Geochosia* seu *balneum terrae* ³⁾, posito corpore denudato oblique et capite elevato in fossam cooperiendoque corpus, ex-
cepta

99) „Romani locum in quem fulmen inciderat pro *sacro* habebant, quod eum (locum) sibi Deus dicasse videretur.“ (FESTUS).

100) ZARDA l. c. — STOLL l. c. p. 62. — STRUVE l. c. p. 98.

1) FOTHERGILL apud HAWES l. c. — STOLL l. c. p. 63. — SCHOUTEN l. c.

2) Cap. XXIII. §. CI. N. 8. (64 — 75).

3) POPPE l. c. p. 490. — STRUVE l. c. p. 98. — STOLL l. c. — *Deutscher Mercur* 1786. — *Salzburger medicinisch-chirurg. Zeitung* 1790. 4. B. p. 224. — Lithuanae incolae magni hoc auxilium faciunt momenti, ipse vero relate ad illud experientia destitutus sum.

cepta facie (aqua frigidâ reiteratis vicibus adspargendâ), levi terra ad altitudinem manus, donec aut convalescentiae aut mortis indubitata appareant vestigia. Agitne terra instar alcali, exhaustam a fulminis stimulo excitabilitatem resarciendo ⁴⁾? Revera et *alcali* fixum hic commendatum fuit. Forte cura tetani, auctore Stürtz ⁵⁾, conveniret?

§. XCVIII.

A miasmate. Contagio et narcoticis.

1. Fulminis vim quodammodo aemulantur Miasma. exhalationes paludum, vulgo *miasmata*. Prosterunt nempe quandoque ita sanissimos robustissimosque homines, ut pro tempore in agone constitui videantur. Pro tempore, inquam, ita tale malum *periodice* decurrere solet, quamobrem *febris intermittens perniciosa syncopalis* auditur ⁶⁾. Typum iste morbus servare solet tertianae aut simplicis aut duplicis. Aeger nullo dolore perculsus, frequenter, graviter et absque caussa manifesta languet, exsolvitur, et animâ deficit sive de latere in latus se velit convertere, an manum tentet loco movere. Faciem tunc habet cadavericam, colorem plumbeum, oculos

Hh 2

semi

4) HUMBOLDT *Versuche über die gereizte Nervenfaser.*
Berlin 1797.

5) P. II. Vol. I. Sect. II. Cap. XIII. §. LXVIII. N. 2.

6) *Synonyma*. Amphimerina syncopalis, tritophia syncopalis; syncope febricosa, febris syncopalis.

semi clausos, albumque tantummodo exhibentes, anhelitum sublimem, supinumque sine motu decubitus 7). Nisi (fugatis si opus sit prius complicationibus) *cortex cinchonae officinalis*, uti in aliis febribus perniciosis *), porrigatur, secundus aut tertius febris accessus aegrum e medio tollit.

Contagium.

2. Et febres continuae a *contagio* excitatae interdum cum lipothymiâ ingruunt 8), eaque hinc inde solvuntur 9).

Narcotica.

3. Doctrinam, quae ad animi deliquia a *narcoticis* excitata spectat, jam in alio hujus operis loco 10), explanavimus. Mentio quoque injicienda fuisset de *seminibus colchici autumnalis* 11) et de *stipitibus solani dulcamarae* 12).

§. XCIX.

7) TORTI therapeutica specialis ad febres periodicas perniciosas. Venet. 1732. Lib. IV. Cap. 2. p. 210.

*) P. I. Vol. I. Cap. II. §. XXX. N. 16.

8) SENAC de corde. Lib. IV. Cap. 12. p. 548. — *Annales de la société de médecine de Montpellier. T. 25. p. 367.*

9) J. P. FRANK l. c. p. 45. (Proprii sui morbi historia enarratur. Asphyxia quatuor perduravit horas).

10) P. II. Vol. I. Sect. II. Cap. XXV.

11) Chirurgus Vindobonensis conspicuus, affectionibus arthriticis excruciatu, sibi *tincturam colchici autumnalis* cum vino madera paratam ex Anglia committi curavit. Lagenâ hac tincturâ repleta, in cellario deposita, atque, commutando domum, oblivioni tradita fuit. Detecta illa lagena fortuito a famulo (A. 1823. mense Octobri), illud liquidum, quod pro vino puro

§. XCIX.

A vaporibus carbonum.

1. *Fodinae carbonum fossilium et carbones* Notio. *accensi*, homines qui illis exponuntur, vigiles — in *lipothymiam*; dormientes, — in *asphyxiam* conjicere solent.

2. *Lipothymiae*, praevio capitis dolore sum-Sympto-
mo, aurium susurru, proclivitate ad somnum, mata.
virium prostratione, vomituque ingruunt; *asphy-*
xiae a sensu angustiae sub somno, aegro caete-
rum motus voluntarios instituendi impote, an-
nuntiantur ¹⁴). Priusquam asphyxia omnibus
nume-

habuit, cum familia sua epotavit, duobus inde sub-
sequentibus funeribus.

12) A. 1819. mense Majo, feminae nobilissimae, in-
farctu glandulae in mamma laboranti, infusum *solani*
dulcamarae, ex drachinis duabus stipitum ad colatu-
ram librae unius paratum, ac quotidie sumendum,
praescripseram. Cum vero aegrota sex dosibus jam
usa esset, lipothymiis obnoxia facta est. Caussam
illarum in dulcamara quaerens, eam seposui. Eva-
nuerunt ab illo tempore lipothymiae. Elapsis non-
nullis diebus, experimenti gratia, iterum laudatum
infusum praescripsi, ac eodem plane cum effectu. —
De lipothymia ex *massa pilularum de cynoglosso* lege
Ephem. Natur. Cur. Dec. II. A. 6. Obs. 202. deque
alia ex *opio*, per glaciem super abdomen et clysteres
frigidos sanata, MICH. PORTAL in *Journal de méde-*
cine, chirurgie et pharmacie 1815. Juin. p. 136.

14) Sic mihi nonnulli homines, quos ex asphyxia sani-
tati restituere potui, narrarunt.

numeris absoluta fiat, aegroti apoplecticorum more, tamen sine notis paralyticis, decumbunt. Facies illis rubet, livetque; respiratio est stertorosa. Sphincterum officium conspicitur deletum. Pulsus tangitur modo magnus et lentus, modo frequens et filiformis. Plurimi vomitum patiuntur.

Autopsiae
cadaverum.

3. *Cadavera* exhibent ¹⁵⁾: livorem fere universalem, oculos rubros, interdum spumam coram ore, semper membranam Schneiderianam, musculos capitis et faciei, atque pericranium purpureo colore notatos, — meninges et cerebrum in statu normali vasaque sanguinea encephali nonnunquam dilatata cruore turgida membranam mucosam tracheam et bronchia investientem ruberrimam, — pulmones sanos, — aortam vacuum, — venam cavam cruore repletam, — sanguinemque tum arteriosum tum venosum aequo pacto atrum et solutum ^{**}).

Gaussae
occasionales.

4. Quadraginta tres casus asphyxiarum a vapore carbonum, quos novendecim annorum curriculum Vilnae ex propria experientia collegimus, ortum debebant fornacibus, sic dictis Svecicis ¹⁶⁾,

quate-

15) Plurima cadavera ipse secavi, alia LOBENWEIN. Illius observationes continentur in *Pamiętnikow Towarzystwa lekarskiego Wileńskiego. T. I. Wilna 1818. p. 145.*

**) BERNI l. c. p. 115.

16) Sub nomine *fornacis Svecici* intelligitur fornax, cui ligna in ipso cubiculo committuntur. Vices hinc agiti-

quatenus videlicet canalis, per quem vapor carbonum avolare deberet, aut fortuito, aut consulto ¹⁷⁾, mature nimis claudabatur. In Gallia et Italia idem malum a carbonibus accensis, ad cubicula dormitoria, aut ad alia loca reclusa, deportatis, observatum et ut rarum descriptum est ¹⁸⁾.

5. Carbonum vapor corpori humano duplici ^{Diagnosis.} ratione infensus est, nimirum tum per evolutionem gaz acidi carbonici opus respirationis laedentis, tum per principium aliquod narcoticum systemati nervoso, praecipue cerebro, infensum. Effectus veneficos vaporis carbonum, magis ab hoc principio narcotico, quam ab illo gaz

simul camini, ac mirifice aërem cubiculi mutare adjuvat. Ast dum canalis, exitui vaporis carbonum dicatus, antequam hi plane ardere cessaverint, clauditur, malorum non datur finis.

17) Rustici Lithuani in propriis tuguriis fumo (ast illo innocenti ex lignis ardentibus manante) delectantur. Dum hyemali tempore ad urbem se conferunt, ac cubicula fornacibus svecicis instructa inhabitant, ad fumum obtinendum, canalem, per quem carbonum vapor avolare deberet, hora somni (aeterni), claudunt.

18) *Histoire de l'académie R. des sciences* a. 1701. p. 18.

— BUQUET in *Mémoire de la société R. de médecine* a. 1776. p. 183. — HERMANT *Mémoires sur les effets funestes du charbon allumé.* — PORTAL *Rapport sur les effets des vapeurs méphitiques dans le corps de l'homme.* p. 1. 2. 3. — J. P. FRANK l. c. p. 132.

gaz repetimus; vidimus enim quod, dum plures homines in uno eodemque a vapore carbonum contaminato loco, diversa super strata jacent, ii qui superius locati sunt, plus quam inferiore loco positi, patiuntur, cum tamen, si gaz acidum carbonicum caussa praecipua asphyxiae esset, contrarium phaenomenon contingere deberet. Vidimus porro homines sanos, in loca a vapore carbonum contaminata, intrasse, ibique tam diu, quam ad asphycticos extrahendos requirebatur, mansisse, quin illi homines detrimentum acceperint, quod in atmosphaera respirationi non idonea neutiquam fieri potuisset. Nil praeterea clarius demonstrat, vim veneficam vaporis carbonum, quin negotium respirationis laedatur, locum habere posse, quam experimenta cum animalibus capta, quae scilicet animalia etiam tunc, dum excepto capite, vaporis illo exposita erant, necabantur¹⁹⁾. Nullibi vis venefica caussae allatae magis patet quam in infantibus, quos, etiamsi vaporis carbonum vix aut ne vix quidem in cubiculo obvenerint vestigia, attamen febre cum faciei rubore, inquietudine et vomitu graviter laborasse observavimus. Quoniam vero haec symptomata etiam *dentitioni laboriosae* et *encephalitidi* communia sunt, cavendum ne, quod

19) CARMINATI de animalium ex mephitibus et noxiis halitibus interitu ejusque caussis. Laude Pompeja 1779.

quod carbonum vaporī tribuendum est, illis tribuatur morbis.

6. Nisi aeger citissime extra atmosphaeram ^{Prognosis.} a carbonum vapore contaminatam trahatur, morbus radices adeo altas agere solet, ut, etiamsi perfecta necdum locum obtineret asphyxia, arduum sit auxilium afferre. Licuit nobis tamen semel ²⁰⁾ inter novem milites asphycticos septem salvare. Semper lenius affliguntur, qui in vomitum aut spontaneum aut artificialem incidunt. Pessimum hinc etiam indicium esse solet, dum emetica, majori dosi exhibita, effectum recusant. Caeterum prognosis maxime a statu sensorii communis et respirationis desumenda est. Interdum tamen capite sat libero, febris, notas typhoideas exhibens, et bronchitidi rupta, vitae insidias struit. Haec simultanea actio vaporis carbonum tum in systema nervosum, tum in membranam mucosam vias aëreas ambientem, affinitatem illius cum nonnullis contagiis febrilibus ostendit.

7. *Methodus medendi*, a multiplici nostra ^{Cura.} experientia confirmata, sequens est. Deportato quo citius id fieri licet, aegro in aërem liberum, spoliatur vestibus et locetur capite elevato super mensam. Si pulsum obvenient vestigia, illico *venae sectio* aut ex jugulari aut ex mediana instituenda est. Simul copiosae *hirudines* circa

20) A. 1806. Vilnae.

circa tempora et retro aures applicandae sunt. Facies et reliquum aegri corpus *aqua frigidiuscula et aceto* adspergitur, loca dein madida panno laneo abstergendo. Solae palmae manuum et plantae pedum pectinibus setaceis perfricantur. Ano injicitur *clyster* ex aqua frigida, aceto et sale. Omni jure clysteres ex fumo nicotianae (utpote intestina distendentes hincque pulmones in angustum spatium comprimentes atque aliunde vi narcotica praediti) damnantur ²¹⁾. Si aeger deglutire valeat, et sponte non multum vomat; *solutio tartari emetici* ²²⁾ ingerenda. Turpiter enim errant qui vomitum non esse excitandum docent ²³⁾. — Quodsi respirationis opus jam deletum foret, illud ope introductionis aëris in pulmones ²⁴⁾ excitandum. Comparente febre cum notis bronchitidis, frigus evitandum, et aeger secundum regulas generales ²⁵⁾ curandus.

Alii vapores.

8. In cubiculis recenter dealbatis aut coloribus oleariis pictis nec non in fodinis metallicis, aër,

21) PORTAL l. c.

22) Fortis solutio exhibenda e. c. grana tria in duabus aquae destillatae unciiis, capiat binis vicibus, tempore octavae horae partis, et repetatur si opus fuerit.

23) OREILA l. c. p. 199.: „*ce moyen (la saignée) est préférable à l'émétique, dont on a quelque fois fait usage en pareil cas, et qui a été plutôt nuisible qu'utile.*“

24) Cap. XXIII. §. CI. N. 8. (64 — 75).

25) P. II. Vol. II. Sect. I. Cap. VIII. §. XXXVI.

aër, particulis *calcis* ²⁶⁾, *plumbi* ²⁷⁾, *arsenici*, *olei terebinthinae* ²⁸⁾ imbutus, simulque debita gaz oxygenii portione orbatus ²⁹⁾, tum systemati nervoso, tum viis pneumaticis insidias struit, quibus secundum leges vix expositas ³⁰⁾ occurrere studemus,

CAPUT XXIII.

De animi deliquiis pneumaticis.

§. C.

Ex impedito ad pulmones recens natorum aëris accessu.

1. **C**ommunissimum est animi deliquium Notio. *ex impedito ad pulmones recens natorum aëris accessu.* Doctrina huc spectans a scriptoribus de asphyxia infantum in genere ³¹⁾ illustrata est.

2. Caus-

26) P. II. Vol. II. Sect. I. Cap. VIII. §. XXXIII. N. 2.

27) P. II. Vol. I. Sect. II. Cap. XII. §. LXI. 2. (18).
§. LXII. 5.

28) *Gazette de santé*. 1815. Juillet.

29) KNAPE *Kritische Annalen der Staatsarzneykunde für das neunzehnte Jahrhundert*. 1. B. 1. Th. p. 123.

30) N. 7.

31) Cap. XXII. §. XCIV. N. 1. (3).

Causae. 2. *Causae* accessum aëris ad pulmones recens natorum impediens sunt, mors matris gravidæ, partus foetus adhuc a membranis circumdati ³²⁾, contractio orificii uteri capite sive praevio sive postero, spasmus vaginae capite postero ³³⁾, obvolutio colli a funiculo umbilicali, glandula thymus praemagna ³⁴⁾, liquor amnii ³⁵⁾, cruor, mucus os et pulmones oppilantes.

Cura. 3. Quo ultimo in casu cavitas oris illico ope digiti a corporibus extraneis liberanda est. Hoc labore peracto homo sanus proprium in pulmones infantum introducere debet halitum. Methodum huiusmodi, qua permultos infantes salvavimus, illi aërem per *follem* introducendi, cum aliis ³⁶⁾, longe anteponimus. Vanus enim est timor quod aër, qui jam semel respirationi inservierat, ad functionem istam provocandam altera vice non sit idoneus. Immo, aër ille, utpote

32) BERNT l. c. p. 84.

33) PLENK *Anfangsgründe der Geburtshülfe*. Wien 1768. p. 158. — WIGAND *Die Geburt des Menschen*. Berlin 1820.

34) SCHALLGRUBER *Aufsätze und Beobachtungen aus dem Gebiete der Heilkunde*. Grätz 1816. (Ponderis granorum 345).

35) SCHEEL *Commentatio de liquoris amnii asperae arteriae foetuum humanorum natura et usu*. Hafn. 1799. p. 15. 59. — TODE *Medicinisches Journal*. 3. B. p. 221.

36) SMELLIE, LEVRET, PORTAL, DUFFOT, FAISSELE, J. P. FRANK (l. c. p. 249.) et STRUVE (l. c. p. 112.).

utpote minus oxygenii continens ideoque minus stimulans, ita sensibilitati exquisitae recens naturae quadrare videtur, uti tenuissimus victus, illis qui a fame exhausti sunt, quadrat. Praeterea thorax, opus respirationis imitando, vicissim comprimitur et relaxatur. Haec operatio in *balneo tepido*, ex aqua et vini portione, infante in alterutrum latus decumbente suscipitur, non neglectis frictionibus totius corpusculi et praesertim regionis epigastricae. Haec porro regio, aequae ac facies vicissim aquâ frigidusculâ adspargitur. Sunt qui *embrocationem* commendant³⁷⁾. Nec *applicatio caloris sicci* ope panni lanei, nec *clysteres* ex infuso florum chamomillae oleo et sale, negligendi sunt; quae si non juverent, *electricitati*³⁸⁾ quoque locus foret.

§. CI.

Ex submersione in aquis.

1. Asphyxiarum nulla tot indaginum fuit Notio. objectum illâ *submersorum*.
2. Quod probant, praeter supra allatos *Literaturae* auctores³⁹⁾, CONDRACHIUS⁴⁰⁾, THOMASII⁴¹⁾,^{ra.}

SEB.

37) NIEMAYER in *Journal der Erfindungen, Theorien und Widersprüche in der Natur und Arzneywissenschaft*. 2. Th. p. 101.

38) BOER *Abhandlungen und Versuche, Geburtshülfflichen Inhalts*. 2. Th. p. 13. 26.

39) Cap. XXI. §. XCI. N. 2 (78).

40) De rabie — de iis qui submerguntur. Francf. 1610.

SEB. ALBINUS *), PECHLINUS ⁴²⁾, SELIGMANN ⁴³⁾,
 BECKER ⁴⁴⁾, CRAUSIUS ⁴⁵⁾, DETHARDING ⁴⁶⁾, CHA-
 RISIUS ⁴⁷⁾, LAUREMBERT ⁴⁸⁾, BEHRENS ⁴⁹⁾, SCHUL-
 ZEN ⁵⁰⁾, BRENDDEL ⁵¹⁾, ZIEGLERN ⁵²⁾, ROEDERER ⁵³⁾,
 SQUA-

41) De morte in undis contra Servium. Lips. 1667.

*) *Kurzer Bericht und Handgriff, wie man mit den Per-
 sonen, so in Wassergefahr gerathen, nicht zu lange im
 Wasser gelegen, doch gleichsam für todt herausgezo-
 gen werden, umgehen solle.* 1675.

42) De aëris et alimentorum defectu et vita sub aquis.
 Kiel. 1676.

43) De hominibus Ένυδροβiosis. Rostock. 1681.

44) De submersorum morte sine pota aqua. Gies.
 1704.

45) Diss. de restitutione in vitam suffocatorum laqueo
 vel in aqua. Jen. 1705.

46) Epistola de methodo subveniendi submersis per la-
 yngotomiam. Rost. 1714.

47) Diss. de morte submersorum in aquis. Regiom.
 1735.

48) Diss. ergo demersorum vitae fons ultimus est re-
 spiratio. Paris. 1740.

49) *Kunst ertrunkene Menschen wieder zu erwecken.*
 Braunsch. 1742.

50) *Nachricht von den neuesten Versuchen im Wasser ver-
 unglückte Menschen wieder zu erwecken.* v. Hall. An-
 zeigen 1742.

51) Diss. experimenta circa submersos in animalibus in-
 stituta. Goett. 1754.

52) Diss. de submersis et methodo illis succurrendi.
 Basil. 1754.

53) Diss. sistens de submersis aqua. Goetting. 1760.

SQUARIO ⁵⁴), ISNARD ⁵⁵), EBERHARD ⁵⁶), JAEGER ⁵⁷),
 BONAMY ⁵⁸), DUCHEMIN DE L'ÉTANG ⁵⁹), ESCHEN-
 BACH ⁶⁰), PAPIUS ⁶¹), HAEN ⁶²), CHAMPEAU et
 FAISSOLE ⁶³), GRUMMER ⁶⁴), MENN ⁶⁵), PIA ^{*}),
 REDLICH ⁶⁶), NACHTIGALL ⁶⁷), PLATZ ⁶⁸),
 KÜHN ⁶⁹),

54) *Dissertazione epistolare intorno al ravivar i sommersi.*
Venezia 1761.

55) *Cri de l'humanité en faveur des personnes noyées.* Pa-
 ris 1762.

56) *Diss. de submersorum vita restituenda.* Helmst.
 1767.

57) *Diss. experimenta de submersis.* Tübing. 1769.

58) *Nouvelles expériences pour sauver les noyés.* v. Ga-
 zette salulaire. 1770.

59) *Mémoires sur la cause de la mort des noyés pour ser-
 vir de reponse à Mrs. FAISSOLE et CHAMPEAUX* 1770.

60) *Arzneymittel z. Rettung der Ertrunkenen.* Rost. 1771.

61) *Diss. exhibens tum modum et causam in aquis sub-
 mersorum, tum etiam generalem methodum et reme-
 dia, quibus illi qui in aqua vel fumo carbonum ex-
 tincti videntur ad vitam iterum resuscitari possunt.*
 Herbip. 1771.

62) *Abhandlung über die Art des Todes der Ertrunkenen,
 Erhenkten und Erstickten.* A. d. Lat. Wien 1772.

63) *Erfahrungen und Wahrnehmungen über die Ursachen
 des Todes bey Ertrunkenen.* Danzig 1772.

64) *Diss. de submersorum resuscitatione.* Lips. 1774.

65) *Diss. de submersis et suspensis.* Erlang. 1774.

*) *Détail des succès de l'établissement que la ville de Pa-
 ris a fait en faveur des personnes noyées.*

66) *Diss. de submersorum resuscitatione.* Lips. 1774.

67) *Diss. de causa mortis submersorum.* Viennae 1775.

68) *De causa mortis submersorum.* Viennae 1775.

KÜHN⁶⁹⁾, POHL⁷⁰⁾, KOHLREFF⁷¹⁾, TESTA⁷²⁾,
 M'DONNEL⁷³⁾, LEITER⁷⁴⁾, FULLER⁷⁵⁾, LEON-
 HARDI⁷⁶⁾, GOODWYN⁷⁷⁾, SCHIMM⁷⁸⁾, METZGER⁷⁹⁾,
 FRANKS⁸⁰⁾, SCHRAGE⁸¹⁾, S. G. VOGEL⁸²⁾, CO-
 LEMANN⁸³⁾,

69) Diss. de causa mortis hominum aqua submersorum, eosque in vitam revocandi methodo Graecis usurpata. Lips. 1778.

70) Progr. de difficili disquisitione cadaverum aqua submersorum. Lips. 1778.

71) *Von der wahren Todesart der Ertrunkenen.* Lübeck 1778.

72) *Della morte apparente degl' annegati.* Firenze 1780.

73) Diss. de submersis. Edinb. 1784.

74) Diss. de asphyxia aquis submersorum. Argent. 1785.

75) *Some new hints relative to the Recovery of Persons drowned.* Lond. 1785.

76) Progr. de latice pulmonum spumoso, hominis vivi submersi signo ambiguo. Viteb. 1786.

77) *The connexion of life with respiration, or an experimental inquiry into the effects of submersion.* Lond. 1788.

78) Diss. de submersis. Argent. 1788.

79) Animadversiones in hypothesin GOODWYN de submersis. Regiom. 1789.

80) *Observations on animal life and apparent death from accidental suspension of the function of the lungs, with remarks on the Brunonian system of medicine.* Lond. 1790.

81) Diss. de submersis. Harderov. 1790.

82) *Medicinish-politische Untersuchungen der Ursachen, welche die Wiederherstellung der Ertrunkenen so selten machen.* Hamb. 1791.

LEMANN ⁸³), GEHLER ⁸⁴), HAMILTON ⁸⁵), WOOD-
 FORD ⁸⁶), RÜDIGER ⁸⁷), FOTHERGILL ⁸⁸), KITE ⁸⁹),
 MURRAY ⁹⁰), VAN MARUM ⁹¹), WIEDEMANN ⁹²),
 SCHMIDT ⁹³), PLOUCQUET ⁹⁴), FINE ⁹⁵), BER-
 GER ⁹⁶),

83) *Abhandlung über das durch Ertrinken, Erdrosseln und Ersticken gehemmte Athemholen; nebst Vorschlägen zu einer neuen Behandlungsart dieser Krankheit. A. d. E. Leipzig 1793.*

84) *Cur rarum sit, submersos vitae reddi. Lips. 1787.*
 — *Pr. momenta quaedam, quae ad vitam hominum submersorum restituendam multum favere videntur. Lips. 1793.*

85) *Rules of recovering Persons recently drowned. Lond. 1794.*

86) *Diss. de resuscitatione submersorum. Edinb. 1794.*

87) *Ueber die Rettungsmittel, welche bey Ertrunkenen anzuwenden sind. Tübing. 1794.*

88) *Inquiry into the suspension of vital action in cases of drowning and suffocation. Lond. 1795.*

89) *Essays and observations physiological and medical on the submersion of animals. Lond. 1795. — Memoirs of the medical society of London. Vol. 3. N. 14.*

90) *Diss. de natura mortis ex submersione oriundae. Edinb. 1796.*

91) *Beobachtungen und Versuche über die Rettungsmittel Ertrunkener. Leipzig 1796.*

92) *Anweisung zur Rettung der Ertrunkenen. Braunschw. 1797.*

93) *Diss. de caussa mortis submersorum. Goett. 1798.*

94) *Diss. sistens animadversiones quasdam in statum et therapiam submersorum. Tub. 1799.*

95) *De la submersion, ou recherches sur l'aphyxie des*
 Frank Prax. II. 2. 2.

GER ⁹⁶), GÜNTHER ⁹⁷), VIBORG ⁹⁸), STEVENS ⁹⁹), FINE *), aliique ¹⁰⁰).

Sympto-
mata.

3. Homines in aquis submersi exhibent corpus frigidum, extremitates rigidas, caput inflatum, faciem tumidam, ex livido rubram, oculos fixos et prominentes, linguam saepe volumine auctam ac interdum extra os pendulam, hocque cavum

noyés et sur la meilleure méthode de les secourir. Paris 1800.

96) *Sur la cause de l'asphyxie par submersion. Paris 1805.*

97) *Geschichte und Einrichtung der Hamburgischen Rettungsanstalten für im Wasser verunglückte Menschen. Hamburg 1808.*

98) *Pathologische Bemerkungen über ertrunkene Thiere. v. Nordisches Archiv. 1. B. 1. St. p. 1.*

99) *V. The medical and surgical Register, consisting chiefly of cases in the New-York hospital. By J. WATTS, V. MOTT. New-York 1818.*

*) *Chirurgus Genevensis opus de submissione publici juris reddidit, quod necdum accepi.*

100) *Avis pour donner du secours à ceux qu'on croit noyés. Strasb. 1740. — Die Kunst ertrunkene Menschen wieder zu erwecken. Augsb. 1756. — Anzeigen der bewährtesten Mittel, dadurch Menschen, die im Wasser erstickt, gerettet werden können. Hamb. 1769. — Anleitung, wie den Ertrunkenen zur Rettung des Lebens Hülfe zu leisten. Zürich 1779. — Magazine: — Berliner. 2. B. p. 472.; — Bremisches. 2. B. p. 567.; — Dresdner. 2. B. p. 284.; — Hamburgisches. 26. B. p. 205.; — Hannöverisches 1764. p. 367. — 1768. N. 100. — 1769. N. 51, 52. — Mercure Suisse. 1733.*

cavum nec non faucium illud a mucro cruento repletum, pectus et abdomen prominentia, sensuum officium deletum, respirationem abolitam, pulsumque nullum.

4. In *cadaveribus* tum hominum tum animalium (experimenti gratiâ) submersorum observata fuere: vasa cerebri vacua ¹⁾, saltem non plena ²⁾, alias cruore distenta ³⁾, nunquam vero disrupta ⁴⁾; venae jugulares et cava turgidae ⁵⁾, venae pulmonis et arteria aorta sanguinem atrum continentes ⁶⁾, — cor dextrum cruore plenum ⁷⁾, sinistrum sanguine nigro refertum ⁸⁾; — epiglottis erecta ⁹⁾, vel saltem non depressa ¹⁰⁾; pulmonum parenchyma aëre et sanguine repletum ¹¹⁾, cellulaeque aëreae disruptae ¹²⁾. — Quaeris vero praecipue, *num pulmones et ventriculus aquam contineant nec ne?* — Aquam vel nullam vel admodum paucam in illis visceribus invenerunt

li 2

DETHAR-

1) SCHRAAGE l. c.

2) CHAMPEAUX et FASSIOLE.

3) PORTAL l. c. *Dictionnaire encyclopédique. Edit. Genève* T. 33. p. 196.

4) GOODWYN l. c. p. 4.

5) Medic. Siles. satyrae. Spec. II. p. 14.

6) VIBORG l. c.

7) COLEMANN l. c.

8) VIBORG l. c.

9) HAEN l. c. PORTAL l. c.

10) MOROAGNI de sed. et caus. morb. Epit. XIX. 44.

11) WEBER obs. med. Fasc. I. N. 1.

12) WALTER de apoplexia p. 64.

DETHARDING¹³⁾, BECKER¹⁴⁾, GARDANE¹⁵⁾, TISSOT¹⁶⁾, MORGAGNI¹⁷⁾, ISENFLAMM¹⁸⁾, J. HUNTER¹⁹⁾, KITE²⁰⁾, LEPROTTI²¹⁾, GOODWYN²²⁾, aliique²³⁾. Altera ex parte, aquam, vel quodcunque demum liquidum, in quod homo immersus fuit²⁴⁾, in pulmonibus aut ventriculo reperiunt ROEDERER²⁵⁾, HALLER²⁶⁾, LENTIN²⁷⁾, STRUVE²⁸⁾,

FOTHER-

13) l. c.

14) l. c.

15) *Journal de ROZIER* 1778. *Mois de Janvier, Février, Mars.* V. SCHERF *Archiv für die medicinische Polizey.* 3. B. p. 194.

16) *Anleitung für das Landvolk.* p. 426.

17) *Epist. anat. medic.* XIX.

18) *Versuch einiger praktischen Anmerkungen über die Muskeln.* §. 53.

19) *Proposals for the recovery of persons apparently drowned; in Observations on certain parties of the animal oeconomy.* Lond. 1786.

20) l. c. p. 91.

21) *Commentar. Bonon.* T. I. p. 345.

22) l. c. p. 14. 15. 19.

23) *Act. Berolinens. Dec. II. Vol. 3. p. 38.* — BONNIUS *de renunciatione vulnerum.* Dec. II. App. p. 194.

24) Legitur apud PORTAL (*sur les vapeurs méphitiques* p. 23.) de viro in cloaca suffocato, cujus trachea stercore repleta erat.

25) l. c. p. 2.

26) *Opuscula pathologica.* p. 156.

27) *Beobachtungen einiger Krankheiten* p. 116. 120. (aqua in ventriculo).

28) l. c. p. 105. (Vomitibus aquae).

FOTHERGILL ²⁹⁾, KNAUS ³⁰⁾, HAEN ³¹⁾, LITTRE ³²⁾, LOUIS ³³⁾, PLOUCQUET ³⁴⁾, VIBORG et SCHEEL ³⁵⁾ atque KOPF ³⁶⁾.

5. Observationum illa discrepantia, ex co-Causa
nata plus minus efficace sub undis respirandi, proxima.
atque ex fortuito epiglottidis statu, aditum aquis
ad tracheam modo concedente, modo denegante,
ortum trahit. Consensu vero omnium stabilitum
est, *mortem submersorum neutiquam aquae de-*
glutitae adscribi posse. Neque illam generis esse
apoplectici, ut LITTRE, WALTER et KITE do-
cuerunt, ex argumentis, a GOODWYN, FOTHER-
GILL et COLEMANN allatis, elucet. Duo inter
illa maximi facimus momenti, nimirum 1^o quod
vasa cerebri in submersis, etiamsi aliquando tur-
geant, minime tamen disrupta obveniunt et 2^o
quod ii submersorum, qui salvantur, nunquam
apoplexiae reliquias, paralysin videlicet, exhibent.
Quae cum ita sint, nil restat, nisi mortem sub-
mersorum *ex impedito accessu aëris ad pulmones*
et denegato inde processu oxygenationis sangui-
nis

29) l. c. p. 73. 74. (Tres mensurae aquae ex ore fluentes).

30) *Salzb. med. chir. Zeit.* 1794. 3. B. p. 417.

31) Ratio medendi continuata. T. I. C. 2.

32) *Mémoire de l'académie R. des sciences.* a. 1719. p. 26.

33) *Lettres sur la certitude des signes de la mort.* Paris
1752.

34) l. c.

35) *Neues Nordisches Archiv.* 1. B. p. 1—44. 295—298.

36) *Jahrbücher der Staatsarzneykunde.* 3. Jahrg. p. 5. 6.

nis et evolutione caloris animalis, derivare. Pereunt hinc submersi (sunt similes aegrotis a morbo coeruleo detentis) *ex suffocatione et ex congelatione*, si dicere liceat, *interna*.

Diagnosis. 6. Verum ne credas omnem inventum in undis hominem, modo vix indicato, periisse. Potest enim quis fortuito in aquis apoplexiâ corripî, ac apoplecticus jam factus submergi; possent tandem et cadavera hominum, qualicunque demum modo peremptorum, in undas conjici ibique reperiri. Pars ista *diagnoseos* medicinae forensis sistit objectum.

Prognosis. 7. Nisi corpora submersorum laesiones, quae cum vita existere nequeunt, vel putredinis indicia prae se ferant, de restauratione nunquam est desperandum. Quò minus frigida atmosphaera et aqua, in qua corpus degebat; eo major sanationis spes³⁷⁾. *Tempus submersiones* minus quam vulgo creditur *prognosin* regit: Extant nimirum exempla hominum breve admodum per tempus submersorum, qui nihilominus salvari haud potuerant, extantque contraria, inter quae, non quidem ad illa a PECHLINO³⁸⁾ aliisque descripta et a HALLERO rite definita³⁹⁾, sed ad casus, a PAULO

37) EDOUARD in *Bibliothèque universelle* 1818. Novembre p. 241.

38) Narrat (l. c.) de juvene qui postquam 42 dies sub undis jacuerat, resuscitatus fuit! /

39) „Eae historiae partim ab ignavis hominibus pro-

PAULO ZACCHIA ⁴⁰⁾, PIA ⁴¹⁾ caeterisque fide dignis ⁴²⁾, enarratas provocamus. Propria experientia, inter tentamina septem infructuosa, unum successu coronatum ⁴³⁾ exhibet; feliciores fuerunt

fectae sparguntur, partim ad aliam causam pertinent.“ Elem. Physiolog. T. VIII.

40) Quaest. Med. Legal. III. Consil. 79. (Narrat de juvene, qui *post horam submersionis* resuscitatus fuit; additque: „certum esse debet, non modo *hoc miraculum non esse*, neque inter illa eventa connumerandum, quae multam admirationem audientibus excitare consueverunt: quippe cum pateat, alios *permultos*, non post horas tantum, ut iste juvenis, imo etiam post triduum, cum in aquis, vel alia ratione suffocati essent, revixisse.“).

41) l. c. T. I. p. 14. Et *gazette de France* du 26. Juin 1772. (Post $\frac{3}{4}$ horae submersionis resuscitatus).

42) FOTHERGILL l. c. ex *annual Report* 1779. p. 76. (Casus Dr. FARGUHAR; restitutio post $\frac{1}{4}$ horae submersionis).

43) A. 1806. mense Julio Vilnae, centurio militum, VAN WIESEN Moscoviensis, juvenis tunc viginti annorum, hora quinta pomeridiana in flumine *Wilenska* ubi in valle *Poptowy* decurrit, balneum usurpavit. Effellit pes et miser ab undarum superficie evanuit. Rustici Rossici (*Burlaki*) cum ex opposito litore horrendum viderint spectaculum, sese in undas praecipitarunt juvenemque *post duodecimam horae partem* feliciter extraxerunt. Erant illi facies livida, cornea splendore destituta, spuma cruenta coram ore, sensuum et facultatum animi officium deletum, corpus frigidum, non tamen rigidum, pulsusque nullus. Solum respiratio stertorosa vitam manifestabat. Hac

fuerunt alii ⁴⁴⁾. Salva vita, aliorum morborum, inprimis cordis ⁴⁵⁾, periculum non semper aufugitur.

Cura. 8. Extracto cum necessariis cautelis ⁴⁶⁾, opportunisque instrumentis ⁴⁷⁾, homine submerso ex undis

sub rerum positione aeger ad urbem deportatus, mihi fortuito in via SUBOCZ (duo mille passus a loco infortunii) obviam venit. Ut in vicinam demum illico transferretur, jussi; ibique illum spatio horae ope caloris, frictionum, venae sectionis, et emetici restitui. Per triduum adhuc de debilitate et tussi conquerebatur. Die quarto non solum cubiculo sed et urbi, quin mihi vel verbuli ope gratias egisset, valedixit. Verum vix tempore bimensis evoluto, directio cursus publici mihi illius epistolam annexo annulo gemmato, pretii circiter mille rublorum, transmisit.

44) Spatio duorum annorum Hamburgi 152. homines ex undis salvati fuere. V. *Hamburger unpartheiischer Correspondent* 1822. die 16. Julii N. 113. art. *Hamburg*.

45) Cap. XII. §. XLVIII. N. 1. (100). Adde exemplum juvenis medici Vilmensis, qui balneum in flumine adhibendo submersus est. Cum tamen prope litora fuerit, magnumque lapidem ibi conspexerit, nisum illum attingendi fecit ac revera duobus sub undis factis gressibus ad metam pervenit. Ab illo autem tempore ingratum quid circa cor percipit, saepe congestiones sanguinis ad caput experitur, ac haud raro pulsum irregularem exhibet.

46) J. P. FRANK l. c. p. 205.

47) GÜNTHER l. c. — POPPE l. c. 1. B. p. 170, 199. 406. — BERNI l. c. Tab. I.

undis aut ex glacie ⁴⁸⁾, eoque a vestibus et limo cava oris et narium obsidente, si opus sit per ipsam tracheotomiam ⁴⁹⁾, liberato, pannisque siccis subcalidis involuto, indicationes respirationem et motum cordis restituendi vigent. Ut primae indicationi satisfaciamus, pulmones ante omnia ab aqua, quam continere possent ⁵⁰⁾, liberandi sunt. Ad hunc scopum assequendum submersi aut pedibus suspendebantur, aut in aperto utrimque dolio circum agebantur. Methodus hæc, duce experientia laudata ⁵¹⁾, culpâ hypothesium

48) GÜNTHER l. c. — POPPE l. c. — J. P. FRANK l. c. p. 206. — BERNT l. c. Tab. II. III. IV.

49) SCHRÖCK de methodo subveniendi submersis per Laryngotomiam. Rostock. 1714. — DETHARDING l. c. — *Merçure Suisse*, 1733. Décembre. — VOGEL in BALDINGER's *Neuem Magazine*. 3. B. 2. St. 4. B. 3. St. — *Gazette salulaire* 1776. N. 23.

50) N. 4.

51) AETIUS Tetrab. II. Serm. 4. Cap. 49. — FORESTUS Obs. Lib. VI. Obs. 33. p. 164. — VAN HELMONT de dement. idea §. 50. Opp. p. 228. — DETHARDING de morte p. 18. — *Merçure Suisse* 1734. Août p. 112. — GRÜLING Cent. II. Obs. 10. — *Avis pour donner à ceux que l'on croit noyés. Strasbourg* 1740. — Legitur ibi: „Il peut arriver, que le noyé ait trop bu; et pour savoir s'il est dans ce cas, et s'il y est, pour lui faire rendre l'eau, on le fait entrer dans un tonneau ouvert par les deux bouts qu'on roule pendant quelque temps en différens sens; cette pratique est même utile par rapport à d'autres vues.“ — FOTHERGILL (*Medical and Philosophical Works. Lond.* 1784. p. 116.) ait:

thesium reprobata ⁵²⁾, modificari potest. Sufficit enim corpori, aut saltem capiti, talem positionem declivem conciliare, ut aqua, si illa praesto esset, libere effluere possit ⁵³⁾. Nil porro pulmones magis a muco spumoso liberat, quam vomitus, ad quem per concussionem ciendum quoque volutio super dolium dicata videbatur. Leniore, haud timendo motu ⁵⁴⁾, ac redeuntibus vitae

„it appears necessary to recommend a trial if the body has been discharged of the water admitted into it, by placing it in a proper position, the head downwards, prone, and if it can be, across a barrel, Hogshed, or some such like convex support.“ — PLOUQUET l. c. — VOGEL *Anthropologische u. medicinische Erfahrungen.* — ERHARD *Theorie der Gesetze, die sich auf das körperliche Wohl der Bürger beziehen.* Tübing. 1800. p. 88.

52) SENAC *histoire de l'academie des sciences* 1725. p. 14. — *Kritische Jahrbücher der Staatsarzneykunde für das neunzehnte Jahrhundert, von KNAPE und HECKER.* 2. B. 1. Th. p. 337. 340. (ob apoplexiae timorem).

53) Sic quoque sentiunt J. P. FRANK l. c. p. 213. — KOPP *Jahrbücher der Staatsarzneykunde.* 2. Jahrgang. p. 414. qui ultimus provocat ad REIL's *Archiv für Physiologie.* 3. B. 2. Heft. p. 168. Nota ad LODER's *Journal für die Chirurgie.* 2. B. 4. St. p. 776.

54) FOTHEBELL (l. c. p. 76. 77.) de juvene submerso narrat, qui, dum ejus corpus quiete manebat, vitae signa manifesta dare cessabat, quae signa illico elevato atque concusso corpore redire solebant. — Apud CHARISIUM (l. c.) legitur de infanticida, mortis poena, per immersionem in flumen per 25 minuta

vitae signis, *tartaro emetico*, *sulphate zinci*, *vellicatione faucium*, eundem effectum tutius obtinere possumus. Interea, eo tempore quo *calor* aut *siccus* (ope lecti calefacti ⁵⁵), *radiatorum solarium* ⁵⁶), *arenae* aut *cinerum calidarum*, *lenibusque* *) *frictionibus* cum *pannis laneis*, *pectinibus setaceis*, *vinò* et *alcohol*) aut *humidus* (ope affusionis *aquae tepidae* ⁵⁷), aut *balnei tepidi* ⁵⁸)) *gradatim* extrinsecus admovetur — quo

protractam, mulctata; quae dum cadaveris instar ad theatrum anatomicum *vehetur*, ad se rediit.

55) „*Ich halte eine Bett- oder Wärm-Flasche für nöthiger, als manche andere zum Nothkasten anempfohlene Gegenstände.*“ J. P. FRANK l. c. p. 225. nota.

56) „*So wie man Fliegen, die ertränkt worden sind, blos von der Sonnenwärme wieder erregt werden sieht; so hat man auch von ertrunkenen Menschen die Erfahrung, daß die bloßen Sonnenstrahlen, welchen solche ausgesetzt wurden, dieselben zuweilen wieder hergestellt haben.*“ J. P. FRANK l. c. p. 223.

*) „*So lange inzwischen das Athemholen nicht hergestellt ist, muß der Scheintodte weder zu stark gerieben, noch allzuheftig gereizt werden, weil das in Bewegung gesetzte Blut, ohne vorherige Erweiterung der Lungen, keinen Weg finden, und sich nur mehr um das Herz ansammeln würde.*“ J. P. FRANK l. c. p. 227.

57) *Die Kunst ertrunkene Menschen wieder zu erwecken.* p. 40. 41.

58) STRUVE l. c. p. 104. — HAGEDORN Cent. III. Obs. 79. — KUNDMANN in Act. phys. med. nat. cur. Vol. VII. Obs. 24. — *Objecerunt immerito, balneum, ob aquarum pressionem, dilatationem thoracis impedire.*

quo nares *ammoniâ* supposita vellicantur ⁵⁹⁾ — quo mamma sinistra exsugitur ⁶⁰⁾, — quo epigastrium pane calido alcohol imbuto et intestinum rectum clysteribus ⁶¹⁾ ex aqua tepida, sale et aceto foveantur, — quo vis nervea *electricitate* ⁶²⁾ excitatur, — ac quo vasa sanguifera a pondere illa obruente *phlebotomiâ* ⁶³⁾ liberantur; —

v. *Catéchisme sur le morts apparentes, dites asphyxies.*
Par GARDANNE in *Journal de ROZIER.*

59) PORTAL l. c. p. 70.

60) „*Auch das Ausaugen der linken Brustwarze ist von Nutzen gefunden worden.*“ J. P. FRANK l. c. p. 225.

61) PORTAL (l. c. p. 29.) quidem timet clysteres posse intestina inflare, diaphragma sursum pellere, itaque pulmones comprimere, — ast experientia aliter docet.

62) HUFELAND Diss. de usu vis electricae in asphyxia. Goett. 1783. — URE *Wichtige Wiederbelebungsversuche erstickter Personen durch Galvanische Reizung.* v. HUFELAND's *Journal der pr. Heilkunde* 1819. Mai. p. 99. et *Bibliothèque universelle. T. X. 4e année.* 1819. p. 128. (Proposuit Dr. URE sectionem cutis ad marginem externum musculi sterno-cleido-mastoidei, circiter loco inter claviculam et angulum maxillae inferioris medio, ubi ad latūs externum carotidis, *par vagum* et *nervus sympathicus* inveniuntur, quibus nervis polus unus columnae galvanicae applicitur, altero sub septima costa cuti, prius solutione salis inadefactae, admoto). Cfr. WILSON PHILIP in *Philosoph. Transact. Z.* 1817. P. I. et HUFELAND's *Journal der pr. Heilkunde* 1819. Novembr. p. 67.

63) Reprobatur generalis venae sectionis usus in *Trans-*

tur; — eo ipso, inquam, tempore, *pulmonibus* sine mora *aër* introducitur. Simplicissima methodus id efficiendi est, si homo sanus proprium os illi asphyctici, in latus sinistrum locati, superimponendo, clausis huic naribus, repressaue leniter larynge ⁶⁴), halitum inflet ⁶⁵). Enim vero et hic credimus, talem aërem, ob id ipsum quod minus oxygenii continet, aegro asphyctico, utpote magnum stimulum respuenti, magisquam aër atmosphaericus purus et simplex gaz oxygenium ⁶⁶),

acco-

act. of the R. humane Society. Vol. 2. et a FOTHERGILL. Asphycticos vero submersos venae sectionis ope salvatos fuisse, praeter meam et aliorum experientia docet. Vide TENHAAF in *Harlemer Abhandlungen*, 6. Th. 2. St. p. 696. — Optime indicationes pro phlebotomia in asphyxia submersorum statuit HOLST (GÜNTHER l. c. p. 105. 106.). Contendit omnijure venam praesertim tunc tundendam esse, dum asphycticus symptomata pneumoniae exhibet.

64) VOGEL l. c. (ut aëri inflato via per oesophagum ad ventriculum occludatur).

65) BOHELLUS Cent. III. Obs. 38. p. 241. — W. TOSACK in *Edinburgh medical Essays. Vol. V. P. 2.* p. 605.

66) Ut asphycticis submersis gaz oxygenium infletur, VAN MARUM (l. c. p. 106.), HILL (*Beobachtungen u. Versuche über die Heilkräfte des Sauerstoffgas oder der Lebensluft* p. 21.), HOLST apud GÜNTHER (l. c. p. 100), ACKERMANN (l. c.) aliique suadent; ast hujus methodi difficultates NOEL et KOPP (*Jahrlücher u. s. w. 3. Jahrgang* p. 27.) abunde exposuerunt. Aliunde experimenta Cl. DAVY satis probant gaz oxy-

accommodatum esse⁶⁷⁾. Quodsi homo ad indicatum officium adimplendum desideraretur, posset aër, clausis naribus, ope *folliis*⁶⁸⁾ in pulmones introduci, ac, compresso thorace, vicissim exprimi. Peculiare instrumentum ad aërem non solum in pulmones introducendum sed simul ex iis extrahendum excogitavit GOODWYN⁶⁹⁾. Eodem circiter scopo dicarunt: duplicem follem — GORCY⁷⁰⁾; syringem — VAN MARUM⁷¹⁾, quam PLOUCQUET emendavit⁷²⁾; instrumentum aquam et mucum e pulmonibus eliminans aëremque intro-

genium purum minus ad respirationem idoneum esse, quam illius cum gaz azotico connubium.

67) Legi de his meretur FOTHERGILL l. c. p. 118.

68) *Neue Untersuchungen über die Hemmung der Lebenskraft* p. 113. — (Introducitur *utris*, folli annexus, aut per nares, aut per os, uno vel altero istiusmodi officiorum clauso. Tentamina illum per *rimam glottidis* introducendi hucusque vana fuisse, nam *utris* semper in oesophagum intrare solet. v. KOPF l. c. p. 26.).

69) l. c. (Instrumentum hoc aërem non satis renovat, ac nimiam illius copiam in pulmones introducit).

70) GREY'S *Journal der Physik*. 2. B. p. 3. 199. — HUFELAND *Neueste Annalen der französ. Arznei- und Wundarzneykunde*. 1. B. p. 359. — KOPF l. c. p. 46. (Caro pretio hoc instrumentum venit, facile pessum datur, nec valet illud ad aquam et mucum e pulmonibus extrahendum).

71) l. c. (De difficili administratione hujus instrumenti legatur KOPF l. c. p. 18.).

72) l. c. (Addito tubo ex resina elastica. v. KOPF l. c. p. 415.).

introducens — MEUNIER ⁷³⁾ et CONFIGLIACHI ⁷⁴⁾,
atque antliam sugentem comprimementque —
KOPF ⁷⁵⁾.

§. CII.

E x s u s p e n s i o n e .

1. *Asphyxiam laqueo suspensorum* homi- Literatu-
num peculiari examini subjecerunt HALLER ⁷⁷⁾, ^{ra.}
LOUIS ⁷⁸⁾, STOLTE ⁷⁹⁾, HIELCKE ⁸⁰⁾, SCHALL-
GRUBER ⁸¹⁾ et ESQUIROL *).

2. Hac in asphyxia obveniunt: facultatum Sympto-
animi subita abolitio ⁸²⁾, oculi semi- aperti et ^{mata.}
prominentes, facies livida, lingua inter dentes
locata,

73) KOPF l. c. 2. Jahrgang. p. 295 — 309.

74) *Doppio soffietto o mantice respiratorio per soccorrere gli asfitici.* Pavia 1816.

75) l. c. 3. Jahrgang. p. 19. 199. Cfr. RUDTOFFER l. c.

77) Elem. Physiologiae. T. III. Lib. VIII. Sect. 4. p. 271.

78) *Mémoire sur une question anatomique relative à la jurisprudence, dans lequel on établit les principes pour distinguer à l'inspection d'un corps, trouvé pendu, les signes du suicide de ceux de l'assassinat.* Paris 1763.

79) *De morte suspensorum aliisque huc spectantibus.* Lugd. Bat. 1766.

80) *De suspensorum in vitam restitutorum morte subitanea ejusque causa.* Jen. 1799.

81) *Ein Wort über Henken.* v. Salzburger med. chirurg. Zeitung 1814. N. 39. p. 217.

*) *Archives générales de médecine.* 1823. Janvier.

82) HUFELAND *Kunst das menschliche Leben zu verlängern.* 2. Th.

locata, interdum propensa, collum tumidum, serotum maculis coeruleis et rubris notatum, evacuationesque involuntariae seminis, urinae et foecum.

Autopsiae
cadaverum.

3. *Sectis cadaveribus*, luxatio vertebrarum colli, ut vulgus expectat, *non* invenitur⁸³⁾, sed inveniuntur vasa sanguinea cerebri turgida; trachea sero flavescente repleta, pulmones lividi; vena cava et auricula cordis dextri sanguine turgidae, ventriculus annexus dilatatus, cordis vero ventriculus sinister angustus⁸⁴⁾, hepar coeruleum, vesica urinaria extensa et vesiculae seminales spermate repletae.

Causa
proxima.

4. Quibus phaenomenis rite perpensis patet, homines laqueo suspensos asphycticos reddi aut mori, non ob laesionem vertebrarum, non ob apoplexiam (nam nullum detegitur in encephalo extravasatum nullaque adsunt paralyseos vestigia), sed ob interceptum respirationis officium. Tali pacto (praeter laesiones corporis) pereunt quoque homines sub montium et domuum ruinis, sub arenae acervis etc.

Prognosis. 5. Ac re quidem vera, qui mortem aufugerunt, quod interdum tarde⁸⁵⁾ et etiamsi spuma

OS

83) HALLER. SCHALLGRUBER l. c. Neque semper sugillatio circa collum animadvertitur. (HAEN, ESQUIROL).

84) SCHALLGRUBER l. c.

85) Post novem horas v. *Mémoires de la société d'Amsterdam* l. c. — Post novendecim minuta v. *Berliner*

os cooperiret ⁸⁶⁾, contingit, non aliter quam homines in aquis submersi curati fuere ⁸⁷⁾.

6. Sufficiat hinc quoad *curam* meminisse, **Cura.** quod si, aut constrictio faucium a laqueo relicta, aut linguae propensio, vel introductioni aëris in pulmones, et administrationi pharmacorum obstarent, ad tracheotomiam ⁸⁸⁾, et ad injectionem pharmacorum per anum deveniendum foret.

§. CIII.

Ex corporibus extraneis in trachea et oesophago.

1. *Corpora peregrina tracheae illapsa*, aut, **Notio.** ita in oesophago haerentia, ut asperam arteriam comprimant, haud raro summis angustiiis et interdum asphyxiae ansam porrigunt.

2. Aeger enim cum magno labore, sibilo **Symptomata.** et stertore respirat. Vigente tussi, eaque brevi et intersecta, sputa copiosa, spumosa, cruore mixta, rejiciuntur. Maxime vero miser a pectoris

Samml. 10. B. p. 242. — Post horam v. HUFELAND'S Journal der pr. Heilk. 12. B. 3. St. p. 183.

86) HIPPOCRATES (Aphor. II. 4.) contrarium edixit, ast HAEN (Rat. med. l. c.), praevio jam GALENO, summi viri errorem correxit.

87) *Etwas Neues vom Tode. Nürnberg 1655. — Mémoires de la société d'Amsterdam en faveur des noyés. V. Partie p. 132. — JANIN réflexions sur les causes de la mort subite et violente. p. 66. — FOTHERGILL l. c. p. 66. 69. 75.*

88) FOTHERGILL l. c.

Frank Prax. II. 2. 2.

K k

ris oppressione et doloribus acutis angitur; vixque verba proferre potest. Pulsus fit intermittens extremitatesque frigidae. Quandoque emphysema ingruit ⁸⁹⁾, indicamus de generalibus suffocationis symptomatibus.

Causae. 3. Corpora in *tracheam* illabi solita, enumerata sunt ⁹⁰⁾. De corporibus *oesophago* infensis, alibi quaestio erit ⁹¹⁾. Palam ibi fiet, remoram, cui haec corpora in canali isto subijciuntur, longe saepius ex oesophagi morbosae constitutione, quam ex figura et magnitudine corporum extraneorum derivanda esse.

Prognosis. 4. Nisi corpus extraneum ope tussis aut vomitus sponte rejiciatur, vel aegrotum suffocet; potest id vel in sinibus mucosis laryngis locum invenire ⁹²⁾, vel ex trachea in pulmones descendere ⁹³⁾.

Cura. 5. Si corpora, in *asperam arteriam* illapsa, fuerint *fluida* (e. c. vinum, crematum, acetum, aqua etc.), juvant 1° deglutitio frustuli panis haud plane masticati, quo scilicet liquidum circa orificium laryngis haerens absorberi posset ⁹⁴⁾; 2° in

⁸⁹⁾ BERNT l. c. p. 129. (In regione clavicularum).

⁹⁰⁾ P. II. Vol. II. Sect. I. Cap. III. §. XII. 6. (33).

⁹¹⁾ P. III. Vol. I. De morbis oesophagi.

⁹²⁾ Cujus rei in diagnosi phthiseos laryngeae memoresse juvabit.

⁹³⁾ P. II. Vol. II. Sect. I. Cap. IX. §. XL. 13. Cap. X. §. LI. 3. (2—14).

⁹⁴⁾ BERNT l. c. p. 130.

2° inhalatio vaporum ex aqua fervida emergentium; 3° concussio vehemens dorsi et 4° errhina et emetica. Quodsi corpora tracheae illapsa *solida* quidem sed adeo parva fuerint, ut illorum rejectio per rimam glottidis expectari possit (e. c. grumum panis, foliolum lactucae etc.) debet tunc aeger, nisi tussis jam nimis urgeat, illam, inclinato antrorsum trunco, vi excitare, ac gargarisma ex aqua tepida reiteratis vicibus in usum ducere. Corpore vero adeo duro et magno in tracheam illapso ut illius rejectio per rimam glottidis fieri nequeat, tussim vel sternutationem excitare non solum non juvat, sed potius, ob periculum obturationis orificii laryngis, nocet. Quamobrem citissime ad *tracheotomiam* confugiendum⁹⁵).

§. CIV.

E x v a r i i s g a z.

1. Cum atmosphaera duntaxat pro respira- Notio.
tione sustinenda idonea evadat, quatenus debitam inter gaz oxygenium et gaz azoticum rationem agnoscit; sequitur, quod rerum positiones omnes, quae illam rationem perturbant aut de-

K k 2 lent,

95) Cfr. P. II. Vol. II. Sect. I. Cap. III. §. XII. 6. (33).

Cfr. ECKHOLD *über das Ausziehen fremder Körper aus dem Speisekanal und der Luftröhre.* Leipzig 1809. —

POPPE *Noth- und Hülfsexikon.* 1. B. p. 152. — MEMM animadversiones quaedam chirurgicae, experimentis in animalibus factis illustratae. Giessae 1810.

lent, respirationem labefactare aut suspendere variisque animi deliquiorum gradibus ansam porrigere debent, quin ideo dici possit, atmosphaeram revera principium veneficum continere. Deletur autem debita inter gaz oxygenium et gaz azoticum ratio, a rebus quae gaz-oxygenium in aliam speciem gaz commutant.

Gaz ac-
idum car-
bonicum.

2. Huc spectant loca occlusa, in quibus plurimi homines respirant, aut candelae multae ardent, e. c. ecclesiae, scholae, theatra, — cellae, ubi mustum, cerevisia, aut alia vegetabilia fermentant ⁹⁶⁾; — antra, uti sic dicta *grotta del cane* prope Neapolin, aliaque subterranea ⁹⁷⁾ et quodammodo fodinae carbonum ⁹⁸⁾. Prout istis in locis atmosphaera vel partim vel omnino gaz oxygenio spoliata est, homo, aut solum in lipothymiam aut in ipsam asphyxiam incidit. Cura illi submersorum similis est ⁹⁹⁾. Juvat praeterea pulpam ex *calce viva* paratam, in loca, ob acido carbonico contaminata, introducere.

Gaz hydro-
genium.

3. Putei aliaque loca subterranea, haud raro *gaz hydrogenium*, saepe formidabiles excitans explosio-

⁹⁶⁾ J. P. FRANK l. c. p. 130.

⁹⁷⁾ Idem, ibique p. 136.

⁹⁸⁾ Talis atmosphaera in fodinis vulgo nuncupatur: *Schwaden, Böse Wetter*. v. POPPE l. c. §. 77. p. 126.

⁹⁹⁾ §. CI. N. 8.

plosiones ¹⁰⁰⁾, continent. Hoc gaz, dummodo rebus alienis non mixtum, etiam qualitate venefica destituitur: mixtum enim, aut cum multo aëre atmosphaerico, aut cum gaz oxygenio, ut pluries experti sumus, pro tempore saltem, sine omni detrimento respirari potest. Quodsi igitur ex *puro* gaz hydrogenio asphyxia ortum duceret, illa asphyxiae ex submersione in aquis aequiparanda foret, et ut talis curanda.

4. Longe vero aliter de *gaz hydrogenio*, *Gaz hydro-*
carboni, *sulphuri*, *phosphoro*, *ammoniae*, *nupto*, *ni-um car-*
 fodinarum carbonum, paludum, aquarum putre- *boni, sul-*
 scentium, sepulcrorum, latrinarumque progenie, *phuri,*
 sentiendum est. Principia enim venefica, quae *phospho-*
 tale gaz hydrogenium continet, prout in minori *ro, ammo-*
 aut majori gradu praesto sunt, aut nauseam, *niae, nu-*
 vomituritionem, motus convulsivos variarum *ptum.*
 corporis partium, imprimis musculorum pectoris
 et maxillae, frigus universae cutis, respiratio-
 nem irregularem, pulsumque oppressum; — aut
 livorem labiorum, spumam cruentam ante os,
 pupillam dilatatam, immobilem, motus cordis
 irregulares, respirationem laboriosam, opistho-
 tonum, vagitus horrendos, et tandem asphy-
 xiam et mortem excitant. Cura uti in asphyxia

ex

100) Neminem latet quantum debetur Cl. DAVY, inven-
 tori scilicet lampadis securitatis (*lampe de surete*) cu-
 jus ope explosionibus in fodinis aliisque locis subter-
 raneis occurritur, millenorumque sic vita salvatur.

ex vapore carbonum. Ammoniae, lintea aceto madefacta, circa os applicita opponuntur. Plus vero quam cura, valet *prophylaxis* *).

CAPUT XXIV.

De animi deliquiis cardiacis.

§. CV.

Ex impedito in recens natis sanguinis circuitu.

Notio. 1. **C**ircuitus sanguinis in recens natis non solum propter laesam functionem systematis nervosi et cohibitum opus respirationis, secundario impeditur modo; sed quoque *primaria ratione*, obstaculis videlicet in corde et vasis majoribus sese sanguinis circuitui opponentibus.

Vitia con-
formatio-
nis.

2. Primum inter illa obstacula locum occupant *vitia congenita cordis et arteriarum*, quod praecipue a *morbo caeruleo congenito* ¹⁾ confirmatur.

Inertia
cordis.

3. Communissimum quoque circuitus sanguinis in recens natis obstaculum est *inertia cordis*.

Sicuti

*) FRANKENAU *öffentliche Gesundheits-Polizey. Kopenh.* 1804. p. 176. — *Die beweglichen und nicht stinkenden Abtrittsgruben der Herren CAZENEUVE und Comp.* Wien 1819.

1) Cap. VI.

Sicuti enim musculi quot quot sunt, ut ad proprium officium rite absolvendum idonei evadant, determinato quodam energiae gradu indigent, ita et cor. Ea deficiente nil mirum si illius contractiones locum obtinere nequeant. Deficit vero necessaria cordis energia ob sequentes causas: 1° ob foetus ex utero ante debitum tempus exclusionem; 2° ob morbos, matris praesertim, convulsivos²⁾, illiusque mortem, quibus fit ut foetus maturescens alimenti copia necessaria destituatur; 3° ob haemorrhagias uteri, potissimum illis, quae oriuntur aut ex usu remediorum ad abortum excitandum exhibitorum, aut dum placenta praevia fuerat, aut dum in partu gemellorum, primum uterque infans eadem utebatur placenta, ac deinceps emissio in lucem altero, pars funiculi non deligata existit, alter autem foetus adhuc in utero manet; 4° ob lacerationem funiculi umbilicalis, et 5° ob nimiam ipsius sanguinis copiam, quae causae motricis vires superat. Quo ultimo in casu foetus exhibet adspectum robustum, faciem rubram, oculos prominentes cutimque lividam, cum in aliis praecedentibus casibus is potius praese ferat indicia debilitatis, videlicet faciem et universam cutim pallidam,

margi-

2) DE LA MOTTE *Traité des accouchemens. A la Haye* 1726. *Livr. 3. Chap. 12. Obs. 217 — 228.* — LOSCHGEUS *diss. de medicina obstetricia agente et expectante.* Erlang. 1780. p. 31.

margines labiorum lividos, anum a meconio conspurcatum, extremitates maxillamque inferiorem pendulos. Ad quam debilitatem profligandam, requiritur: ut nexus inter foetum et matrem *non* illico per ligaturam funiculi tollatur, ut illius corpusculum linteis siccis et calidis foveatur, ut pectus, regio epigastrica, columna vertebralis, palmae manuum plantaeque pedum ope vini calidi vel spiritus cujusdam aromatici laventur, utque nares admoto spiritu cornu cervi stimulentur. Quae methodus nisi omnino succedat, foetus dein a matre separandus, ac extra conspectum illius, *aquâ frigidâ* ad faciem, regionem epigastricam adspargendus, atque illico linteis calidis abstergendus; dein *balneo tepido* ex partibus tribus aquae unaque vini committendus, non neglectis *inflatione aëris* et *clysteribus* ex infuso florum chamomillae, cujus cochlearculum unum alterumve quoque per os ingeri potest. Quodsi vero foetus plethorae exhiberet supra allatas notas, secto funiculo umbilicali, ut ab uncia semis ad unciam unam sanguinis effluat, concedendum.

Impedi-
menta cir-
cuitus san-
guinis.

4. Alias quidem cor officium suum praestat, ast sanguinis circuitus in locis dissitis obstacula experitur. Sic contingit: 1° sub partu protracto praesente fortiore uteri contractione; 2° sub partu praecipiti, propter vehementes continuasque uteri contractiones, quae scilicet nexum inter matrem
et

et foetum facile praescindunt³⁾; 3^o sub compressione chordae umbilicalis, dum illa aut una cum capite in pelvim deprimitur, aut corpus circumcingit, quo in casu compressio sub diverso et multiplici versionis modo, inprimis vero sub segni capitis evolutione, efficitur.

§. CVI.

Ex morbis cordis, vasorum et haemorrhagiis.

1. Quacunque in aetate animi deliquia ex Morbi
cordis. morbis quibusdam cordis ortum trahere queunt. Sic *lipothymiae* obveniunt in morbo *caeruleo*⁴⁾, *pericarditide*⁵⁾, *symphysis cardiaca*⁶⁾, et *syncope* in *hydropericardia*⁷⁾, *polypo cordis*⁸⁾, *angore pectoris*⁹⁾, inque *cordis volumine et capacitae auctis et imminutis*¹⁰⁾.

2. Mentio quoque injecta est de animi de- Vasa. liquiis in tractatibus de aortae *inflammatione*¹¹⁾ et *aneurysmate*¹²⁾.

3. Nec

3) BAUDELOCQUE *Entbindungskunst. Uebersetzt von MECKEL. Leipzig 1782. T. I. p. 184.*

4) Cap. VI. §. XVIII. N. 1.

5) Cap. VII. §. XXIII. N. 1. (55).

6) Cap. VIII. §. XXIX. N. 2. (61).

7) Cap. IX. §. XXX. N. 1. (50).

8) Cap. X. §. XXXVII. N. 1. (17).

9) Cap. XI. §. XLII. N. 3.

10) Cap. XII. §. XLVI. N. 3.

11) Cap. XIV. §. LV. N. 2.

12) Cap. XVI. §. LXII. N. 3.

Haemor-
rhagiae.

3. Nec silentio praeterivimus animi deliquia in tractatu de *haemorrhagiis* ¹³⁾. Possent quoque animi deliquia ex inanitione ¹⁴⁾, ad *cardiaca* revocari.

ADDEN.

13) Cap. XX. §. LXXXV. N. 2.

14) Cap. XXII. §. XCV. N. 3.

A D D E N D A.

Quum elaboratio sectionum partis secundae volumen secundum constituentium in epocham inciderit, in qua commercium meum literarium ob migrationem e Russia in Germaniam interruptum erat, quumque illarum sectionum exscriptio per typos moram passa sit, observationum plurimarum in operibus recentissimis contentarum mentionem injicere haud potui. Sequentia supplemento erunt.

AD PARTIS SECUNDAE, VOLUMEN SECUNDUM,
SECTIONEM PRIMAM.

- p. 5 (4). SCHWARZ *völlige Durchschneidung der Aspera Arteria, und vollkommen gelungene Heilung derselben* (HUFELAND's Journ. 1822. Novemb.).
- p. 8 (25). ZITTERLAND *merkwürdiger Fall vom Schreien eines Kindes im Mutterleib* (HUFELAND l. c. 1823. Febr.).
- p. 39 (21). De *aphonia* ex *csu* cancerorum v. UNZER's *Handbuch* p. 566.
- p. 42. N. 12. *Aphonia* symptoma *lienitidis* fuisse contendit RONANDER (HUFELAND l. c. 1824. April). Exemplum *aphoniae*, expulso corpore quodam ex *utero*, sanatae, narrat LIQUIÈRE (*Journ. complémentaire du dict. des sciences médic. T. XIII. Cah. 52. p. 320.*).
- p. 86. N. 3. De *croup* quoque scripserunt TOURTUAL (HUFELAND l. c. 1821. August). SUCCOW Progr. animadversiones in *tracheitidem* infantum. Jen. 1822., A. GRINAUD *nature et anatomie pathologique du croup* (*Journ. complém. T. XI. Cah. 43. p. 234.*); LISFRANC sur l'*angine trachéale oedémateuse* (*Nouv. bibliothèque médicale* 1823. Août.); O. SEILER *Bemerkungen über den*

- d. Croup mit Zusätzen v. MEYER (*Rheinische Jahrbücher f. Medicin u. Chirurgie.* v. HARLESS 7. B. 1. St. p. 98.); N. A. URSIN diss. de angina polyposa. Aboae 1822.; BLAUD *nouvelles recherches sur la laryngo-trachéitis connue sous le nom de croup.* Paris 1823.
- p. 104 (64). LISFRANC (l. c.) asserit cerni posse oedema glottidis depressâ linguâ.
- p. 111 (26). GRIMAUD (l. c.) contendit ventriculi membranam mucosam inflammata fuisse.
- p. 111 (28). Testatur quoque GRIMAUD de inflammatione encephali.
- p. 117 (52). LACROIX (l. c.) observavit puellas magis quam pueros croup laborasse.
- p. 139 (33). Ad laryngem et tracheam sibi viam pararunt silex (*Medical and chirurgic. transact. published by the medic. and chirurg. society of London. Vol. XII. P. I. 1822.*): glandis querci dimidium (FELLER in RUST's *Magazin f. die gesammte Heilkunde.* 15. B. 3. Heft.); pomi pars cum semine (KLAATSCH ibid. 16. B. 3. H.); cucurbitae citrullae semen (G. JAMESON in the *american medical recorder. New-York 1822. Vol. 5. p. 16.*).
- p. 144 (40). BLAUD (l. c.) prout croup aut mucum, aut materiam puriformem, aut membranas largitur; morbum illum denominat *laryngo-trachéite myxagène, pyogène, meningogène.*
- p. 147 (53). LACROIX spatio sex mensium inter 36 aegrotos, 17 mortuos numeravit.
- p. 149 (57). Inter 17 mortuos LACROIX, 10 erant puellae.
- p. 150 (58). Etiam SEILER (l. c.) existimat croup laryngeum periculosiorem esse quam croup trachealem.
- p. 164 (44). Brevi ante abitum ex Vilna, duo adhuc croup ferocissimi in infantibus trium quatuorve annorum, ope venaesctionum aliorumque antiphlogisticorum, sine mercurio sineque aliis celebratis specificis sanati
- exeni-

exempla habui, ac quotidie magis magisque mihi persuasum habeo, morbo illo eandem plane medendi rationem accommodandam esse, quae aliis inflammationibus quadrat.

- p. 169 (59). LISFRANC asserit oedema glottidis, depressâ linguâ, ope *scarificationum* debellari posse.
- p. 172 (68). Balnea tepida suadet SEILER, reprobât MEIER (l. c.).
- p. 172 (71). Clysteres cum aceto commendat SEILER, rejicit MEIER.
- p. 182 (10). TOURTUAL, praemissis hirudinibus, suadet *cataplasma emolliens* circa collum. Vidi angustias respirationis inde auctas.
- p. 182. Dum periculum suffocationis urget, RECAMIER in cavitates oris et narium, uno eodemque tempore, *injectiones* cum aqua tepida et lacte instituit, scopo motus salutare musculorum faucium et laryngis excitandi, asseritque pseudomembranas tali modo expelli (FRORIEP *Notizen aus d. Gebiete der Natur- u. Heilkunde*. 5. B. N. 5. p. 80.). Verum, quid si pseudomembranae arcte lateribus laryngis seu tracheae adhaerent?
- p. 191 (56). Tracheotomiam in contusione laryngis cum successu adhibuit ROBERT LISTON (FRORIEP l. c. 5. B. N. 21. p. 327.). Asserit eandem operationem et in oedemate glottidis conduxisse; ast de illius morbi praesentia allato in casu vehementer dubito.
- p. 197. *Litteraturae phthiseos laryngeae et trachealis adde:* CHARLES BELL *Surgical observations being a quarterly Report of cases in surgery. Part. I. Lond. 1816.* (Cfr. *Rheinische Jahrb.* 2. B. 2. H. p. 57.); SACHSE *Beitrag zur genauen Kenntniss u. Unterscheidung d. Kehlkopf- u. Luftröhren-Schwindsucht. Hannov. 1821.*
- p. 201 (39). C. BELL l. c.

- p. 214 (22). SACHSE (l. c.) distinctionem phthiseos laryngeae et trachealis nimis extollit.
- p. 215. N. 5. Experientia circa *ulcera laryngis syphilitica* capta, reliquis phthiseos laryngeae speciebus vix quadrat: quamobrem jam supra (p. 354.) monui, Cl. SACHSE descriptionem hujus morbi generalem ab illis ulceribus desumendo, illius minus veram exhibuisse imaginem. — *De ulceribus vero syphiliticis laryngis et tracheae* meliora non invenies quam C. II. HAWKINS scripsit (*London medical and phys. Journal* et FRORIEP l. c. 5. B. p. 345.). Vir cl. primum scriptores de morbis syphiliticis, quatenus ulceribus laryngis venereis debitam non dederant attentionem, vituperat. Porro ipse curriculum hujusmodi ulcerum, in tonsillis ortum trahentium, dein ad laryngem proserpentium, et tandem ad tracheam et ad bronchia descendentium graphice describit.
- p. 216. Articulus de *prognosi* phthiseos laryngeae et trachealis terminandus est cum observatione BOEHRI (HUFELAND l. c. 1824. Jan.), qua probatur: *abscessum laryngis posse sibi viam ad partes exteriores parare*. Nec silentio praetereunda est observatio GOLDENI (quam Cl. BELL l. c. narrat), *ulceris laryngis ad radicem epiglottidis cum carotide interna communicantis*. Alias ulcera fistulosa pectoris cum trachea communicasse sunt visa (*Magazin d. ausländischen Literatur d. gesamt. Heilk. u. Arbeiten des ärztlichen Vereins in Hamburg. V. GERSON u. JULIUS. 6. B. p. 503.*). De relicta *fistula tracheae* post vulnus casum pulcherrimum narrat BIENVENU (*Journal universel des sciences médicales* 1824. Janv. p. 103.): „à la région antérieure du col de cet homme, au dessous du cartilage thyroïde, on voyoit une ouverture transversale, ressemblante assés bien à une bouche; les bords en étoient parfaitement

faitement cicatrisés et vermeils et pouvoient très bien être pris pour des lèvres.“ Aeger nisi fistulam clauderet, nec deglutire, nec loqui, nec cantare, potuerat. Caeterum facilius spiritum per foramen morbosum quam per os et nares trahebat.

p. 217. In cura phthiseos laryngeae et trachealis tradenda quomodo *tracheotomiam* silentio praeterire potueram, eo minus intelligo, cum ipse hanc operationem eodem in morbo jam dudum in usum duxerim, quod videre est ex actis meis clinicis Vilmensibus a. II. p. 64. Interea ars per silentium meum defraudata non est, cum et Cl. BELL *tracheotomiam* in phthisi laryngea incassum adhibuerit. Posset illa dumtaxat eo in casu locum habere, ubi aegro necdum omnino tabifico, *abscessus* laryngis seu tracheae imminens suffocationis periculum minaretur. Praeterea si *exulceratio ad ipsam epiglottidem* circumscripta foret, exemplum vix laudati viri sequi posset, videlicet, depressâ prius radice linguae, epiglottidem ope *solutionis lapidis infernalis* (grana viginti ad aquae unciam semis) quotidie, ope penicilli ex linteis carptis annulo catheteris alligati, tangendi. Forte *solutio lapidis divini*, quae exulcerationes tarsorum mirifice exsiccât, anteponenda foret?—HAWKINS ulcera syphilitica laryngis, praeterito stadio inflammatorio, cum *subfumigiis* e cinnabare (a drachma semis ad drachmam quotidie) aggreditur, non neglectis intus sarsaparilla, cortice et ammonia. Alii suadent *vapores ex infuso saturato conii maculati*, aut ex *acido nitrico* aqua diluto, a quibus tamen nimiam timerem irritationem. Medici, *aure* apici linguae illinendo faventes, verisimiliter illud in morbo, de quo agitur, laud negligent, quod eo minus suaderem, quo magis febris hectica urgeret.

p. 222 (37). F. O. H. HÜPEDEN diss. sistens animadversiones

siones de affectionibus inflammatoriis glandulae thyreoideae. Heidelb. 1823. — J. G. H. CONRADI Commentatio de cynanche thyreoidea et struma inflammatoria. Goett. 1824.

- p. 224 (42). *Thyreoitis* interdum cum *cynanche tonsillari* societatem init (THILENIUS *Med. chir. Bemerk. 1. Th.* p. 45.). Alias ille morbus *strumae* supervenit, rite monente J. CARRON (*De l'inflammation du broncho-cèle. V. Journ. général de méd. chir. et pharm. rédigé par SÉDILLOT. T. XLIX. p. 21.*).
- p. 224 (44). *Abscessus magnus corporis thyreoidei* describitur ab J. F. MECKEL in *Abhandlungen aus d. menschl. u. vergleichenden Anatomie u. Physiologie. Halle 1806. p. 142.*
- p. 225. N. 3. *Indicata venae sectio*, consilio WALTHERI (l. c.) *e vena jugulari* institui potest.
- p. 229 (93). Idem auctor nuperrime scripsit: *Reflexions pratiques sur le moyens propres à guerir le goître et sur leur manière d'agir. (Journ. complément. T. XVII. Cah. 65. p. 42.)*.
- p. 230 (41). De *struma Americae septentrionalis* lege RICHARDSON in FRANKLIN *Journey to the shores of the Polar sea. (FRORIEP l. c. 4. B. N. 22. p. 348.)*.
- p. 259 (57). Auctoribus *jodii* laudes canentibus adscribendi sunt: J. SCHNEIDER (*Das Wissenswürdigste über die Jodine, als Specificum gegen den Kropf; nebst einigen Erfahrungen über dieses neue Mittel, und Bemerkungen zur Pathologie und Aetiologie des Kropfes; mit einem Anhang v. HARLESS. v. Rheinische Jahrbücher. 5. B. 1. St. p. 105. 2. St. p. 1.*) et GIMELLE (*Bulletin de la société médicale d'émulation 1821. et Hamburger Magazin 1821. Novembr. Decembr.*). Abs-
terrent contra observationes, quae de vi venefica *jodinae* dubium non relinquunt quaeque a CARMINATI
(Gior-

(*Giornale di Fisica di CONFIGLIACCHI e BRUGNATELLI* 1821. Novembr. et *Hamburger Magazin* 1822. Jul. August. p. 108.) a M. C. ZINK (*Observations pratiques sur l'usage abusif de la teinture d'iode à l'intérieur in Journ. complém. T. XVIII. Cah. 70. p. 126.*) et a SCHMIDT (HUFELAND l. c. 1824. Febr. p. 124.) publici juris redditae sunt. Illis observationibus notitias privatas ejusdem generis addere possem. Ipse, quippe novis remediis in genere parum favens, jodinam bis tantum in struma lymphatica adhibui, idque sine successu sineque damno. Unus aegrorum qui jodinam incassum adhibuerat, serius ope spongiae et pilae marinae fere ad sanitatem perductus fuit. Caeterum quam facile sit in remediorum effectibus dijudicandis errare, sequens quoque casus docet. Verno a. 1822 femina illustris, strumâ enormi detenta, Vilnae consilium meum petiit. En, cogitavi, occasio virtutem jodinae explorandi! Cum vero simul audiverim aegram quarto mense gravidam esse, ut nunc ab omni strumam sanandi tentamine abstineret, suasi; quod consilium ipsa sancte secuta est. Elapsis tribus circiter mensibus ad illam derepente a terribili vomitu cruento prehensam, vocor. Quodsi prius jodinam praescripsissem, nonne culpa omnis in illam coniecta fuisset? — Quod vero spectat ad jodinae usum externum, FODÉRÉ (l. c.) testatur cutim ab illo flavedinem contrahere. Suadet ille potius sequens unguentum. R. Carbonatis ammoniae, camphorae ââ drachmas duas. Olei olivarum uncias quatuor. M. D. S. mane et vespere cochleare cofeanum ad instituendam unctionem. Usui interno commendat *trochiscos contra strumas dispensatorii SPIELMANNI*. COSTER (*Nouv. biblioth. med.* 1823. Octobr. p. 200.) strumam *Galvanismo* aggreditur, cuti lateris unius tumoris cum jodina illinita, et parti oppositae polo positivo columnae Voltaicae applicito.

- p. 259 (58). Non favet setaceo J. KENNEDY (*The London medical Repository* 1822. N. 99.).
- p. 261 (61). De struma aneurysmatica feliciter a GRAEFFE extirpatâ, lege HEDENII tractatum de glandula thyreoïdea tam sana quam morbosa. Lips. 1822. — Extirpationem corporis thyreoïdei in India (ubi struma in montibus *Himalaja* communissima est) usitatam esse, elucet ex J. BAILLIE FRASER *Journal of a tour through part of the snowy Range of the Himalaja mountains.* London 1820.
- p. 262 (63). JAMESON quoque ligaturam arteriae thyreoïdeae superioris cum successu perfecit (*American med. Record.* 1822. Jan.).
- p. 275 (55). *Sterni fissi* congeniti exemplum narrat CUL-
LERIER (*Journ. de med.* N. 292. et *Hamb. Magaz.* 3. B.
p. 462).
- p. 284. *Litteraturae morborum pulmonis* adde: C. J. LO-
RINSEER *die Lehre von den Lungenkrankheiten.* Berlin
1823.
- p. 316 (12). De peripneumoniis post membrorum ampu-
tationes aliasque operationes chirurgicas, lege: CHAR-
LES BELL op. c. (*Rheinische Jahrbücher.* 6. B. 1. St.
p. 126.) et AVISART *Observations suivies de reflexions*
sur l'inflammation sympathique suite de l'amputation
(*Bulletin de la soc. med. d'Emulat.* 1824).
- p. 356. *Epidemiam peripneumoniae typhoideae* descripsi
quoque JOHN LUCAS (*The american med. Record*
Vol. V.).
- p. 395 (8. 9). PESCHIER (*Bibliothèque universelle. Paris.*
1822. Juin) tartarum emeticum in peripneumoniis
proponendo, nil sane novi dixit: novum autem esse
pharmaci illius usum ad omnes peripneumoniarum
species, venaesectionum loco, extendere velle. De
ploranda est sors imitatorum consilii tam insani! Eff
fectus

fectus illius describuntur in RUST's Magazin. 16. B. 3. St. p. 429.

p. 488. N. 2. *Literaturae phthiſeos pulmonalis adde*: ABERCROMBIE *outline of an inquiry on the pathologie of consumptive diseases* (The Edinburgh medical and surgical Journ. 1822. Jan.). WEBER *Grundsätze der Consumtions-Krankheiten des Lungenorganes, der Lungenſchwindsucht und ihrer Behandlung*. Giesen 1823.

p. 551. Et *Aegypti clima phthiſi laborantibus commendatur* a RICHARDSON — (*Travels in Egypt and Palæstina. Vol. I. p. 392.*).

p. 602 (3). De phthiſi pulmonali ex frustulo ossis incongrue deglutiti ac tandem rejecti lege ACHARD in *Nouv. annales de la soc. de med. pratique de Montpellier*.

p. 603 (17). Et homines bombycibus operam navantes, phthiſi pulmonali multum obnoxios esse refert PATISSIER (*Traité des maladies des artisans. Paris 1822*).

p. 608 (36). Abscessuum pulmonis binis in locis inter costas prominentium ac cum successu apertorum, mentionem injectit J. BETTY (FRORIEP l. c. 4. B. p. 231. sub inscriptione incongrua: *Ein merkwürdiges Empyem (?) geheilt*).

p. 615. ROGERS vermes in sputis phthiſicorum detexit. (FRORIEP l. c. 2. B. p. 239.).

p. 626 (81. 82). Doleo CARSONI experimenta (*Sur l'élasticité des poumons etc.*) teste WILLIAMS (*Journ. univ. des scienc. médicales 1824. Mars. p. 353.*) haud confirmari, alias consilium illius aërem in unam thoracis cavitatem introducendi, ut pulmo ejusdem lateris motu orbetur sicque quictis ope sanetur, ac deinde peracta tali pacto illius sanatione, vulnus claudendi, ac in altera thoracis cavitate eandem operationem reiterandi, ingeniosum foret.

§. 633. Arbitror exempla empyematum sanatorum, et

haec inter illud, quod a F. ACERO narratur (*Décadas de medicina y chirurgia practicas. Vol. 7. p. 327.*), aut ad abscessus pleurae, aut ad hydropem acutum thoracis, spectare.

- p. 640 (23). *Mixtura Griffithii* nuperrime laudatur a GÜNTHERO (*Rhein. Jahrb. 7. B. 1. H.*).
- p. 641 (26). De *subsumigiis* phihiseos pulmonalis remedio praeterea locuti sunt: FR. HOME (*clinical experiments* 1780. p. 119.); J. MUDGE (*a radical cure of catarrhus cough* 1782. p. 74.); GILCHRIST (*The use of sea-voyages in medecine and particularly in consumption. p. 129 et suppl. p. 230. 239.*); B. RUSH (*Cases and cure of pulmonary consumption; in medical inquiries. Vol. 2.*).
- p. 642 (27). A. CRICHTON *practical observations on the treatment and cure of several varieties of pulmonary consumption and on the effects of the vapour of boiling Tar in that disease. Lond. 1823.*
- p. 717. N. 6. De paracenthesi thoracis legi meretur LARREY *Mémoires de chirurgie etc.* Operationem illam inter incolas insularum *Sandwich*, ad sanguinem per vulnera in thoracis cavum extravasatum, extrahendum, usitatam esse, lego (FRORIUS l. c. 1. B. N. 16.).
- p. 737. N. 13. De officio musculorum thoracis sub opere respirationis et sermonis deque nervis illis inservientibus ex peculiari columna medullae spinalis sub ponte Varolii ortum ducente et nervum durum paris septimi, n. glosso-pharyngeum, n. vagum, n. accessorium Wilisii, n. phrenicum et nervos externos thoracis largiente, pulchre scripsit. C. BELL (*Philosophical transactions of the R. society of London for the Y. 1822.*).
- p. 756. N. 1. Genuini asthmatis doctrinam exposuit H. HOFFBAUER. (*Ein Beytrag zur Diagnose und Aetilogie*

logie des asthma spasmodicum chronicum siccum. v.

HUFFELAND l. c. 1824. März.).

p. 790 (64). De asthmate a fulminis ictu sanato lege *Hamb.*

Magaz. 6. B. p. 483.

p. 800 (56). De tussi rebelli *ambustionis* ope sanatae vide

Hamb. Magazin. 4. B. p. 539.

p. 857. N. 6. Quodsi in rebus medicis a priori judicare, aut singulae observationi fidere liceret, propositum gaz oxydum nitrosum in coqueluche adhibendi (*The american medical Record. Vol. V.*) saltem inter infantes aetatis provectoris, suffragium meum obtineret.

AD PARTIS SECUNDAE, VOLUMEN SECUNDUM, SECTIONEM SECUNDAM.

p. 7. N. 2. Memorabilis *diaphragmatis hernia* describitur a J. MACFEDYEN (*The Edinburgh medical and surgical Journal* 1822. July).

p. 13. N. 2. Scripserunt nuper de *diaphragmitide* FR. BAEHRENS (*Die diaphragmitis in diagnostischer und therapeutischer Rücksicht. Rhein. Jahrb.* 5. B. 1. St. p. 9. 6. B. 2. St. p. 147.); DZONDI (*Geschichte einer merkwürdigen Magen- u. Zwergefellsentzündung. Leipz.* 1822.) et ANDRAL junior (*Archives générales de médecine.* 1823. Octob.).

p. 17 (41). *Diaphragmitidem Barnemi*, aestate an. 1819., epidemicam fuisse contendit BAEHRENS (l. c.).

p. 17. §. V. N. 1. BAEHRENS opus diagnosin *diaphragmitidis* illustrandi non sine ostentatione adgreditur. Asserit ante omnia, descriptionem hujuscemodi morbi, quatenus a nosologiis suppeditatur, objecto neutiquam respondere (p. 11.); atque signa *diaphragmitidis* certissima, pro re nata consistere in perceptione angustiae, constrictionis, ponderis circa pectus, in cupiditate aëris ejusque suctione ore aperto instar canum

tem-

tempore aestivo peracta (p. 21. 22.); in sensu inquietudinis (p. 16.) ex adpectu et gestibus aegri obvia, in distortionem oris sine risu sardonico; in tremoribus, convulsionibus (p. 17.) veluti epilepticis (p. 18.); in symptomatibus gastricis (p. 18.), in retractione hypochondriorum (p. 29.) inque delirio miti (p. 33.). Etiam si haec symptomata in una diaphragmitidis epidemia locum revera obtinuissent, ejus causa non sequeretur illa et omni aliae communia esse. Ast cum BAEHRENS diaphragmitidem suam epidemicam per autopsiam cadaverum non demonstraverit, liceat de illius morbi praesentia adhuc dubitare. Ex descriptione quidem morbi, ab intempestivis auctoris commentis obscura reddita, nil tuto concludi potest; suspicor nihilominus illum pertinuisse ad febres inflammatorio - typhoideas, cum peculiari affectione cordis.

p. 73 (47). FRID. TIEDEMANN tabulae arteriarum corporis humani. Carlsruhe 1822.

p. 74 (49). W. WROLIK diss. de mutato vasorum sanguiferorum decursu in scoliosi et cyphosi. Amstel. 1823. De memorabili hac dissertatione ratio redditur in PYRER's u. CHOULANT's *allgemeinen medicinischen Annalen* 1823. Spalte 1428. et in RUST's *kritisch. Repertor. f. die Heilk.* 1. B.

p. 76 (68). Apud TIEDEMANN (l. c. Tab. IV. fig. 7.) anomalia aortae, quae, ubi e corde sinistro egreditur, in duos dividitur ramos, qui, datis utrinque arteria subclavia et carotide externa et interna, aortam descendentem efformando conveniunt.

p. 76 (70). TIEDEMANN l. c. Tab. II. fig. 3. observationem KLINZII exhibet, videlicet aortam quae sese illico in adscendentem et descendentem dividit. Cfr. Tab. IV. fig. 8.

p. 76 (71). TIEDEMANN l. c. Tab. III. fig. 37. Tab. IV. fig. 1—4.

p. 77 (73). TIEDEMANN l. c. Tab. III. fig. 7. (Duce BOEHMER).

p. 77 (74). TIEDEMANN l. c. fig. 4. 5. exhibent duos ex arcu aortae natos truncos, quorum alter arteriam subclaviam dextram et ambas carotides largitur, alter vero arteriam subclaviam sinistram constituit. Fig. 6. delineat quoque duos truncos arteriosos ex arcu aortae originem ducentes, videlicet carotidem dextram et ramum communem carotidis et subclaviae sinistri lateris, arteriâ subclavia dextrâ e portione thoracica aortae pullulante. Tab. III. fig. 1. arcum aortae exhibet, ex quo nascitur truncus, qui arteriam subclaviam dextram et ambas carotides suppeditat; oritur dein arteria subclavia sinistra et tandem arteria vertebralis tertium ramum constituens. Fig. 3. praesentat ex arcu aortae originem symmetricam trunci communis carotidum inter ambas arterias subclavias.

p. 77 (77). TIEDEMANN arcum aortae inversum praesentat (Tab. IV. fig. 9.) quamobrem arteria aorta sinistrorsum jacet, carotis dextra in medio, et tandem dextrorsum origo arteriae brachii dextri.

p. 77 (88). TIEDEMANN (l. c. Tab. II. fig. 8.) WALTERO duce, praesentat truncum communem ambarum carotidum primum ramum constituentem, ramo secundo arteriam subclaviam sinistram, et ramo ultimo arteriam subclaviam dextram efficiente.

p. 78 (85). Cfr. TIEDEMANN l. c. Tab. VI. Tab. VII. fig. 1.

p. 78 (86). *Arteria thyreoidea* infima interdum oritur inter arteriam innominatam et carotidem sinistram (TIEDEMANN l. c. Tab. III. fig. 11.), aut inter carotidem et arteriam subclaviam sinistri lateris (ib. fig. 12.), observante quoque NICOLAI.

- p. 79 (87). Inter duos ramos ex aorta pullulantes (TIEDEMANN Tab. II. fig. 5.) ortum ducebat *arteria vertebralis* (ib. fig. 7.).
- p. 79 (92). Anomaliae *arteriae diaphragmaticae inferioris* pulchre delineantur a TIEDEMANN l. c. (Tab. XX.). Memorabilis praecipue est truncus ex aorta ortum ducens, atque illam arteriam simul cum arteria coronaria ventriculi suppeditans.
- p. 81 (11. 12. 13). TIEDEMANN l. c. Tab. XIII. Tab. XIV. fig. 2. Tab. XV. Tab. XVI.
- §. XVIII. 2. p. 86. S. G. ZIMMERMANN diss. de morbo coeruleo. Berolini 1822. SCHALLGRUBER *Abhandlungen aus dem Fache der gerichtl. Arzneykunde*. Grätz 1823. p. 55. LOUIS *Observations suivies de quelques considérations sur la communication des cavités droites avec les cavités gauches du coeur* (*Archives générales de médecine* 1824.).
- p. 93 (6). Apud SCHALLGRUBER (l. c.) in puero quatuor mensium deficiebat omnino ductus arteriosus. Botalli, arteria hinc pulmonalis nullam cum aorta habebat communicationem. Erat illa arteria venae instar collapsa, et ad originem concreta. Cor simile illi infantis duorum annorum. Cavitates illius sanguine fluido e bruneo livido repletae. Foramen ovale ad magnitudinem calami scriptorii hiabat. Ambae auriculae cordis in angulo inter marginem anteriorem et posteriorem septi, ope orificii amplitudinis digiti, invicem communicabant. Super illius orificii medietatem nascebatur aorta, ita ut sanguis ex utrisque cordis ventriculis libere in hoc vas fluere potuerit. Valvulae tricuspidatae et mitrales margines inferiores cartilagineos exhibebant.
- §. XXIII. N. 2. p. 114. Doctrinam pericarditidis prosecuti sunt: NIXTEN (*Bulletin de l'école de médecine* 1819. p. 78.);

- p. 78.); HEMMER *Geschichte einer Carditis mit Bemerkungen zur Diagnose dieser Krankheit. Mit einem Zusatz von HARLESS **) (*Rheinische Jahrbücher f. Medicin u. Chirurgie. 5. B. 1. St. p. 60.*). C. U. J. HUBER diss. de carditide quae epidemice grassata est inter milites a. 1814. in obsidione Castelli Delfzyl. Gröning 1819.; GITTERMANN *Geschichte einer epidemischen Herzentzündung bey Delfzyl im J. 1814, nach HENDRIKSZ u. HUBERS Beschreibung v. HARLESS (Rhein. Jahrb. 6. B. 1. St. p. 1.)*.
- p. 115 (25). Febris vehementissima (apud HUBER l. c.).
- p. 115 (28). Facies violacea et physiognomia, morbo ad acmen perducto, desperationem exprimens (ibid.).
- p. 115 (*). Aegri HUBERI permultum sitiiebant.
- p. 115 (30). Etiam HUBER deglutitionem dolorificam observavit.
- p. 116 (**). Pulsus erat intermittens (apud HUBER).
- p. 116 (36). In epidemia Delfzylensi dolor sub cartilagine ensiformi, praecipue a deglutitione et ab attactu externo augebatur in aegris HUBERI.
- p. 117. Illis in aegris decubitus in dorsum denegatus erat. Miseri ut plurimum capite genibus adinoto sedebant. Nonnulli e lecto prosiliebant, ac humum prosternebantur.
- p. 120 (57. 58). Juvenes, plethorici, potatores spatio 48 horarum moriebantur. In aliis morbus a diebus 4. ad dies 10. protrahabatur observante HUBERO.
- p. 120. Aegri HUBERI vel moriebantur immediate per carditidem, vel nullius alterius morbi vestigiis relictis sani evaserunt.

p. 121

*) Cl. Vir, me in praeceptis praxeos medicae vix mentionem de carditide injicere contendit. Sane non antequam ordo rerum me ad doctrinam hujus morbi duxit.

- p. 121 (71). Ultra uncias viginti seri interdum in pericardio reperiiebantur a HUBERO.
- p. 121 (72). HUBER l. c. Tab. I. fig. 1. 2. Forma pseudomembranae retiformis.
- p. 123 (77). Incrassatio pericardii non raro dimidium pollicem adaequabat in cadaveribus a HUBERO dissectis.
- p. 126 (97). Volumen cordis constanter auctum erat in allatis cadaveribus, uti videre est ex Tab. I. op. c.
- p. 129 (17). Pulmones plerumque simul inflammati erant teste HUBER.
- p. 129 (20). Hydropem cavitatis peritonei acutum, socium pericarditidis, observavit quoque HUBER l. c.
- p. 129 — §. XXIV. 1. De carditide epidemica testatur HUBER.
- p. 141 — §. XXV. N. 1. HUBER existimat *pericarditidem* quoque confundi posse cum *diaphragmitide*, cum *asthmate*, cum *hydrothorace* et cum *inflammatione* partis convexae tam *hepatis* quam *lien*is. — Pericarditidem cum *asthmate* confundi posse vix putarem, saltem juxta definitionem, quam hoc de morbo dedi. Quod spectat ad *hydrothoracem*, cujus species, videlicet *hydrocardia*, haud raro cum *pericarditide* copulatur, res longe aliter se habet, de quo argumento abunde locutus sum (p. 152). Quomodo *hepatitis* (quatenus symptomata in *dextro* latere urgent, in *pericarditide* vero in *sinistro*) pro *carditide* haberi posset, non intelligo, quamvis caeterum inficias non ibo, inter morbos jecinoris et cordis magnum locum habere nexum. Eo facilior est error, relate ad diagnosin *carditidis* et *lienitidis*, de quo argumento debito loco (P. III. Vol. II. Sect. I.) quaestionem instituam. Illic vero signa, quorum ope *carditis* a *diaphragmitide* distinguitur, eruere juvabit. Monente HUBER, idque jure, inspiratio et exspiratio longe difficiliore et dolorifica

lorificae sunt in diaphragmitide quam in pericarditide. Porro dolores illo in morbo totum pectoris ambitum, ad lumbos usque, amplectuntur, atque pulsus longe minus irregularis observatur. Concedit praeterea cl. Vir facilem inter utrosque morbos complicationem. Talis complicatio maxime in inflammatione *pericardii* expectanda est. Hoc enim in morbo contiguum diaphragma facillime in consensum trahitur, atque anxietas longe minor est, quam si cor ipsum a phlogosi correptum foret. Caeterum quousque de inflammatione partis superioris diaphragmatis quaestio est, agitur re ipsa de *pleuritide*, ad quam etiam pericarditis, stricte loquendo, pertinet. Ex quibus singulis colligitur, quam arduum saepe sit morbos viscerum contiguorum a se invicem distinguere. Quid igitur de magniloquentia illorum dicendum, qui, ut supra exemplum habuimus, hisce de rebus, excluso quovis dubio, et quin proprias adsertiones per cadaverum sectiones confirment, discurrunt?

p. 152. §. XXVI. N. 3. Alvi libertas bonum exitum promittebat apud HUBER.

p. 154. Venae sectio mirifice conduxit in epidemia Delftylensi. Illa interdum ter nycthemeri spatio repetebatur.

p. 155 (11). Calomel virtus quam maxime a HUBERO decantatus.

p. 253 (20). FALLOON in *Transactions of the association of fellows and licentiates of the king's and queen's college of physicians in Ireland*. Vol. 3.

p. 289 (64). FITZPATRICK (FRORIEP l. c. 3. B. N. 59. p. 237. ex *London med. repository*).

p. 291 (74). Et *mollities* (FITZPATRICK l. c.).

p. 300 (49). J. BRYANT in *The Edinburgh medical and surgical*

- surgical Journal* 1823. Jan. (Obliteratio arteriae iliacae externae, subsequente gangraena pedis).
- p. 324 (68) et p. 356 (10). Loco PAŁĘAWSKI, lege ZUBOWSKI.
- p. 329 (97). Filamenta nervea, quae alias arteriis solummodo adhaerent in aneurysmate in sulcis sacci intrusa sunt. (LOBSTEIN de nerv. sympathici humani fabrica, usu et morbis comment. Paris. 1823).
- p. 345 (92). Et DOERING (l. c.) antiquam divisionem aneurysmatis in verum et spurium defendit.
- p. 346 (94). Casum memorabilem aneurysmatis varicosi, quod inter venam cephalicam et arteriam radialem locum obtinuit, descripsit et tabulâ aeneâ illustravit C. SCHOTTIN (*Merkwürdiger Fall einer aneurysmatischen Venengeschwulst. Altenb.* 1822). Observabatur hoc in aneurysmate varicoso: 1° motus tremulus, oscillatorius; 2° calor magnus membri affecti; 3° sibilus stridens (*Ein schwirrender Schall*); 4° decursus serpentinus vasorum contiguorum; et 5° facilitas motum sanguinis retrogradum producendi.
- p. 347 (97). De aneurysmate arteriae intercostalis rami inferioris sextae costae (ex lapsu) pro tumore lymphatico habito et aperto cum candore describitur apud RUST (l. c. 16. B. 3. St. p. 501.).
- p. 352. N. 9. De aneurysmatis aortae, quo loco oritur arteria innominata, eoque *croup chronicum* mentiente lege НАХВY in *Med. and physical Journal by FOTHERGILL.* 1815. April.
- p. 378 (98). De nexu inter morbos cordis et cerebri pulchre etiam scripsit CRAIGIE (*The Edinb. med. a. surgical Journal.* 1823. Jan.). Probatur quod caussae omnes, quae transitum sanguinis ex vena pulmonali ad aortam impediunt, congestionem in pulmonibus, refluxum cruoris a capite retardanti ansam porrigunt.

- p. 378 (99). PHILIP *an experimental inquiry into the laws of the vital functions.* Lond. 1818.
- p. 395 (65). CAUSSIS phlebitidis libenter adscriberem etiam experimenta nunc usitata, res varias, e. c. oleum ricini (FRORIEP l. c. 5. B. p. 87.) venis introducendi.
- p. 402 (3). Ambae venae cavae sub nisu in osse deglutito rejiciendo perque tussim inde ortam, rumpebantur teste LOVADINA (*Mem. scientifiche e litterarie dell' Ateneo di Treviso. T. I. 1817.*).
- p. 430 (5). ELSAESSER *Geschichte einer Familie von Blutern in Württemberg* (HUFELAND l. c. 1824. Febr. p. 89.).
- p. 448. N. 10. De transfusione sanguinis auxilio haemorrhagiarum speciatim scripserunt: JAMES BLUNDELL *experiments on transfusion (medico-chirurgical transactions published by the medico-chir. soc. of London. 1818. Vol. IX. P. I.)*; HÖFFEL de sanguinis transfusione. Berol. 1819; PREVOST et DUMAS (*Bibliothèque universelle 1820. Sept. p. 74.*).
- p. 458 (78). C. A. W. SCHMALZ *Rettung des Menschenlebens.* Breslau 1821.
- p. 462 (92). Societas servatrix submersorum aliorumque asphycticorum, quae Hafniae floret, a die 3a. decembris a. 1821. usque ad diem 1. Aprilis 1823. — 61. homines salvavit (*Med. chir. Zeitung 1824. N. 17. p. 302.*).
- p. 480 (99). Cfr. Addenda pro Sect. I. p. 790 (64).
- p. 486 (15). ADELMANN *Medicinish-gerichtliche Untersuchung betreffend einige durch Kohlendampf verunglückte Menschen (Rheinische Jahrbücher. 5. B. 2. St. p. 135.)* (Tubus intestinalis inflammatus et gangraenosus detectus fuit); SCHENK *Obductionsbericht eines durch Kohlendunst ums Leben gekommenen Ehepaars in Archiv für med. Erfahrung von HORN etc. 1823. Jan. Feb. p. 93.* (Tubus intestinalis secundum normam. Tegumenta capitis

capitis sanguine rubro suffusa. Facies pallida, non tumida. Temperatura cadaverum illi aliorum similis. Rigeant membra).

p. 511 (75). Instrumentum complicatum sane, cujus ope aër in pulmones introducit et vicissim extrahitur, detexit CAP (*Description d'une pompe propre à retablir le jeu de la respiration chez les asphyxiés par submersion*): aliud instrumentum proposuit J. MOORE (FRORIEF l. c. 2. B. N. 38. p. 247.).

p. 511 (*). De asphyxia hominum laqueo strangulorum praeterea scripserunt: FLEISCHMANN (HENKE *Zeitschrift f. d. Staatsarzneikunde*. 2. Jahrg. 1822. 2. Heft); REMER (HENKE l. c. 1. Heft); HINZE (HENKE l. c. 4. Jahrg. 1824. 1. Heft. p. 116.), et A. C. L. VILLENEUVE *recherches et remarques sur l'éjaculation chez les pendus* (*Journal complémentaire etc.* T. X. Cah. 39. p. 211.).

p. 512. N. 4. Expertissimi viri FLEISCHMANN et HINZE l. c.) contendunt laqueo strangulatos homines perire 1° per suffocationem, 2° per apoplexiam sanguineam, 3° per suffocationem et apoplexiam simul, et 4° per paralysin cerebri (?), pulmonum et cordis; asseruntque varium mortis genus pendere ab applicatione funis, quatenus illa locum obtinet aut supra, aut infra laryngem, aut eo in loco, ubi nervus vagus facillime comprimi potest.

